

聖濟總錄

吳錫璥署

已4

8649

大德重校聖濟總錄卷第二十五

傷寒門

傷寒乾嘔

論曰傷寒乾嘔者嘔而無所出也此因邪熱在胃或發汗解後胃中不和尚有蓄熱氣熏上焦心下否結故令乾嘔且諸邪氣在胃胃氣上逆皆發為嘔冷即寒痰凝滯嘔出涎沫熱即津液消鑠獨其氣逆故乾嘔而已拯療者不可不察

治傷寒乾嘔不止葛根湯方

葛根

剉一分

茯苓

去黑皮半兩

半夏

湯洗七遍炒乾三分

白朮

半兩

黃芪

剉三分

人參

一兩

麥門冬

去心焙一兩

甘草

半兩剉

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞生姜半分拍碎棗二枚擘破同煎至六分去滓溫服

治傷寒胃氣虛熱乾嘔不止竹茹湯方

淡竹茹

半兩

人參

一兩

前胡

去蘆頭三分

甘草

半兩

蘆根

一兩

葛根

三分

半夏

半兩湯洗七遍切焙乾

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至八分去

滓溫服不計時候

治傷寒脾胃有熱乾嘔煩滿茯苓湯方

白茯苓

去黑皮一兩

人參

一兩

半夏

湯洗七遍切炒乾

麥門冬

去心焙各二兩

粳米

二合

甘草

半兩炙

右六味粗搗篩每服五錢匕用水一盞半生姜一分拍碎棗三枚擘破竹葉三七片同煎至八分去滓溫服日再

治傷寒心脾虛熱乾嘔煩渴不下食蘆根湯方

蘆根

二兩

人參

一兩半

赤茯苓

去黑皮一兩

淡竹茹

一兩

甘草

半兩炙

右五味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入小麥半匙生姜半分拍碎同煎至一盞去滓溫服日再

治傷寒乾嘔煩渴不止枇杷葉湯方

枇杷葉

去毛炙

麥門冬

去心焙

葛根

人參

各三分

白茯苓

去黑皮半兩

甘草

一分炙

右六味粗搗篩每服三錢匕用水一盞入生姜半分拍碎同煎至七分去滓

不計時候溫服

治傷寒乾嘔不止手足逆冷薑橘湯方

生薑

切

陳橘皮

湯浸去白焙

右二味等分粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時候熱服

治傷寒中風五六日以上胸中煩乾嘔栝樓實湯方

栝樓實

雨

芤胡

去苗八兩

黃芩

去黑心三兩

甘草

炙三兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服

治傷寒熱病乾嘔蘆根飲方

蘆根

剉半兩

冬瓜皮

切半兩

右二味粗搗篩用水三盞煎至一盞半去滓分溫二服不計時候

治傷寒後胃中虛熱乾嘔不下食人參湯方

人參

三分

生薑

切半兩

陳橘皮

去白焙半兩

甘草

炙一兩

右四味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治傷寒後胃氣虛熱乾嘔不止煩渴陳橘皮湯方

陳橘皮

去白焙一兩半

甘草

炙半兩

粟米

三合

枇杷葉

拭去毛一兩半姜汁炙

右四味粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜半分拍碎同煎至一盞去滓溫服不計時候

治傷寒乾嘔不下食半夏湯方

半夏湯洗七遍切焙乾

蘆根

淡竹茹

麥門冬去心焙

人參

白茯苓去黑皮各一兩

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜一分拍碎同煎至一盞去滓溫服日再

治傷寒後胃間餘熱乾嘔不止半夏木通湯方

半夏半兩湯洗七遍切焙乾

木通剉一兩

蘆根剉一兩半

陳橘皮去白焙半兩

訖胡一兩去苗 麥門冬去心焙半兩

枇杷葉拭去毛半兩姜汁炙

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒胃氣虛冷乾嘔不止人參煮散方

人參一兩 芍藥

白朮各三分

陳橘皮湯浸去白焙 乾姜炮

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒

甘草炙剉

枳殼去瓢麩炒各半兩 高良薑分

右九味搗為粗散每服二錢匕水一盞入生姜五片棗二枚擘破同煎至七分去滓熱服併三服以稀粥投之汗出即差

治傷寒風邪在胃乾嘔不止飲食不下人參丸方

人參

茯苓

去黑皮

茯神

去木

丁香

半夏

湯洗去滑焙

白藕豆

各等分

右六味搗羅為細末滴水為丸如梧桐子大每服二十丸生姜湯下

治傷寒邪熱雖退胃中不和乾嘔不已甚則吐逆白朮飲方

白朮

蘆根

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩

枇杷葉

去毛炙

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜五片煎至七分去滓溫服不拘時

傷寒嘔噦

論曰傷寒嘔噦者病在足陽明胃之經也足陽明之脈厥而上行即令人氣逆氣逆故嘔噦仲景云嘔多雖有陽明證慎不可下蓋為此也又傷寒嘔噦有因熱結胸中邪氣之高所致有因吐下後虛熱在內及飲水停積所致者證既不同治亦隨異不可不察

治傷寒後胃氣逆冷食已嘔噦即欲吐半夏湯方

半夏

一兩湯洗七遍炒乾

白茯苓

一兩去黑皮

枳殼

去穢炒

人參

各半兩

白朮

一兩半

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞生姜一分拍碎煎至七分去滓溫服日二

治傷寒嘔噦不止橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白炒

前胡

去蘆頭

甘草

炙剉各一兩

白朮

半兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞生姜半分拍碎煎至七分去滓溫服日二

治傷寒後胸膈氣滿嘔噦不納飲食茯苓湯方

白茯苓

去黑皮一兩

陳橘皮

湯浸去白炒

枳實

去穢炒各半兩

人參

白朮

五味子

各三分

半夏

湯洗七分

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜半分拍碎棗三枚擘破煎至一

盞去滓溫服

治傷寒後服冷藥過多胃寒嘔噦不下飲食人參湯方

人參

白朮

白茯苓

去黑皮

附子

炮裂去皮臍

陳橘皮

湯浸去白炒各一兩

桂

去粗皮

乾薑

炮各半兩

丁香

一分

右八味粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜半分拍碎粳米半匙煎至一盞

去滓溫服不拘時

治傷寒嘔噦不定飲食不下藿香湯方

藿香葉

兩

丁香

白豆蔻

去皮各一分

高良薑

炒

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前熱呷服

治傷寒脾胃虛冷嘔噦不思飲食厚朴湯方

厚朴

去粗皮生薑汁炙

人參

各一兩

白茯苓

去皮一兩半

枇杷葉

炙拭去毛肉豆蔻

去殼各半兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服空心食前

治傷寒嘔噦不定胸滿煩躁藿香人參湯方

藿香葉

三分

人參

兩

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙剉各半兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓溫服不拘時

治傷寒四五日嘔噦有痰胸膈不利人參丸方

人參

厚朴

去粗皮生薑汁炙

白茯苓

去黑皮各一兩

半夏

湯洗七偏二兩

右四味搗羅為末用薑汁作麴糊丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下

治傷寒時多嘔噦不止定氣散方

高良薑

兩半

草豆蔻

去皮一枚

甘草

炙

木香

炮各一分

右四味用酒浸紙裏煨令香熟焙乾搗羅為散每服二錢匕醋湯調下

治傷寒噦逆嘔吐是諸虛氣妄行通正散方

丁香

乾柿蒂

各一兩  
蓮子肉五十枚  
去心

右三味搗羅為細散每服二錢匕溫酒調下飯飲亦得

治傷寒嘔噦不止或吐酸水丁香湯方

丁香

三分

厚朴

去粗皮生薑汁炙

乾姜

炮各一兩

高良薑

一分

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓熱服不拘時兼治一切

冷氣吐逆

治傷寒嘔噦不止柿蒂湯方

乾柿蒂

七枚

白梅

三枚

右二味粗搗篩只作一服用水一盞煎至半盞去滓溫服不拘時

治傷寒嘔噦日夜不定華澄茄湯方

華澄茄

高良薑

各三分

右二味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎十餘沸入醋少許攪勻去滓熱服不

拘時

治傷寒差後嘔噦不止者有餘熱在胃脘也竹葉加生薑湯方

淡竹葉

半把

石膏

碎四兩

半夏

湯洗七次分三編去心焙

甘草

炙

人參

各半兩

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入粳米半匙生姜一分切煎至八分

去滓溫服

治傷寒少陰證嘔噦者四逆湯加生薑方

甘草

炙對一兩

乾姜

炮三兩

附子

炮裂去皮臍半枚

生薑

切焙一兩半

右四味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治傷寒脾胃不和嘔逆寒熱和氣五積散方

蒼朮

二十兩

桔梗

對十兩炒

陳橘皮

湯浸去白焙六兩

白芷

甘草

炙對三兩

當歸

切焙二兩

芎藭

半兩

芍藥

白茯苓

去黑皮

半夏

湯洗七遍各一兩

麻黃

去根節秋二兩

乾姜

炮春夏二兩半秋冬二兩

枳殼

去瓢麩炒四兩以三物別搗

桂

去粗皮春三兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙二兩

右一十五味將前十二味粗搗篩分作六分大鍋內微火炒令香熟即止不可過焦取出淨板牀上候冷入後三物和之和氣每服三錢匕水一盞入姜

粿煎至六分去滓溫服傷寒手足逆冷虛汗不止脈沉細面青嘔逆加順元散一錢匕同煎熱服產婦經三兩日不生或胎死腹中或氣乏痿頓產道乾澀加順元散水七分酒三分同煎相繼兩服氣血和順即產胎死者不過三服當下其順元散多少量產母虛實傷寒發熱而內挾冷者加葱白二寸豉七粒同煎相繼兩三服當以汗解順元散方見陰毒門

治傷寒嘔噦心腹冷疼痰逆不消高良薑湯方

高良薑

甘草

炙剉各桂皮粗

半夏

湯洗七遍炒黃各一兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至五分去滓食前溫服兼治一切冷氣心腹疼痛

傷寒心悸

論曰傷寒心下悸者謂悸動不定也傷寒飲水過多水停心下腎氣乘心則心氣虛弱故為之悸動也此皆由發汗已後又下之津液燥少若內生虛熱熱則飲水水氣停積故必振寒而心下悸也

治傷寒厥心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也茯苓甘草湯方

赤茯苓

去黑皮

桂

去粗皮各二兩

甘草

炙一兩

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎煎取七分去滓溫服

治傷寒發汗不解發熱心忪驚悸頭眩目瞤真武湯方

赤茯苓

去皮一兩

芍藥

一兩

白朮

一兩

甘草

炙半兩

附子

炮裂去皮臍半兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水一盞半入生姜半分切同煎至七分去滓溫服

治傷寒發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯方

桂

去粗皮四兩

甘草

炙三兩

右二味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服

治傷寒脉結心悸動炙甘草湯方

甘草

炙一兩

人參

半兩

桂

去粗皮三分

麥門冬

去心焙一兩

麻人合

生地黄

四兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半酒半盞入生姜半分切大棗二枚擘破煎取八分去滓入阿膠一片令烊盡溫服日三服

治傷寒水在心下心悸動欲得人按桂枝湯方

桂去粗皮

赤茯苓去黑皮

白朮一兩

甘草炙劉

陳橘皮湯浸去白

右五味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服不拘時候

治傷寒飲水過多心下悸動不定赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白

半夏湯洗七遍

枳殼楚炒去人參一兩

白朮三分

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎同煎取八分去滓

溫服不拘時候

治傷寒嘔噦心下悸動胸膈有滯水往往頭眩茯苓半夏湯方

赤茯苓去黑皮

半夏湯洗七遍

陳橘皮湯浸去白

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至七分去滓

溫服晚再服

治傷寒吐後心下逆滿忪悸不定起即頭眩茯苓白朮湯方

赤茯苓去黑皮

白朮三分

桂去粗皮

甘草炙劉

芎藭一兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服

治傷寒發汗後引飲過多心下悸動茯苓桂枝湯方

赤茯苓

去黑皮桂去粗皮

半夏

湯洗七遍炒乾各一兩

甘草

炙剉半兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜半分拍碎同煎至七分去滓溫服  
治傷寒心下有飲悸動不定桂心湯方

桂

去粗皮

檳榔

剉

半夏

湯洗七遍炒各半兩

右三味㕮咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生姜五片同煎至七分去滓食前溫服如人行三五里再服

傷寒痞滿

論曰傷寒病發於陰而醫誤下之邪氣入裏胃中虛客氣上逆心下滿不痛按之不堅此為痞也法宜瀉心惟表未解者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和或瀉心而痞不解其人口燥煩渴皆隨證處治其眩冒而經脈動惕者久則成痿若表裏俱虛之人有氣痞陰陽氣并竭無陽則陰獨復加火鍼因而致煩面青黃膚瞶者難治其脈微浮而氣上衝咽喉不能息者非痞有寒在胸中故也治屬吐法

治傷寒心下痞但滿而不痛者半夏瀉心湯方

半夏

湯洗七遍  
乾一兩

黃芩

去黑心  
三分

黃連

去煩炒  
半兩

乾薑

炮

人參

各三分

甘草

炙剉  
半兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒大下之復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解表宜桂枝湯方見可汗門攻痞宜大黃黃連瀉心湯方

大黃

酒洗  
二兩

黃連

去煩  
一兩

右二味剉細每服三錢匕以麻沸湯一盞漬之須臾絞去滓溫服一方有黃芩一兩

治傷寒心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯方

大黃

剉熟  
二兩

黃芩

去黑  
心

黃連

去煩  
各一兩

附子

一枚  
臍剉熟

取汁  
去皮

右四味除附子外細剉每服三錢匕以麻沸湯一盞漬之須臾絞取汁入附

子汁半合溫服

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食噦脇下有水氣腹中雷鳴下利者瀉心湯方

人參

甘草

炙各  
三兩

乾薑

炮

黃連

去煩  
各一兩

黃芩

去黑心  
二兩

半夏湯洗七遍  
二兩半

右六味細剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半入大棗二枚擘破生姜半分切同煎至七分去滓溫服

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡得下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘心瀉心湯方

甘草

炙四兩

黃芩

去黑心

乾薑

炮各三兩

半夏

湯洗七遍  
二兩半

黃連

去頭一兩

右五味細剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半入大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三

治傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代赭湯方

旋復花

三兩

代赭

煨醋淬一兩

人參

半夏

湯洗七遍  
各二兩

甘草

炙三兩

右五味細剉每服四錢匕水一盞半入生姜半分切大棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

治傷寒後氣結不散胸中痞滿欲成結胸大腹散方

大腹皮

并子剉

前胡

去蘆頭

木通

剉

赤茯苓

去黑皮各一兩

枳實劉對一兩半 半夏湯洗七分 桂去粗皮半兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕用水一盞半入生姜一分拍碎同煎至七分去滓食後溫服

治傷寒胸中痞滿心腹氣滯不思飲食蘇橘湯方

紫蘇莖劉對一兩 陳橘皮湯浸去白焙二兩 赤茯苓去黑皮一兩半

大腹皮劉對一兩 旋覆花各一兩 半夏湯洗七編焙半兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服

治傷寒胸中痞滿心腹冷痛陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙一兩 桂去粗皮半兩 半夏湯洗七編乾三分 吳茱萸湯洗焙炒一分

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒痞滿嘔噦心下悸不能食半夏湯方

半夏湯洗七編炒令乾 陳橘皮湯浸去白焙 白朮各三分 枳殼去瓢炒半兩

右四味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜一分拍碎煎至七分去滓溫服