



孫真人備急千金要方

一四



孫真人千金方卷之四十九

箴九

孫真人千金方卷之五十

箴十

孫真人千金方卷之五十一

規一

孫真人千金方卷之五十二

規二

孫真人千金方卷之五十三

規三

經真人千金方卷之五十三

經真人千金方卷之五十二

經

上海涵芬樓影印正統道藏本

經真人千金方卷之五十

經真人千金方卷之四十八



南京中医药大学图书馆版权所有

孫真人備急千金要方卷之四十九 瘧

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校

脾臟方

熱痢第七

論方

脈證
灸法

論曰余立身以來三遭熱痢一經冷痢皆日

夜百餘行乃至移牀就廁其困篤如此但率
意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治但
中性之徒率情驕倨良藥苦口不能克己早
餌朝遇暮過望其自瘥疾勢日增胃氣漸弱
心力俱微食飲與藥皆不能進既不時愈便



稱痢病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨
然此病隨宜服一物皆使得瘥惟須力意苦
已服食以瘥為限則無不愈也又大須慎口
味重者後百日次者一月日所以常哀驕恣
者不能自慎興言於此以為至慨矣古今痢

歲九

方千萬首不可具載此中但撮其效者七八
而已雖然弘之在人何則陟釐丸烏梅丸
松皮散等暴痢服之何有不瘥其溫脾湯建
脾丸

方出下
冷痢篇

久下得之焉能不愈大凡痢有

四種謂冷熱瘧蠱冷則白熱則赤瘧則赤白

相雜無復節度多睡眼澀蠱則純痢瘀血熱則多益黃連去其乾薑冷則加以熱藥疳則以藥吹灌下部蠱毒則以蠱法治之藥既主對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也凡服止痢藥初服皆劇愚人不解即止其藥不服此特不可但使藥與病源的相主對雖劇但服不過再三服漸漸自知惟非其主對者本勿服也

凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹所食諸食皆須大熟爛為佳亦不



得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也

下利脉滑而數有宿食當下之

下利脉遲而滑者實也利為未止急下之

下利脉反滑當有所去下乃愈

歲九

二

下利不欲食者有宿食當下之

下利而腹痛滿為寒實當下之

下利腹中堅者當下之

下利而譫語者腹內有燥屎宜下之

下利二部皆平

一作浮

按其心下堅者急下之



當溫之

下利已瘥至其年月日時復發者此為下不
盡更下之愈風寒下者不可下下之後心下
堅痛脉遲一作浮此為寒但當溫之脉沈緊下
之亦然脉大浮弦下之當已下利脉浮大此
為虛以強下之故也設脉浮革者因爾腸鳴

下利脉遲緊為痛未欲止當溫之得冷者滿
而便腸垢

下利身軀疼痛急救裏諸溫之屬可與理中

四逆附子湯熱藥輩

下利大孔痛者當溫暖之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其

表

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利氣者當利其小便

漢九

下利脉反浮數尺中自濇其人必清膿血

三

下利脉數而渴者令自愈設不瘥必清膿血

有熱故也

下利脉沈弦者下重其脉大者為未止脉微

弱數者為欲自止雖發熱不死



解

下利脉反弦發熱身汗者自愈

下利脉大浮弦下當已

下利舌黃燥而不渴胃中實下不止者死

下利後脉絕手足厥冷時時脉還手足溫者

下利脉數有微熱汗出令自愈設脉緊為未

下利有微熱而渴脉弱者令自愈

以然者面戴陽下虛故也

下利清穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱



生不還不溫者死生

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順

凡六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五臟氣絕於內者下不自禁下甚者手足不仁也

細尋取之萬不失一下病體略例如此耳

素問曰春傷於風夏為膿血凡下多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及水穀實而下者以大黃湯下之強人勿過兩劑皆消息五六日更進一劑



其補澀湯不效者三兩日可進一劑

陟釐圓治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤
四肢煩疼不解協熱下痢或醫已吐下之腹
內虛煩欲得冷飲飲不能消腹中急痛溫良
則吐乍熱乍冷狀如溫瘧或小便不利氣滿

歲九

四

嘔逆下痢不止方

水中陟釐

兩五

紫石英

兩三

厚朴

兩一

漢中木防已

兩六

隴西當歸

兩四

黃連

兩二

三歲醇苦酒

升五

上好豉

升三



右八味皆取真新者以苦酒二升漬防已極令潤出之留苦酒置以利刀切防已厚令一分使厚薄悉等以板瓦覆著炭火上以厚紙藉瓦上布成切防已著紙上訖從頭依次反周而復始令色槁燥復漬向餘

苦酒中更出著瓦上熬之如此盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令極燥各擣下篩畢都合擣千杵以餘三升苦酒漬豉一宿明旦以瓦盆盛之以一盆覆之蒸五升土下須土氣通流熱出之於盆中研豉以新布絞

取濃汁如棗膏法以和藥搗三千杵頓為
丸皆如水中雞頭子大分著數囊中懸本
陰乾取燥乃更盛著亟以蠟密封其際勿
令見風塵此藥以三九為一劑平旦以井
花水服一劑晝服一劑暮服一劑皆以水
歲九
服之初服寧少食當舖食水殮欲服藥若
食飲消腹中調和者日可一服若已瘥者
二三日可一服消息以意若病重藥力未
行者但益服之日可四五劑或時下不止
者當復更增令腹中有藥力飲食消是其

效也新服藥未安調當水飧助藥力心中
了然然後可作羹臠但當冷食之耳若有
時不喜冷食者正是藥力盡耳復益服藥
至一宿許則復欲進冷也若欲不復藥者
但稍溫食藥力自盡矣服藥不必強多飲
水也自隨體調耳久下虛服之如法禁熱
食生魚猪肉蒜生菜酒綠酒發藥力令病
者煩熱也又禁辛物及諸肥膩難消物皆
勿食也若有風病加防風一兩人虛羸可
加石斛一兩若宿有下痢腸胃損弱者可

下痢熱諸治不瘥方

加太一餘糧二兩半取石中黃軟香者若婦人產後疾加石硫黃二兩小便黃赤不利加蒲黃一兩依方消息之無不得效也

胡洽云舊有五石赤石脂白石石英鍾乳礬石并禹餘糧各四兩常以二月合之

烏梅升一

黃連一片金
色者

右二味為末蜜和服如梧子二十九日三

夜二神妙

治積久二三十年常下痢神方

赤松皮去上蒼皮切一斗為散麴粥和

一升服之日三服瘥不過服一斗永瘥

三十年痢服之百日瘥

苦參橘皮圓治熱毒痢方

苦參

橘皮

獨活

阿膠

藍青

黃連

鬼臼

一作鬼
箭羽

黃蘗

甘草

右九味等分為末以蜜烱膠和併手丸之
如梧子候乾飲服十九日三後稍加卒下

注痢者大良

治諸熱毒下黃汁赤如爛血滯如魚腦腹痛



南京中醫藥大學圖書館版權所有