

內癰王治方

神效爪蜚散

治內癰腦髀背腋諸毒瘰癧便毒乳癰乳疽乳
勞乳岩等症悉效

大爪蜚

一箇子多者佳
子少者用二箇

當歸

錢五

甘草

錢四

沒藥

錢三

乳香

錢一

用黃酒二碗煎八分服或去當歸加皂角刺一

兩六錢半生半熟炒各立效散與原方兼服之

尤佳服將愈加參耆芎朮以培其元

薏苡仁湯

治內癰腸癰腹痛脹滿不食小便澀滯婦人產後多有此症但疑似之間便可服之

薏苡仁錢三 瓜婁仁錢三 丹皮錢二 桃仁泥錢二

一加白芍一錢 水二鍾煎一鍾溫服

會膿散 治肚癰內癰未潰自消已潰者膿從便下

黃耆 歸尾 川山甲炒 大黃各一兩

白芷錢六 蜂房一箇重六七錢者酒浸瓦焙六次

連翹錢二 蜈蚣大者七條酒浸瓦焙三次

右爲末每服三五錢無灰酒調服再多飲以助

藥力如背疽加羌活脇癰加柴胡乳症加升麻

各隨經絡加引經藥五七分酒煎服藥尤佳

加味貴金湯

治陽疸毒腰痛如錐手不可近六脉洪數者

大黃

白芷

姜蚕

川山甲

貝母 用水二鍾煎一鍾食遠服

○懷忠丹

治內癰久潰膿血腥穢臍腹冷痛兼治婦人白帶腥穢不堪者立驗

單葉紅蜀葵花根

兩

白芷

兩

枯白礬

兩

白芍

兩

為末鎔黃蠟四兩為丸梧子大每服三十丸空
心清米湯送下推下膿血令盡次服大補之藥
以培其元 忌發物

補漏丹

治心胸有孔久不愈者及胃癰井疽肝癰心腹等症

鹿茸去毛 大附子炮去皮 食鹽等分

為末煮棗肉為丸梧子大每服三十丸空心黃酒送下

肺癰

肺癰之發必先中府穴隱痛不已穴在乳上三肋間 初則寒

熱咳嗽項強不能轉側脉滑而數 久則肢腫咳

腥臭膿痰甚則胸膈脹滿呼吸不利食少脉洪自汗視其身涼脉細膿血交粘痰色鮮明飲食知味者順手掌皮粗脉洪氣急顴紅鼻焮嘔噦不食汚膿白血如米粒者逆

脉洪滑身熱者難瘥脉細身涼者易治若潰後短澁者生洪大者死孟冬兩尺浮洪孟春雨寸洪數惟夏月可慮

肺癰由外感風寒未經發瀉所致者多故肺癰必先解表宜參蘇飲外受風寒咳嗽喘急者小青龍湯胸脹氣喘身腫面浮者葶藶大棗湯胸膈痛

豚乳者瘀血也。四順散加丹皮、紅花，瘀血吐出其
痛自止。發熱煩渴，引飲豚乳數而無力者，加減八
味丸，加麥冬，大劑服之。再以人參五錢、麥冬二錢
五分、五味子二錢，水煎代茶飲之。因房勞，丹石
消燬，腎水者，腎氣丸、金液戊土丹。勞傷夜熱，豚
微數者，日飲童便三五次。朝服人乳，間服金鯉湯。
咳嗽喘急，氣短小便短澀者，參耆補肺湯。體倦
食少者，參朮補脾湯。

蓋諸氣本乎肺。肺氣治則病已。再面白當補肺脾。面
赤當補肺腎。若端攻其毒，脾腎愈虛。而有不誤者。

則鮮矣 灸合谷七壯再灸腎俞穴三七壯

肺癰主治方

小青龍湯 此解表疎風行氣取膿之劑

半夏一錢二分 乾姜炮 細辛 麻黃

肉桂 芍藥 甘草炙各一分 生薑錢五分

五味子蜜并炒一錢 水二鍾煎八分食遠熱服

葶藶散 灸燂飲酒太過喘急脹滿不卧咳吐濁痰

甜葶藶 瓜蒌仁 薏苡仁 桑白皮

桔梗 升麻 葛根各一錢 甘草炙五分

用生薑三片水二鍾煎八分食遠服

四順散

治肺癰吐膿咳嗽氣急心煩熱壅者

貝母

紫苑

桔梗

各一錢五分

杏仁

七分

甘草

七分

水二鍾煎八分食遠服

金鯉湯

治肺癰已成未成胸中隱痛咯吐膿血者

金色活鯉魚一尾約四兩重者連鱗剖去腸肚

勿經水摻貝母末一錢於肚內線扎用白色童

便半碗浸之重湯頓以魚眼突出為度取起去

鱗骨將肉仍入便內頓熟食之飲之一日一枚

其功甚捷

人參補肺湯

咳嗽喘急短氣吐膿發熱作渴小便短澀或腎
水不足虛火炎上痰涎壅盛者

人參

黃耆

白朮

茯苓

陳皮

當歸

各一錢

熟地

一錢五分

山萸

二錢

山藥

二錢

丹皮

八分

麥冬

七分

五味子

甘草

炙各五分

生姜三片膠棗二枚水二鍾煎八分食遠服

參耆補脾湯

治咳吐膿涎中滿不食由脾氣虧損者

人參

白朮

各二錢

黃耆

二錢五分

茯苓

陳皮

當歸各一錢

麥冬七分

甘草

炙五分

升麻

三分

五味子

四分

用生姜三片膠棗二枚水煎食遠服

九製草靈丹

治肺癰肺痿又能止嗽化痰及腸風痔漏

槐角子

十觔

側柏葉

三觔冬至後取者佳

陳皮

半觔

枸杞

一觔

合一處黃酒洗入甌內蒸透晒乾再用酒浸透

蒸之如式九蒸九晒足為末煉白蜜為丸梧桐

子大每服一二錢空心白滾湯送下

肺癰單方

白果五錢桑白皮浸至久金佳每五錢細嚼五枚茶三服陰根

太乙膏三五錢水一茶鍾頓化通口服之則膏入肺三二服卽愈若爲丸服則入腸胃矣故不驗
醃芥菜瀋貯壘內封固埋地內二十年爲佳十年者亦效每飲一小杯三二次立瘥
公英俗呼山芥菜取根磁器刮去粗皮石臼杵爛絞汁用無灰酒或白酒漿冲服立效

肺癰應用方

加減八味丸

腎氣丸

俱見首卷

金液戊土丹

見脫疽

○小腸癰

小腸癰之發必先關元穴隱痛不已

穴在臍下三寸

初起發

熱惡風脉亢而數腹急腫痛大便墜小便濇久則腹脹下淋轉側有水聲者內癰成也

由飽食負重或醉飽入房或產難努力或暴急奔走致令氣血壅遏周旋失度凝滯而成如失治則流注關節變爲敗症矣

初起小腹^隱殷痛儼似奔豚小便淋濇者薏苡仁湯加

大黃下之如已成腹痛脹滿不食小便淋者薏苡

仁湯主之如腹痛重按則止時時下膿者薏苡

也牡丹皮湯并太乙膏主之如下後膿多者梅豆湯和之如面白食少氣血虛也加減地黃湯十全大補湯加丹皮五味子補之

腸癰宜灸兩肘尖各百壯艾如菉豆大則大便下膿血立愈 腸癰爲病不可驚驚則腸斷凡坐臥轉

側俱宜徐緩飲食宜少宜軟爛大宜滋補固

其元氣

脈則左寸洪數又云趺陽脈滑而數知當屎膿 古

爲膿從臍出者不治惟大補之亦有效者

一人腸癰誤治腹脹如鼓脰其脈細數而有力視其腹臍下一塊光亮大熱腹內不時腸鳴知爲癰也

令備淨桶一箇入滾水半桶蓋之聽用隨以薏苡仁湯加酒大黃三錢徐徐服之待腹覺痛扶坐桶上臍下如湧其痛立減隨大補之而愈

一人誤作脹治致毒內攻腸痛連陰陰器腐爛色敗無膿水流臭穢燥熱口乾不治果歿

一婦腹如懷孕疼痛不止余用川芎當歸蒲黃炒吳茱萸少五靈脂炒紅花水煎服下血塊斗許而愈

腸癰主治方

牡丹皮湯

治腸癰冷症腹濡而痛重按則止時時下膿者

牡丹皮 桃仁泥 薏苡仁 白芷

人參 黃耆 茯苓 當歸

川芎 白芍各一錢 官桂 甘草各五分

木香三分 水二鍾煎八分溫服

加味地黃湯

治腸癰潰後淋漓不已或精神減少飲食無味

自汗盜汗等症

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓

丹皮 人參等分 黃耆倍之

用煨姜三片大膠棗二箇水二鍾煎一鍾空心服

梅豆湯

治腸癰下後膿多者

薏苡仁

二合

黑豆

百粒

烏梅

一箇

水煎熟取湯一大鍾入阿膠一錢生蒲

黃一錢再煎服

天丁散

治腸癰內癰已有膿者

皂角刺

一兩

酒水煎服則膿下

薏苡仁湯

見前內癰

十全大補湯

大腸癰

大腸癰之發必先天樞穴隱痛不已

穴在臍旁二寸

右邊痛

甚脉則右寸洪數

治與內癰及小腸癰同法

胃癰

胃癰之發必先中脘穴隱痛不已穴在臍上四寸令人咳吐

膿血寒熱如瘧由寒氣隔陽熱聚胃口所致以寒

氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得上升故人迎緊盛

脉遲孔澁者瘀血也牡丹皮湯下之脉洪數者膿成

也赤豆薏仁湯排之膏梁之人初起者宜清胃

射干湯體倦氣喘作渴小便頻數者肺氣虛也

補中益氣湯加山茱萸山藥五味子麥門冬或兼

加減八味丸再夏月以生脉散代茶飲之是症

以壯氣助胃為主佐以前藥不可端攻其毒

胃癰主治方