

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十

男

乾元龍山

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人羅如桂丹臣全較

男 乾吉佑民

傷寒大小總論合參

傷寒一證幼科方論甚少故爲總論合參庶由深而得淺易耳

仲景曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒冒觸之者乃名傷寒然小兒之傷寒與大人無異所異治者夾驚而已但八歲以下無傷寒不過感冒傷風故散利敗毒尤非幼稚所宜也凡冬日受寒至春陰與陽氣相搏而發先

夏至日者爲病溫○後夏至日者爲病暑○惟自霜降以後春
分以前體中寒邪殺厲之氣而卽壯熱頭疼者方是正傷
寒也○復有冬日大溫而病名曰冬溫○至三四月或有暴寒
卒冷其時陽氣尚弱爲寒所折病熱則輕○五六月陽氣已
盛爲寒所折病熱則重○七八月陽氣已衰爲寒所折病熱
亦微○此皆時行瘟疫爲類傷寒也○故君子春夏養陽秋冬
養陰○順天地之剛柔○冒觸之者其病伏焉○經曰春傷於風
邪氣留連乃爲洞泄○風氣通肝○肝以春旺木○勝脾上○故洞泄生也○夏傷於暑○秋
爲瘡瘍○夏熱已甚○秋陽復收○陽熱相攻○生也○勝脾上，故洞泄生也夏傷於暑○秋
爲瘡瘍○瘡老也○亦日瘦也○秋傷於濕○上逆而

欬

秋濕既勝冬水復旺水來乘肺故咳逆病生

濕氣內攻則咳逆外散筋脈則痿弱冬

傷

於寒春必溫病

冬寒且凝春陽氣發寒不爲釋

其有卽

發

而爲病者謂之傷寒言其病之原也內經謂之病熱言

其病

之候也蓋風則傷衛寒則傷榮榮得寒則痛衛得風

則

熟風寒一傷使人毫毛畢直皮竅閉而爲熱名曰傷寒

始

病三日病傳三陽一二日太陽受病其絡上連風府故

必

身熟頭疼腰脊卒強脈則尺寸俱浮二三日陽明受病

其

脈起於鼻絡於目故必鼻乾目疼身熱而臥不寧經曰

胃

不和則臥不安脈則尺寸俱長三四日少陽受病其脉

循脇通耳○故脇痛而耳聾○脈則尺寸俱弦○如脈不沉細而
帶數○且猶惡風惡寒○見人藏身引衣密隱○是爲表症○未入
於腑○俱可取汗而已○若四五日尺寸俱沉細者○是太陰受
病也○其脈布胃中○絡於嗌○故必腹滿而嗌乾○脾經壅而成
熱○五六日少陰受病○尺寸俱沉○其脈貫於腎○絡於肺○故必
口燥舌乾而渴○至此而熱氣漸深矣○六七日厥陰受病○尺
寸俱緩○其脈循陰器○絡於肝○故必煩滿○舌捲囊縮而搐○此
熱氣已盡○聚於內極○深極重陽○熱既極○陰氣消亡○故必出
頭露面○揚手擲足○掀衣氣粗○口渴煩燥○如有便結等症○宜

用大承氣湯下之以承領其一線之陰使陰氣不盡爲陽
所刦因而得生者多矣既有下多凶陰之大戒復有急下
救陰之活法故曰一二日可發表而散三四日宜和解而
痊五六日便實方可議下七八日不解又復再傳如遇傳
分不依日數或兩感等症則又不可一例也如不兩感於
寒不加異氣則七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰
身熱少歇九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減
如故而思飲食十一日少陰病衰渴止津生已而能嘔十
二日厥陰病衰囊縮自愈小腹亦平其邪皆去則病人精

神自爽也若至六七日而頭痛更甚此又於太陽傳起以至厥陰名曰二候若至十三日而病復如是是謂三候一候則病二候病甚三候病必危矣正氣內虛邪氣獨勝故熱不已也脉若尺寸俱沉陷者是屬陽亡必死之候然傷寒有合病有併病或嘔或痢者何也合病者三陽俱受其邪脉候皆現相合同病而不傳者是也併病者如太陽病尚未解卽併與陽明俱病二陽相併而共病是也然陽氣太盛則裡氣不寧因上逆而爲嘔或下行而爲痢矣脉若陰陽俱盛而緊滻者是傷寒病熱未痊之脉也如再感於

寒則寒熱相搏變爲溫瘧若陽脈洪數陰脈實大壯內外俱熱之脉也如更感溫熱之氣則又變爲溫毒溫毒者表裡俱熱爲病最重也然傷寒再經有陽結有陰結陽結者不大便而能食其脈浮數者是也陰結者大便硬不能食其脈沉遲者是也陽結必於十七日而解陰結必於十四日而解者何也十七日是傳至少陰腎經也腎爲水陽爲火水制火故結自解也十四日是傳至陽明胃也胃屬土陰爲水土制水故結自解也總陽遇陰解陰遇陽解耳然傷寒治法宜和解便宜和解可汗便宜汗之可下便宜下

之陽盛陰虛則邪乘虛而入於裡下之則除其內邪而愈汗之則竭其津液而死陰實陽虛則邪僅客於腠裡而未能入汗之則邪自散而愈下之則邪盡入而凶亦有身戰大汗而解者是邪與正爭正氣勝邪乃大汗而解有不汗不戰而解者因內無津液故不汗耳其身必微癢若欲解而身反大熱者是邪氣還表也至若熱久而不已者是內亡津液陰虛不能退陽胃虛者補土以藏陽陰虛者養陰而退火則餘熱自己也若在初起一二日間又非津液枯少如連汗三劑而不汗出者是邪氣恣盛湯不能勝必成

大疾而死。若譫語狂煩者。是陽症也。其脈浮大者生。沉細者死。又若額上汗多而喘。小便下利而頻。是陽氣上逆。陰氣下流。而陰陽離矣。如體形不仁。振振惡寒者。是榮衛絕而陽亡也。如水漿不入者。是胃氣絕也。如發熱不已。身汗如油。喘而不休者。是正氣脫。邪氣勝也。此等之症。竝決必死。

小兒之傷寒。二三日散得爲妙。蓋元氣未足。不能耐病。如日久深入經絡。則搏耗血氣。而成慢驚者有之。或邪氣不散。餘熱不退者有之。或行動不調。變成勞復者有之。或脾

虛飲食不化爲食復者有之。或邪熱未退復感於寒變瘧疾者有之。凡暮熱朝涼者爲陰虛。若日晡潮熱爲胃實。蓋平旦屬少陽。日中屬太陽。日晡屬陽明。傷寒症中日晡潮熱爲胃實無虛症耳。

傷寒專祖仲景。凡讀仲景書。須將傷寒與中寒分爲兩門。逐一辨明庶不使陰陽二症混亂。夫傷寒治之得其綱領。分以邪正虛實真假寒熱則治之不難也。若求之多岐則支離矣。先以陽症言之。夫既云傷寒。則寒邪自外入內而傷之也。其入則有淺深次第。自表達裡。先皮毛次肌肉又

次猶骨腸胃。此其漸入之勢也。風寒之初入必先太陽寒水之經。便有惡風惡寒頭痛脊痛之症。寒鬱皮毛是爲表症。脈浮緊無汗爲傷寒。以麻黃湯發之得汗爲解。然邪之所奏。豈有定所。亦不必拘以傳畢六經而方愈也。故仲景立法。言在表發汗。在中和解。在裡攻下。隨其邪之所在而驅散之。不過使邪熱退而正氣復行耳。若浮緩有汗爲傷風。用桂枝湯散邪。汗止爲解。若無頭疼惡寒。脉又不浮。此爲表症罷而在中。中者何表裡之間也。乃陽明少陽之分。脈不浮不沉在乎肌肉之間。謂皮膚之下也。然有二焉。若

微洪而長卽陽明脈也外證鼻乾不眠用葛根湯以解肌
脉弦而數少陽脈也其症脇痛耳聾寒熱往來而口苦以
小柴胡湯和之蓋陽明少陽不從標本從乎中治也若有
一毫惡寒尚在表也雖入中還當兼散邪過此爲邪入裡
爲實熱脉沉實洪數有力外症不惡風寒而反惡熱詰語
大渴掀衣氣粗揚手擲足四肢燥熱身輕易於轉側六七
日不大便明其熱入裡而腸胃燥實也輕則大柴胡湯重
則三承氣湯大便通而熱愈矣以陰症言之初起便怕寒
手足厥冷或戰慄身靜氣短少息日不了了水漿不入二

便不禁喜向壁臥。閉目不欲見人。唇口不紅。蹉臥不渴。腹痛。腹滿。嘔吐泄瀉。或口出涎沫。而慘息冷引衣。自隱身重難於轉側。不發熱而脉沉遲。或細數無力。此自陰經受寒。卽真陰症。不從陽經傳入。熱症治例更當看外症。何如輕則埋中湯。重則薑附湯。四逆湯以溫之。不可少緩。經所謂發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。此法人皆知之。至於發熱而赤煩躁。揭去衣被。脉大無力者。人皆不識。認作陽症。誤投寒藥。死者多矣。不知陰症不分。熱與不熱。不論脉之浮沉大小。但指下無力。重按全無。便是伏陰。

急與五積散一服通解表裡之寒。若內有沉寒，必須薑附溫之。若作熱治而用涼藥，則渴愈甚而躁愈急，豈得生乎？此取脉不取症也。

寒中於表宜汗，寒中於裡宜溫。蓋人之一身，以陽氣爲主，經曰：陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰。寒者陰慘肅殺之氣也。陰盛則陽衰，迨至陽竭陰絕，則死矣。仲景著書，先從傷寒以立論者，誠欲以寒病爲綱，而明其例也。其在三陽者，則用桂、麻、柴葛之辛溫以散之；其在三陰者，非假薑附桂萸之辛熱，參术炙草之甘溫，則無以祛其陰冷。

之邪而復其若天與日之陽也諸傷寒濕者視此皆可以
類推爲治矣何後人不明病情之至理竟將傷寒立一門
設一局過求其端反增其惑尙異立設流散無窮凡遇病
者頭疼發熱卽謂傷寒太陽受邪實非其病必加是法默
受天枉不可勝數張深憫其厄謹竭鄙見有評傷寒論
篇列於一卷之內痛言其弊幸高明鑒諾

六腑屬陽若陽經受寒邪先發於太陽五臟屬陰若陰經
受寒邪必發於太陰陽經發病必先疎表清利邪熱六七
日後愈陰經發病必須溫托扶正却邪臟病無瀉法二七

後乃愈。故傷寒者由皮毛而後入臟腑。初雖惡寒發熱而終爲熱症。其人必素有火者。中寒者直入臟腑。始終惡寒而竝無發熱等症。其人必無火者。一則發表攻裡。一則溫中散寒。兩門判然明白。何至混雜於中。而使後人疑惑耶。從七日復也。

太陽經表之表也。行身之背。陽明經表之裡也。行身之前。少陽經半表半裡也。行乎兩脇之旁。過此則少陰太陰厥

陰俱入臟而爲裡。凡傷寒溫疫初發邪在於表必頭疼身
熱病屬三陽。卽於此時急表散之。如冬月卽病宜用辛溫
○辛熱以汗之。春溫夏熱宜用辛涼。辛寒甘寒以汗之。汗後
身涼脉靜無所傷犯。病不復作而愈。如投藥濡滯或病重
藥輕不散之於表致邪熱內結。病屬三陰須下乃愈。內虛
之人不勝下藥多致危殆。種種難治皆失於不早散也。
中寒之症身強口噤眩運無汗或自汗者腠理素虛而陽
微也。傷寒發熱中寒不發熱以此爲異。蓋陽動陰靜陰寒
既鬱而成熱。遂從乎陽傳變不一。靡有定方不熱者陰邪。