

新刊西學集成

九



醫學集成卷之九

後學 義烏 傅滋 續註

○怔忡八十八

脉法 寸動而弱動為驚弱為悸跌陽脉微而浮亡為

胃氣虛微則不能食如恐怖之脉憂迫所作也寸口
緊跌陽浮滑氣虛是以悸

丹溪云 屬血虛有痰有慮便動屬虛時作時止者痰因

火動瘦人是血少肥人多是痰尋常者亦是痰時覺

心跳者是血少戴氏怔忡者心中不安易亡然如人

仲憂也東垣謂心神煩亂怔忡元氣衰上心中氣亂而熱有似懊濃之狀皆謂上血中伏火熱上然不安

宜用權衡法以鎮陰火之浮行以
養上焦之元氣也治以安神丸

大法四物湯安神丸之類痰用痰藥

勞役大虛心跳

朱砂

白芍藥

歸身

側柏葉各三升

川芎

甘草

陳皮

炒連半一升為末猪心血丸

一人形質俱實因大怒患心不自安如人將捕之夜
卧亦不安耳後火光炎上食雖進而不知味口乾而
不欲飲以人參白朮歸身為君炒陳皮為佐炒栢玄
參煎服半月而安

一人虛損心中如常有官事不了之狀以四君了加

參朮黃芪茯苓多服愈

附

治一人病怔忡善忘口澹舌燥多汗四肢痠軟

熱小便白而渴褰鑿以內傷不足欲延并附等藥未

決請視脉虛大而數曰是由思慮過度厥陽之火為

患耳夫若火以名相火以位相火代若火行事者也

相火一擾能為百病况厥陽乎百病之起皆自心生

故憂愁思慮則傷心其入平生志大心高所謀不遂

鬱遏積久致內傷也然抱薪救火望安奚能以補中

益氣湯朱砂安神丸空心進坎離丸月餘而安

一人胸膈脹痛心怔忡嘔逆煩悶不食情思惘惘上

暫安日曉亡六脉皆結澁不調甚怪徐而察之因其
機深憂思太過加之脾胃內傷積為痰涎鬱於上膈
然也經云思則氣結又云陰氣者靜則神藏躁則消
亡飲食自倍腸胃乃傷此之謂也以祛順其服之即
安

一人因事恐怖心常惕上如畏人捕之狀脉豁然虛
大而浮休熱多汗曰凡病得之從高墜下驚仆擊搏
留滯惡血皆從中風論終歸厥陰此海藏之說也蓋
厥陰多血其化風木故也有形當從血論無形當從
風論今疾是走無形也從風家治之薰化痰散結佐



以鐵粉朱砂丸愈

驚悸

丹溪云因血虛

肝主血無血
養則木虛

易驚心神忤亂氣與痰結

遂使驚悸血虛者朱砂安神丸氣痰相結者溫膽湯

在心膽經有痰迷心竅用治痰藥

夫心為一身之主
神明系焉其所恃

以養者惟血而已血虛則神無所養而不能自守故
驚悸生焉驚者恐怖之意悸者心驚然而動也或曰

悸有三驚悸忪悸痰涎閉於中脫亦悸其症短氣而
自汗四肢浮重飲食無味心虛煩悶坐卧不安是也

若心虛而痰驚之則耳聞大音目擊異物遇險危
觸事喪志心為之忤使人有惕上之狀是則為驚心

虛而水停之則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火
惡之心不自安使人有恍惚之狀是則為悸驚者宜

以豁痰定驚之藥悸者與之逐水消
飲之劑使氣血充足而神自寧矣



或曰忪悸因失志氣鬱涎潮聚在心脾經宜定志丸失志

者為事不隨意久思所致少陰心悸乃邪熱入于腎水乘心惟腎

欺心七俱水也治在於木以茯苓湯導濕四逆散調

之枳實芍藥甘草芫胡是也與驚悸不同宜審之

附方

雜著治勞心思慮損傷精神驚悸煩熱方見煩熱

朱砂安神丸 治因血虛 黃連炒一朱砂飛一

生地酒洗歸身酒洗炙甘草各五分湯浸鉦餅丸如

黍米大每服二十丸津下一本無地黃川歸用生甘草

或論心虛驚悸恍惚用茯神者當用人參遠志石菖蒲



交門冬為末甘草膏丸以牛黃朱砂為衣治之

溫膽湯

治心膽怯易驚

二陳去茯苓加竹茹枳實姜水煎服

養心湯

治心虛血少驚悸不寧

黃芪

白茯苓 茯神

半夏

川歸

川芎

各半

遠志

辣桂

栝子仁

酸棗仁

五味

人參

二分

甘草

四分

右每服三錢姜棗煎

服行水怔忡加楨榔茯苓

寧志丸

治心虛血虛多驚若有痰者吐之

白茯苓

茯神

人參

栝子仁

琥珀



川歸

酸棗仁

溫酒浸半日去虎骨炒

遠志肉

各半

乳香

石菖蒲

朱砂

二各半

煉蜜九桐子大棗湯

下三十九

朱雀丸

治怔忡

白茯苓

二各半

沉香

半

蜜丸小豆

大參湯下三十九

加味四七湯

治心氣鬱滯豁痰散驚

石菖蒲

十一半

一兩半

白茯苓

厚朴

各半

茯神

紫蘇

各一兩

遠志

炙甘草

各半兩

每服四錢姜水

煎服

八物定志丸

平補心氣安神鎮驚除膈熱痰實

遠志

石菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓

各二

白朮

半兩

人參

半兩

牛黃

二銖

蜜丸桐子大朱砂為衣湯下二十九

○不寐八十九

不寐有二

有病後虛弱者有年高血氣者有痰在膽

經神不歸舍者

難經云老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道澁故不寐也

少壯血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故

不寤也

虛者六君子湯加酸棗仁黃芪



痰者溫膽湯加南星酸棗仁煎下青靈丹

傷寒不寐者當求之本門

因驚而致亦用溫膽湯加減用金銀煎竹茹或道痰湯
加菖蒲九妙隨病處方可也

驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆是膽涎沃心以致心
氣不足若用涼劑太過則心火愈微痰涎愈盛而病
益深宜理痰氣

滄州翁治一人不睡則心悸神憊如處孤壘而四
面受敵兵狀達旦日終無所視瞢無所聞雖堅
臥密室終未嘗交也諸醫罔効予視之左關之陽浮



而虛察其色少陽之支外溢於目皆曰此乃膽虛而
風諸公獨治其心而不祛其膽之風遂以烏梅湯泡
膽丸日再服數服病如脫

○健忘九十

丹溪云精神短少者多亦有痰者

或曰健忘者皆由憂思過度損其心胸其

致神昏不清遇事多忘而致此疾非生成愚頑者也
又云思傷脾亦令人轉弱遺忘宜歸脾湯頑兼理心
脾寧神定志
其非自愈也

附方

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

甘草

炙二

白朮

茯苓

黃芪

圓眼肉



酸棗仁 各一市

人參

木香 各半 每服四錢

姜棗茶煎服

定生丸

治心氣不足恍惚多忘

遠志 二兩

人參

菖蒲 各一兩

白茯苓 三兩

蜜丸如梧桐子大朱

砂為衣末飲下二十丸

二丹丸

治健忘

方見中風門但此多
言痛少愈風湯送下

人參定志丸

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

酸棗仁

遠志

人參

黃芪 各半兩

桔梗

丹砂

官桂 各三兩

天門冬

白茯苓

菖蒲 各七兩

右為末蜜丸如豌豆大每服二十九至三十丸用米



飲下

○消渴九十

脉法

心脉滑為渴

滑者陽氣勝

心脉微小為消瘵濡散者氣實

血虛洪大者陽餘陰虧寸浮而遲

遲為虛氣弱

陽浮數

浮則為氣數為消

消瘵脉實大病久可治小堅急病

久不可治脉數大沉小者可治實堅大者細浮短者

皆難治

丹溪云

東垣有法

茲採東垣論分註於下

上消者肺也多飲水而飲食大小便如常

東垣云高消者舌上



五裂大渴引飲渴逆論云心後熱於肺傳為喘消者
是也白虎加人參湯主之或曰上焦渴是心火刑

東肺金所致宜降火清金以蘭香葉白葵花白
五蘆平證加升麻黃柏引清氣升而渴自止矣

中消者胃也多飲食而小便赤黃東垣曰中消者善食而瘦自汗大便

硬小便數取和所謂口干飲水多食肌瘦瘵成消中
是也以調脾承氣湯三黃丸治之或曰中焦渴飲食

入胃傳送太急不生津液已則肌食
胃中有熱宜用黃芩石膏治之

下消者腎也小便濁淋如膏之狀東垣曰下焦者項

小便如膏焦頭水易鬻也此為腎消宜六味黃丸
總錄所謂末傳能食者必發瘵疽者容不能食者必

傳中滿鼓脹皆為不治之證掣占分而治之能食而
渴者白朮加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍

加干葛治之上中
既平不復傳下矣

因膏梁甘肥 變則陽盛矣陽味大盛則陰氣不得營



也津液不足結而不潤皆燥熱為病經曰二陽結謂

之消

消受善記血中伏火而並不
雖有三者之分因於火二也蓋心火甚於上為胃膜

之消病則舌赤裂大渴引飲論之
而消火甚於中為腸胃之消病漸
食身瘦自汗大便

煩渴小便赤論云用成煎膏油之狀焦煩水易虧是也大抵

三消之病不濕寒之陰氣風熱燥之陽氣
因於飲食不節失節腸胃干涸而氣溢不能宣平或

耗精神過連其病或因大寒而發血氣凝滯而
熱鬱甚因久食醢物寒食炙博過度或服金石丸散

積久實熱結於心肺氣厥而渴者有肝痺而渴者有脾

食而渴者有胃熱而消者有胃乾而渴者有病

風而治者五藏之品不一也
之所遇各異其為燥熱亡液則一也



或曰宋傳瘡疽者何也東垣曰此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死宋傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更之然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其所至為故如過與不及皆誅伐無過之地也如高消中消制之太急速過病所又成中滿之病正謂上消未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之製也處方之際宜加意焉

治法

