

精校竹林女科

精校
女科
竹林

上海錦章圖書局
印行

凡例

一是編首則總括一歌次則序諸家之論次則脉次則方便人一展卷馬歌以誌其大綱論以詳其條目脉以驗其相應方以治其沉痾歌論脉方恍然在目了無疑義庶得附名於指掌云耳

一是編以女科為首者宗千金方也蓋以婦人為生化之源自無而有人道之始也調經種子胎前臨產產後凡五其他傷寒雜證另有全書茲不多贅

一是集以帶下為始者尊扁鵲也况帶下者經必不調亦調經中之一事也而且婦人患帶下者十居八九但聞閨嬌羞不以語人耳

一如經不調病名也而所以致其不調者則非一端苟不辨其為七情為六淫為寒為熱為虛為實為痰凝為氣滯為血塊為房勞為先天為病後種種不同如何用藥當無虛虛實實之弊乎脉証詳明庶幾近理

一婦人每多慈戀愛憎喜怒憂思情性執著偏僻堅牢所以比男子難療遂致七情內傷六淫外侵脾胃虧損往其病必須辨其在臟在腑在經絡在血脉在肌膚在骨髓在氣分在血分有陰有陽有虛有實平時熟習諸書自然見理分明臨症不糺糊矣

一女科書之行於世者惟婦人良方濟陰綱目女科經綸而已此外不可多得即如邯鄲遺稿產寶新書外臺秘要諸氏遺書亦未易見秦不惜重價求之數十年始得寓目更於大金書中逐一拈出恭以己意積成卷秩因家貧不能全刻刪去其半

如回生丹資生湯安產圖藏衣法較之他書自有徑庭雖不敢杜撰遺議亦不致隨風附和也

一無子者雖有年命相沖風水相招二說其實發病使然耳還宜服藥為是譬如田中艾去草蔓饒沃其土及使下種天雨既降五穀勃然而生矣而其六要尤在行仁積德即如傷胎破卵之細亦物為之

一臨產古有安產藏衣之法今人盡皆刪去不思誕降之時正陰陽交代之際豈無鬼神運用於其間哉金匱外臺補之不惟便於採用抑亦宗前啟後也博雅之士不厭其多

一產時服獨參湯佛手散極有神效產後宜服資生湯回生丹養母用之雖危險之症十救五六嘗細究其方原出羅謙甫所製血極膏求垣稱為女科聖藥而又金匱珀散又合二味來蘇散又合仲景紅藍花酒是合四方而成一方五所謂複方也

妙在功補運行製度有法何諸書失載不傳耶今悉補之

一產育乃彝倫日用之常人皆有之每見分娩之際倉卒無措調理失宜而死者指不勝屈豈皆正命夫乃嚴臨子姪婦亦罹

趙氏醫貫

便產須知

介賓類經

證治大還

脉訣彙辨

卷之二

種子門

求嗣總括歌

風冷不孕

濕痰不孕

求子之道有四

先天之法

多男三鍊法

養胎論

十月胎形

煉真丸

還少丹

雞豆粥

邊胞湯

增損三才丸

植芝湯

卷之三

胎前門

邯鄲遺稿

鍼灸大成

明醫類案

女科經綸

醫學原始

玉機微義

奇效良方

原病集

錦囊秘錄

醫宗說約

產寶新書

明醫指掌

張氏醫通

女科家秘

四診脉鑑

醫門法律

立齋醫按

萬病回春

診治彙補

醫方集解

孫真人求子論

伏熱不孕

積血不孕

求子貴養精血

百脉齊到

受氣成形

食忌

胎教論

千金種子丹

士子丸

姦斯丸

墨附丸

大五補丸

金蓮種子仙丹

溫隱居求嗣篇

血少不孕

婦人不孕病情不一

趕經法

合非其時生有定理

駢胎品胎

藥忌

資始健乾圖

五子衍宗丸

聚精丸

紫石門冬圓

壬子丸

白朮調中丸

大烏雞丸

附小烏雞丸

無子論

痰飲不孕

脉法

煉經法

交會禁忌

非男非女

轉女為男法

巨勝子丸

慶雲散

百子附歸丸

續嗣降生丸

鳳雛丸

三聖散

腎虛不孕

脂塞不孕

灸法附秘訣

細經之時

交會旺相日

分別男女法

驗胎法

保真丸

十補丸

資生順坤元

皺血丸

百子丸

茂芝丸

胎前用藥大法

胎前

胎水

子瘕

胸腹痛

胎動不安

防胎自墮

鬼胎

卷之四

臨產門

臨產

弄胎試胎

符咒

催生

盤腸產

惡露不絕

敗血流經

卷之五

產後門

產後歌

如減歌

小腹痛

腳氣

胎前三禁

惡阻

子腫

子嗽

腰動

妊娠吐血

腹內鐘鳴兒哭乳泣

小產

脉法

臨產禁忌

臨產事宜

子死腹中附母死子活令出方

臨產古出

血崩不止

藥忌羣隊

子煩

子滿

喘息

妊娠傷寒

胎漏下血激經胞阻漏胞

雙胎一死一生

異產

先期欲產過期不產

預備藥物

皇甫中臨產歌

治驗醫案

胎衣不下

玉門不開附陰傷腫痛

律脾養血

煩燥口渴

子氣

子淋附胎壓膀胱

子瘕

胎上逼

誤服毒藥

達生

即君子

橫生逆生

針灸

血暈

子宮不收

安胎散

子懸

子癰

心痛

瀉痢

胎不長

胎漿

束胎滑胎

安產藏衣吉方方位

交骨不開

楊子建十產論

惡露不下

產後腸中痺

藥禁歌

回生丹

血痕即兒枕痛

腹脹嘔吐

前賢確論

頭痛

脇脹痛

呃逆

初產調護法

心痛

腰痛

喘急

資生湯論

腹痛

遍身疼痛

口鼻黑衄

傷寒
乍寒乍熱
拘攣
乍見鬼神
痢疾
下乳

浮腫
自汗
不語
驚悸
泄瀉
乳病

傷食
中風
目閉
恍惚
大便秘
遺糞
蓐勞

煩渴
痙病
狂言
咳嗽
小便不通
淋閉

發熱
瘰癧
顛狂
瘧疾
小便不禁
即損腎

淡而熱者。某月候。候期枯則補而滋。則通。通少過多。宜辨。越前落後。須分。在太補。心湯治虛勞。而癆咳嗽。金鎖正。月丹。安心。醫而醫。白淫。處女。初經。腹痛。不甯。氣喘。促。心。神。恍惚。師。尼。不。月。往。來。寒。熱。肉。滑。消。相。火。奔。騰。拍。子。丸。生。地。丸。清。心。而。退。熱。交。如。散。調。經。散。止。痛。以。祛。寒。赤。帶。須。尋。龍。骨。散。白。崩。應。服。馬。蹄。丸。歸。脾。湯。治。血。脫。血。虛。心。脾。有。損。或。喜。丸。癆。白。淫。白。濁。水。火。不。交。失。笑。烏。賊。止。失。血。心。痛。扶。參。鹿。角。截。夢。與。鬼。交。腹。痛。有。寒。熱。氣。血。之。不。停。身。熱。分。虛。實。客。潮。之。各。異。吐。嘔。不。同。嘔。者。頻。而。吐。者。頻。滿。崩。其。混。則。急。而。漏。則。徐。琥珀。丸。利。水。聖。藥。破。指。丹。隔。氣。神。方。臘。燭。悲。傷。仲。景。虎。傳。甘。麥。飲。傳。尸。勞。瘵。仙。翁。留。下。獼。肝。丸。非。十。符。祛。邪。有。驗。養。榮。湯。補。正。最。宜。白。芷。散。樟。根。丸。兼。除。癰。帶。烏。雞。丸。藍。甲。散。專。補。虛。氣。龍。膽。瀉。肝。湯。王。下。部。濕。熱。之。病。服。氏。抑。氣。飲。治。上。焦。鬱。結。不。舒。經。閉。有。血。滯。血。枯。脾。脹。有。血。分。水。分。十。金。桃。仁。煎。去。癥。瘕。而。破。血。四。製。香。附。丸。開。鬱。氣。以。調。經。五。積。散。外。邪。第。一。四。神。湯。虛。熱。無。雙。抑。又。聞。不。孝。有。三。無。後。為。大。精。血。乃。化。育。之。源。常。須。珍。重。清。熱。是。伐。生。之。斧。慎。勿。食。噉。佳。期。須。細。經。之。時。配。合。求。先。天。之。氣。駢。胎。品。胎。由。精。血。之。旺。藥。忌。食。忌。戒。口。腹。之。愆。徐。之。才。論。逐。月。養。胎。之。方。孫。真。人。有。轉。女。成。男。之。術。胎。前。衆。疾。安。胎。飲。知。減。或。宜。保。孕。諸。方。內。補。丸。昔。稱。穩。當。心。痛。腹。痛。令。乃。氣。滯。而。經。壅。子。滿。子。腫。今。由。土。虛。而。水。泛。喘。急。者。防。孕。氣。上。冲。腰。痛。者。恐。胎。元。下。墜。連。生。散。東。胎。散。滑。胎。有。効。當。歸。湯。獨。來。湯。產。如。神。交。骨。不。開。通。板。髮。友。同。佛。手。胞。衣。不。下。木。通。牛。膝。共。歸。致。於。產。畢。氣。血。大。虛。飲。食。起。居。更。宜。謹。慎。梳。頭。制。盜。恐。血。逆。而。致。頭。風。食。麵。在。鮮。慮。咳。嗽。而。生。泄。瀉。入。房。太。早。致。死。虛。羸。生。冷。不。除。必。生。腫。脹。回。生。丹。治。產。後。百。病。失。笑。散。主。胸。腹。諸。瘕。表。虛。自。汗。客。易。中。風。愈。風。紫。豆。最。宜。胃。弱。化。遲。不。難。停。食。香。橘。香。砂。卷。効。血。虛。發。熱。大。忌。寒。涼。腹。痛。惡。露。必。需。薑。桂。惡。露。不。盡。則。潮。熱。而。便。難。量。行。桃。核。煎。血。未。生。必。口。乾。而。煩。渴。戒。食。生。梨。初。產。悶。絕。必。是。停。瘀。蘇。木。紅。花。益。石。淹。留。日。久。則。成。內。熱。當。歸。羊。肉。澤。蘭。若。要。除。根。月。經。再。至。如。逢。逆。症。切。勿。糊。塗。藥。血。入。肺。而。黑。喘。急。而。難。治。孤。陽。欲。脫。自。汗。氣。促。而。必。危。經。傷。則。心。痛。而。死。胃。絕。則。吐。沫。而。亡。三。沖。三。急。死。生。在。反。掌。之。間。五。寶。五。虛。在。秋。毫。之。際。嗟。嗟。天。命。不。齊。人。謀。亦。異。幸。則。子。母。雙。全。不。幸。則。身。家。兩。失。一。念。之。差。千。古。遺。憾。同。志。之。士。蓋。可。忽。乎。哉。

婦人三十六病

三十六疾為何生。七害相同十二癥。九痛五傷良有說。更兼三癩得其名。白帶黑帶赤如淚。豆汁葵羹血壅清血水。來如米。清。恒。期。月。流。是。癥。宗。九。痛。陰。疼。或。淋。濕。漏。時。寒。冷。或。臨。經。汁。流。氣。滿。如。蟲。鳴。腸。下。腰。膝。痛。不。甯。七。害。孔。痛。中。寒。熱。小。腹。堅。痛。臟。不。仁。子。門。不。端。引。背。痛。恒。期。害。吐。得。其。真。五。傷。兩。脇。支。滿。痛。心。痛。鬱。結。氣。不。通。邪。思。洩。利。精。神。少。前。後。陰。陽。亦。在。中。三。癩。虛。羸。似。鶴。形。從。來。絕。產。不。添。丁。更。兼。不。月。胞。門。閉。莫。道。醫。方。用。不。靈。食。氣。冷。勞。房。壯。難。亦。名。七。害。由。單。繩。據。五。產。實。言。如。此。虛。虎。相。傳。或。悞。勝。

論經曰女子七歲腎氣盛齒更長二七而天癸至任脉通太衝脈盛月事以時下天者天其之氣後者土癸之水但土氣配丁而化木癸為陰水配戊而化火女子陰類故得癸為衝為血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下天其氣降故曰天癸常以三旬一見象月盈虧不失其期又名月信也若遇經行最宜謹慎倘被驚恐勞役悲怒風寒則氣血錯亂經脉不行多致肢體痠痛頭目眩暈咳嗽不宣淋瀝無已漸成營瘵不治者有矣犯時微若秋毫成病重如山嶽可不畏哉

張仲景曰婦人之病因虛積冷結氣為患經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝結在上嘔吐涎沫久成肺癰形體損分在中盤結連臍寒疝兩脇疼痛與臟相連或結熱中痛在關元脉數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下來多經候不勻今陰擊痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝急痛膝腰痠疼卷忽眩暈狀如厥顛或有憂怖悲傷多頃此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脉虛多寒三十六病十變萬端審脉陰陽虛實察其針藥治危得安其雖同病脉各異源子當辨記

孫真人曰三十六疾者謂十二癥九痛七害五傷三痛是也十二癥是所下之物一日狀如膏二日如黑血三日如紫汁四日如赤肉五日如濃痰六日如豆汁七日如麥芽八日如穀血九日如清血血似水十日如米泔十一日如月浣乍前乍却十二日經度不應期也九痛者一日陰中痛傷二日陰中淋漓痛三日小便便即痛四日寒冷痛五日經來腹痛六日氣滿痛七日汁出陰中如蟲噬痛八日腸下分痛九日腰膝痛七害者一日窮孔痛不利二日中寒熱痛三日小腹急痛四日臟不仁五日子門不端引背痛六日月浣乍多乍少七日害吐五傷者一日兩脇支滿痛二日心痛引腸三日氣結不通四日邪思洩利五日前後痛冷三癥者一日羸瘦不生肌肉二日絕產乳三日經水閉塞數小不通

寸口脉微而濡微則衛氣不足濡則榮血無餘衛不足其息短榮不足其形燥榮衛俱虛言語乏力跌陽脉微而濡為虛虛則短氣咽燥口苦濡則津液少少陰脉微遲而濡微則無精遲則陰中寒濡則血不流而經閉此為居經三月六來脉虛氣血俱虛年少者亡血也脉微弱而濡年少得此為無子中年得此為絕產六脉沉弦細數者其病已成元氣榮衛俱虛形衰神怯者雖藥勿効

方 孫真人曰婦人腹中十二疾 經水不時 經如清水 經水不通 不周時 生不乳 絕無子 陰陽減少 腹痛如刺 陰中冷 子門引背痛 經水凍如葵汁 腰急痛 凡此十二病皆因經行內虛時或冷水洗浴或坐臥濕地或當風取涼或誤食生冷或瘡癰未瘥便合陰陽或早起作勞衣單席薄寒從外入也

赤石脂丸

赤石脂版另研 半夏 炮姜 當歸 防風 丹參各一兩 吳茱萸酒洗 蜀椒 桂心 佳盧各五錢 白薇一兩 為末煉蜜丸空心

酒下十九日三服不知稍加丸數以知為度

千金白聖丸

白聖 龍骨 芍藥 黃連 當歸 茯苓 黃芩 白朮 瞿麥 石葦 細辛 牡蠣 薑本 甘草 附子
大黃 人參 白石脂 禹餘糧 烏賊骨 蜜丸餘下二十九
十二癥倍牡蠣龍骨禹餘糧石脂烏賊骨
七害倍細辛薑本甘皮加蜀椒吳茱萸
帶下

帶下

歌婦人帶下有多般風冷驚痰濕熱寒五臟三焦俱病此七情六慾總相干木乘土位因虛入積滯胞門作實看損耗精神形體瘦重亡津液腎源乾臨經房事傷衝任恚怒悲哀動肺肝升舉補中益氣飲海敗精白固五元莫言久病醫無効誠得樞機治不難攻補寒溫隨症用不須丸轉煉金丹

素問曰任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚又曰脾傳之腎名曰疝瘕小腸寬結而痛出白名曰白蟲出白漫又曰小腹寬熱漫出白液又曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發為白淫

仲景曰婦人年五十病下利暮即發熱腹滿小腹裏急手掌煩熱唇口乾燥此屬帶下曾經半產瘀血在小腹不去故唇口乾燥也溫經湯 帶下經水不利小腹滿痛一月再見者上小根散

婦人陷經漏下黑不解膠姜湯 一作膠艾湯

婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此為水與血結在血室也大黃甘遂湯
婦人經水不利下振當湯 經閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物磐石圓

六十二種風腹中血氣刺痛紅藍花酒

婦人腹中痛當歸芍藥散小建中湯

良方曰帶下有五由經行產後風邪乘虛入內傳於臟腑而致之傷肝膽色如青泥傷脾胃黃如爛瓜傷心小腸色如赤津傷肺大腸形如白涕傷腎膀胱黑如血人有帶脉橫於腰間如束帶之狀因名曰帶故難經曰帶脉者起於季脇迴身一周帶脉為病腹滿腰疼若坐水中

產寶曰處女三病一者經水初下陰中熱或當風臥

佈三者有一後必帶下神仙聚寶散

河間曰帶下由任脉濕熱甚津液溢而為帶也如火煉金熱極反兼火化六月熱極則萬物反出津而潤澤宜苦寒止治之有

用辛溫從治而愈者辛能發散故也

丹溪曰赤屬血白屬氣俱是胃中濕痰精流而下流入膀胱宜用升提是半蒼朮海石黃柏青黛檳榔皮之類家秘曰大腸主津小腸主液清氣上升濁氣下降則津液化為氣血而填骨髓養五臟充肌膚何疾之有具或七情內傷六淫外感陰陽乘戾清濁不分逆於經遂流於衝任津液不能四布何以奉心化赤而為血哉故帶下也宜補中益氣湯送青黛牡蠣雞子清丸

脈右手寸平尺浮浮為陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下重則崩中皆心不榮血肝不藏血所致

常下六極之病脉浮則腸鳴腹滿墜則腹中痛數則陰中生瘡弦則刺手痛

風

經行衛任已虛空登廁來涼易中風浮緩頭痛流鼻涕急尋蒼柏辛芍散

涼

多悲不樂足如水腰腹時疼嘔帶崩六脉沈遲或虛火按之無力是寒徵 酒煮當歸丸

驚

血去心虛易著驚精神恍惚不和平木乘土位脾家弱脉動虛浮帶已明 歸脾湯

痰

脉滑肌肥氣不清濕痰下注帶如傾頭眩嘔噦兼麻木多是痰涎裏面生 樗皮丸 重者小胃丹下之

濕

脉緩肌黃脚面浮腫跨沉重帶長流或時泄瀉偏難溺嗜臥腸鳴濕上求 四神丸 雙白丸 香附散

熱

陽盛陰虛火易升煎熬津液喪元精形衰脉數皮膚燥口苦咽乾耳內鳴 三黃三白丸 白朮丸

寒

寒脉沉遲比冷輕惡寒腹痛食難行或時吐利吞酸水足冷腰痠色不榮 大溫經丸

虛

漏下多時內必虛急宜補益其躊躇脉來細小孔微瀉烏骨雞丸載古書 烏骨雞丸

實

敗精濁血滯胞門氣積痰凝作實論腹內堅疼脉弦實石瘕瘕瘕及青脉 稀露丸

漏帶

帶下如同經水來半年三月一當灸健脾補氣兼收滋不替安能得受胎 白馬蹄丸 樗皮丸

附方 地榆膏治赤白帶骨立者

針灸 三陰交穴在內踝上三寸

天樞在臍傍二寸

氣海在臍下一寸半

血海二穴在膝膕上內廉 中樞在臍下四寸

豐隆在外踝上八寸

水道在天巨下三寸

白濁白淫

源察脈觀形辨五行 不其稠粘比帶輕白淫白濁白崩名其元下陷脾虛損龍火蟄騰水不升多慾房勞明伐腎邪思妄相暗傷情要知經絡根

吳梅坡曰婦人下赤白不甚稠者名白淫與男子白濁同由於龍雷之擾而不澄清也屬足少陰太陰治當清補若有滑白

稠粘者多帶下屬心包手厥陰心包系於脊絡於帶脉通於任脉治宜血肉之劑以培之此探本窮源之論也時人泥於常套

作濕痰治用兜澁升提之類豈知本原傷損以致腐敗而求彼澁滯不清之物則益加其滯升提不正之氣則愈增其鬱惟宜

六龍固本丸十六味保元湯

脈陽急為瘕陰急為疝浮則腸鳴緊則腹痛數則生瘡弦則筋掣拉太虛孔細小微滯皆主下白

心腎不安

深閨寂寞暗傷春脚軟腰痠氣不勻白滑下流多惡夢耳鳴目暈少精神

金鎖正元丹

思慮傷神

胸痞虛浮面色黃多眠少食困狼當陰陽清濁相干混若欲分清四七湯

怒氣傷肝

往來寒熱不安胸脇痛心煩面帶青口苦脉弦小便數便知鬱怒在肝經

加味逍遙散

固本調元

頭暈心嘈氣血虧四肢乏力屬於脾時常麻木精神少固本培元最合宜

六龍固本元

經候總論

歌婦人二七天癸至衝任始通匝月行恙然憂思宜謹慎陰陽氣血自和平雖由心統經遂液還賴脾清水穀精行後空虛勞即病初來恍惚易生驚惕然撫帶長嘔數偶兩停針不作聲便是挑大忌諷詠應知雌鳥欲和鳴脉絀出際三關遠情動於中百感生舊血停留還滲入骨蒸潮熱症非輕乘涼登廁風吹入飲冷形寒血不營若要調經先去病更推形色得其情過期色淡知無血帶紫趨前熱不清未至先疾因氣滯行過腹痛自虛明平時發熱因鬱積熱在臨經血不盈氣亂錯經行口鼻脾虛漏下若葵臺去多不住宜滋養養少無遂大補榮經閉要分虛實看血枯氣隔熱痰名

論經曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而亂起任脉通衝脉盛男則運行女則停止運行者無積而不滿動也停止者有積而能滿靜也不滿者陽氣隨時而行運滿者陰血以時而下溢謂之信者男子以氣運故陽氣應日而一舉女子以血滿故陰血應月而一下

諸侍中曰男子精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便道澀而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛也女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而為腫後雖合而難子又曰合多則泄枯虛人產眾則血殺人觀其精血思過半矣

寡婦師尼異治

褚澄療尼姑寡婦別製方法蓋有謂也此二種獨陰無陽慾心萌而不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全賴溫養久則為勞瘵積史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以為寒熱病倉公曰病得之欲男子而不得也何以知之診其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精為主女人以血為主男子精盛則思室女人血盛則懷胎也夫肝藏血者也厥陰肝脉弦出寸口上魚際則陰盛可知矣大法宜本東方生地黃丸柏子仁丸衛生湯

調經先去病

月水循環百病不生而有子者六淫外感七情內傷氣血不調心腹作痛或引腰背上下攻利吐逆不食或寒熱癰疽或潮熱腹痛重則咳嗽汗嘔泄瀉蓋潮熱自汗則血液消耗咳嗽嘔吐則氣往上行瀉則津泄於下痛則積結於中是以必先治病而

後可以滋血調經若血滲入胃便為骨蒸血積於中相搏則痛血枯不能滋潤百骸則熱蒸於外血枯包絡火旺或挾外邪變
成勞瘵

調經大法

婦人經病月候不調者有經水不通者然不通之中有患疼痛者有兼發熱者此又分為四也四者細推之不調之中
有趨前者有退後者趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者血滯宜破血枯宜補也發痛之中有常時作痛有
臨經作痛常時痛為氣滯臨經痛為血病也發熱之中有常時發熱有經行發熱常時熱為白虛有積臨經熱為血虛有熱
也此又分而為八也大抵內因憂思忿怒外則形寒飲冷氣血鬱結不行此不通不通疼痛發熱之由也氣行血行氣止血止
故治血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝結故治血病以熱為佐姜桂是也

經水異色

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火象也血為氣之配氣熱則氣實則寒升降清濁因氣而行故成塊者氣
之凝也將行而痛者氣之滯也行後痛者氣血虛也錯經妄行者氣之亂也色淡者虛而有水混之也紫者氣之熱也黑者熱
甚也今人見紫黑成塊作痛指為風冷求之用溫熱藥禍不旋踵經曰亢則害承乃制熱甚必兼水化所以熱則紫黑也四物
加黃連香附淡白者氣虛也芎歸參芪芍附多而色淡者痰也二陳芎歸如煙塵屋漏水者濕也二陳湯加蒼朮防風二朮成
塊作片白不變者氣滯也四物枳殼香附延胡索陳皮

居經

月水一月一來乃其常也有三月一來者謂之居經氣血不足故也又有一年一來者又有石女無經者亦有頻年不來一來
即孕者皆其變也亦如脈之有反關耳

脈微氣血俱虛年少者亡血也乳子下利則可否者此為居經三月一來少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒濡則血
不來此為居經三月一來

寸口脈衝浮而大按反而弱浮大則氣強反弱則血少孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭陰為積寒陽為積熱陰虛陽
實故今少血時發酒嘶咽燥汗出或沒調數多唾涎沫此今重虛津液竭泄故知非軀名曰居經

經病血厥

血厥者婦人平居無病忽如死人身不動搖目閉口噤重者不救輕者移時乃醒此名血厥由汗多血少陽氣獨上氣塞不行

故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人多有此症此癰症大不相同但此條混見大方全書之內未曾拈出講明所以卒然莫殺今特表而出之經曰諸乘寒者則為厥鬱皆不仁其脉微弱初或嘔吐便溺皆沉陰陽乘隔榮衛不和比之中風身不發熱喉無痰聲手不握持為異耳急宜握佳頂心髮令人扶起不得平卧外用通關散吹鼻取嚏有嚏則吉無嚏則凶或以鐵秤鉤燒紅入碗內以醋沃之薰鼻下醋氣入內透隔立斂口噤不能灌藥者針少商及三陽五會等穴或以竹筒吹其兩耳或以童便灌之切記不可灌熱湯蓋灌熱湯則血得熱而泛溢犯胃衝心多致不救心為君主心不受邪一絲血入心即死矣經所謂經水波濤而涌起也名曰血厥治宜化菴石散童便調服或蘇合香丸醒後白薇湯八珍散歸脾湯調理可也

經水愆期

經水違期號曰愆或多或少或流連過期溢少因無血熱感脾虛則向前作熱下痛須細審適來通斷看風煙踰期五十經還漏室女停經有過年

論經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散積上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行故心脾和平則經候如常矣苟或飲食失節起居違宜脾胃虧損則經不調也

趙養葵曰不及期來者有火也溢水則火自平矣六味丸如不及期而來多者本方加海螵蛸紫胡白芍如半月十日一來屬氣虛補中湯如過期不來者無火也本方加艾葉脉遲色淡加泡姜肉桂此其大畧耳其間亦有不及期而無火者過期而有火者有過期而多者不形之強弱年之多寡而施治之如肝脾熱者四物加減脾肺虛弱者補中益益湯肝脾鬱結者歸脾怒動肝火者加味逍遙散肝腎陰虛者六味丸蓋脾為化生之源心統諸經之血而陽氣生於陰精故宜補心脾腎也寸關脉調如故尺脉絕不至者當思少腹痛引腰痛氣滯上攻胸臆也寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血脉至狀如琴弦若小腹脹月水不利孔竅生瘡少陰脉弱而微微則少血弱則發熱肝脉沉主月水不利腹脹滿腰間痛

趙前

先期而至曰趙前血熱陰虛土不堅怒氣傷肝及勞役固經涼血始安然

四物三補丸

落後

只因血少故來遲蓋少無痰大補之色淡脉虛皆不足養榮歸芍及參芪

滋血湯

過多

陽氣乘陰血去多當歸飲子可調和勞傷衛佳宜膠艾攝血參芪苓朮

並少

並少原來陰勝陽或臨經脈者寒涼者然不足宜滋補氣滯津虛者有方

不通

行後如何又不通冷凝熱結不相同避年血少居經等其作尋常一例攻

薛立齋曰經水陰血也屬衛任二脉上為乳汁下為月水故其為患有脾虛不能生血者調而補之脾鬱而血不行者解而補之胃火而血不成者清而補之脾胃虛損而血少者溫而補之勞傷心火者逸而補之怒氣傷肝者和而補之肺氣虛而不能行血者補土以生金腎水虛不能生肝而血少者補脾肺以滋化源而疾自愈難經曰損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食通其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精當審而治之

不斷

經水淋漓不肯降皆因氣血本元虛或緣房事傷衛任鬱怒憂思并戴書 固經丸

踰期

七七陰陽數已終如何經脈復流通皆因真氣虛勞役邪氣停留在子宮 芩心丸

避年

斷續經期疏避年要知處女屬先天一云經度隨年轉氣血循環合自然 拱辰丹

脉經曰有婦人將一女子年十五來診言年十四時經水自下今經反斷何也師曰若是夫人親女必夫八年十四時亦以經

水下後斷所以此女亦至此而斷是為避年後當自下蓋其氣尚怯稟賦素弱而然也

李時珍曰經水一年一度者亦為避年

適來通斷 經水將行忽有寒適來通斷不相安觸經感昏紫胡治更刺期門可瀉肝 加味小柴胡湯

婦人寒熱如瘧晝則明白夜則譫語胸脇脹滿乃因血去室空風邪乘虛而入名曰熱入血室

當行不行

二七天癸任脉通過期斷絕不來紅風寒驚恐并思慮養血清心勿悞攻 柏子仁丸