

敗弩筋散

治筋被弓弩傷不能屈伸者

敗弩筋

燒存性

秦艽

去苗

杜仲

熟地

續斷

各五錢

當歸

大附子

炮去皮臍各一兩

共爲末每服二錢溫酒調服日三次

古方玉貞散

理外傷并破傷風

生南星

防風

等分

爲末每服一錢黃酒下

一童被牛傷腸出用桑皮線縫之黃龍散敷之

愈數日後肢厥腹痛服此散立驗

金瘡中風掣痛并手足不仁者用艾葉揉作團入瓦

器內點着上蓋畱一孔以孔對患處薰之良久自

瘡口着水肉如番花者着風肉硬不消者用截

血膏敷之

見跌撲門

螻蛄散

治中矢在咽喉胸膈不出者鉛子入肉不出者針快刺肉不出者

用螻蛄一箇焙爲末黃酒調服少時作痒自動自出再用螻蛄末香油調塗瘡口或煎濃汁滴患處如鮮者取腦塗之立出

衣針入腹入肉者用黃蠟靈磁石等分溶合撚如針大以涼水送下藥裹針自大便而下

酸棗核數十枚煎湯服針從原孔出外以雙仁

杏仁研如泥以車脂調塗傷處自出 綉針刺

足針以出而作痛者用黃泥罨之

砲刃等傷危重幾絕者急剖水牛腹將傷者入

腹中良久卽甦按此以氣血補氣血之良法也

業醫者守一定之方而治無窮之病愧矣

八珍湯

十全大補湯

見首卷

七真膏

見杖丹門

烏金丸

杖傷

杖傷形傷症也凡未杖之時用受杖丹等服之能令血不攻心已杖後不問已破未破卽服瓊液散力

能化瘀除疔止痛消腫而不潰且易於結痂功勝
他藥多矣氣質弱者繼之大補以培其元使脾胃
健自能營達於下也外則未破者斫之已破者玄
珠膏塗之去瘀甚速次以瑩玉膏七真膏等生肌
如肉滿而不生皮者青黛珍珠散如刑重肉糜黯
腫昏憤者剥黑羊皮乘熱貼之熱童便灌之繼以
獨參湯補之

代杖散

野紅花

卽小薊
半觔

用燒酒四觔半浸之晒之以乾

爲度臨刑時絹包二錢含口內嚙其汁任

刑不
知痛

代杖湯 臨刑時先服

土鱉 正箇

蘇木

乳香

沒藥

錢二

木耳

川山甲

丹皮

枳殼

蒲黃

歸尾

木通

甘草

各一錢

酒水煎服

如不受杖服靛花水二鍾解之

代杖丹

治情不由已事出不虞受害一身重刑難

免當預服之受刑可忍能保血不攻心

乳香

沒藥

無名異

地龍

去土

木鱉子

丁香

丹皮

肉桂

自然銅

煨醋碎七次等分一加

蘇木

右爲末煉蜜爲丸二錢重臨刑時預服一九黃

酒化下

椒鱉丸 初杖服之散血消腫輕者不用

胡椒

二兩

土鱉

三十箇

歸尾

一兩五錢

木耳

灰一兩五錢

乳香

沒藥

杏仁

桃仁

髮灰

血竭

各三錢八分

自然銅

醋碎七次五分

右爲末另用胡椒

兩半

煮汁打糊爲丸桐子大每

責十板服藥二錢熱酒送下

七真膏

乳香

去油

沒藥

去油

三七

焙

輕粉

兒茶

各三錢

射香

四分

冰片

三分

右爲末確收聽用遇杖者勿經湯水用白蜜調敷疔自化癰自散只此一敷不須再換

六真膏

治一切刑傷各樣癰疽

乳香

沒藥

血竭

三七

兒茶

各三錢

樟冰

三兩

猪脂

十二兩

碗盛承煮化入藥和勻攤敷

先將乳沒竭七藥研極細再將桂油熬化去滓入而六味攪勻听用

瑩玉膏

治杖傷消癰定痛亦治癰瘡

猪脂油

三兩

白蠟

一兩

離火入

樟冰

一兩

輕粉

五錢

冰片

三分

射香

二分

銀硃

五錢

爲末加入和勻收用

黃白散 洗杖瘡

大黃

白芷

各兩許

水煎濃汁揉洗傷處以痒至痛痛至痒瘀散見

紅爲度拭乾貼藥

一用葱薑各四兩杵爛揉去血水次貼藥

瓊液散

見夾傷

青黛珍散

玄珠膏

俱見首卷

夾傷

夾傷者禁用敷藥膏藥及泥塗等法後必作腫成膿未受刑時預服代杖丹以護心已夾後隨用銀硃

或硃砂末用燒酒調敷傷處用一人以十指尖輕
啄患者脚底先覺痒次覺痛爲止再用一二人以
筆管於患者脚面上輕輕趕之助通血脉候傷處
凹者突起四圍腫大爲度卽服瓊液散隨飲至醉
爲度次日去敷藥只用洗藥日盪三二次次日再
服瓊液散則腫易消痛易止矣如復受重刑以至
破潰者貼瓊液膏服代杖湯弱者繼之大補使氣
血壯自能營達於下則易於收功生肌時易貼太
真膏甚捷

瓊液散

治夾傷撥傷杖傷跌傷并寒濕筋骨疼痛

鬧楊花

擇去梗蒂蓋葉洗去灰沙晒乾砂鍋內微焙

爲末每服五分壯者七分先飲酒至半酣次服藥再飲至大醉爲度靜臥勿語語則發麻次日午時其麻方解消腫止疼其功甚捷連服三次全愈弱者間一日再服

洗杖傷方 夾傷腫痛用此洗之

透骨草 天門冬 天靈蓋 南星

地骨皮

陳皮

等分

象皮

切碎倍用

水煎浸洗日二三次

瓊液膏

夾撥所傷立能止疼活瘀

鬧楊花

紅花

蒲黃

白芷

歸尾

各二兩

蘇油

一觔

浸藥七日燥枯瀝去渣

入黃蠟

白蠟

各一兩

溶化稍溫入乳香

沒藥

末各六錢

冰片

六分

和勻收用

代杖湯

六真膏

俱見杖傷

破傷風

破傷風者因皮肉破被風寒外襲漸傳入裏則寒濕

交作口禁咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼

自汗傷處反為平陷其毒內攻矣宜鉗珠丹玉真

散汗之外仍貼玉真散得膿為効如汗後前症不

退傷處不高漸醒漸昏時發時止口禁不語者治不

玉真散

治破傷風牙關緊急角弓反張甚則

咬牙縮舌

南星

防風

白芷

天麻

白附子

羌活

等分

右爲末每服二錢熱酒一鍾調服更敷傷處牙

緊反張者每服二錢熱童便調服雖內有瘀血

者亦愈至於昏厥心腹尚溫者連進三服亦可

保全 風犬咬傷用漱口水洗淨搽之効

鎮風散

破傷風諸藥罔効危急者及一切猪羊

等風

魚鰾

焙

杭粉

焙

皂礬

妙紅各二兩

硃砂

三錢另研

右爲末每服二錢無灰酒調服外灸傷處知痛爲吉猪羊等風發時昏倒不省人事者每服三錢服二次不再發

臭靈丹 治破傷風及金瘡跌打

大蒜一升 黃酒四升煮一升服之須臾汗出立愈

杏仁膏 治破傷風發熱紅腫者

杏仁去皮 飛羅麪等分 新汲水調敷

紺珠丹見首 艾燠法見金 截血膏見跌

類破傷風

類破傷風者由潰瘍膿血大瀉陽隨陰散或筋脉拘

攣惡寒惕慄甚者舌強口禁項背反張痰壅便閉
汗出發熱此因虛而傳變所致形類破傷風也法
當大補氣血諸症自退如果係風症亦宜大補兼
以治風可也余每見潰瘍貼膏剪孔而患破傷風
者及用歛藥生肌反助餘毒致成敗症者多矣

發瘧

發瘧者形類破傷風是以牙緊體強肢搐背反有汗
曰柔瘧風能散氣也無汗曰剛瘧寒能瀋血也由
潰瘍亡血過多所致仲景曰瘡家不可發汗汗之
則瘧乃敗症也若大補氣血則生悞作風治則殆

治如四君六味八珍十全補中逍遙聖愈等湯俱加鈎藤丹皮枝子天麻等藥如未應獨參湯手足冷者加以桂附

四君子湯

六味地黃丸

八珍湯

十全大補湯

聖愈湯

補中益氣湯

俱見首卷

逍遙散

見癰瘰癧門

湯火傷

湯潑火傷者患自外來也然熱甚則火毒攻內令人

煩燥口乾昏憤而悶絕初傷時用冷燒酒一鍾於

無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣一吸一

呵則內之熱毒隨呵而出矣如仍作煩悶者取新
童便二碗灌之由煙燠欲灰者搗水蘿蔔汁灌之
外以燒酒蘸洗湯火傷處其冷如冰或以鹽末摻
之能護肉不壞然後敷保膚等膏二便秘者四順
清涼飲下之慎用冷水并泥浸溺致使熱毒伏於
內寒滯束於外因而不救者多

四順清涼飲

治湯火傷熱毒入裏或外被寒涼所

汲火毒內攻致生煩悶內熱口乾大便秘實者

當歸

赤芍

羌活

防風

連翹

枝子

甘草

各一錢

大黃

炒二錢

水二鍾燈心二十根煎八分服

保膚膏 治湯泡火燒及廉瘡禿瘡

大蜂房一箇血餘一元香油半燥枯半濾去渣入

黃蠟二兩溶化離火待溫入大黃末二兩

朝腦末一兩二味研勻和入任用

嬰粟膏 治湯潑火燒皮肉損爛疼苦熈熱起泡流水者

蘇油半嬰粟花三十朶無花以殼代之浸油內煎枯

濾去渣入白蠟六錢

熬化傾碗內待四邊將凝時下真輕粉細末四錢

攪勻坐冷水內用時挑破水泡攤薄紙上貼之