

本草綱目拾遺果部下目錄

諸荔殼

龍眼核殼

蜜望

蒲桃樹

苧薺粉

野苧薺

櫻桃核

山櫻桃

栗殼

刺菱

沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓

皮

猴闌子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅果

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

楊搖子

海梧子

木竹子

櫓罌子

檉子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

四味果

千歲子

候騷子

仙掌子

酒杯藤子

藥果

蘭子

楸子

隈支

呂宋果

陳果

淋味

山藥

果

陳果

龍眼

草蓼

兜草

蒲葦

蒲葦

蜜

本草圖目合參果譜不目錄

本草綱目拾遺諸穀部目錄

沙米

西國米

珠兒粉
竹米

陳倉米

朱公米

山穀

青稞黃稞

米油

鍋焦

陳久年糕

阿迷酒

酒釀

酒藁

神黃豆

緬豆
青花豆

回回豆
真甯豆

穉豆

葉附

蠶豆殼

醬油

糟油

腐

漿

沫

渣

鍋巴

泔水
麻腐

芝麻殼

艾草

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

蠶豆

山藥

青縣黃果

米

米

米

粳米

西園米

刺余米

刺余米

刺余米

本草綱目卷之六

本草綱目拾遺諸蔬部目錄

甘儲

粳粉
甘儲酒

山百合

石衣

石耳

野芋芳

青芋
野芋頭

土芋藤
鬼芋

野毛豆

野蘿蔔

地骷髏
三生蘿蔔

南瓜蒂

穰附

辣茄

刀豆根

穀附

地腎

葛乳

鮮草果

眞珠菜

鷓鴣菜

葛仙米

黃矮菜

白茄

葉蒂

天茄

牛心茄子

緬茄

醬茄

糟茄

玉瓜

節瓜

穿腸瓜

天骷髏

鬼骷髏

白鼓釘

三寶薑

彎薑

川薑

沙葱

風葱

番蒜

蒜梗

刺兒菜

波斯菜

乾冬菜

陳冬菜
陳芥菜

滷子
糞

麒麟菜

諸筍

乾筍

紅海粉

本草綱目拾遺卷八

錢塘趙學敏恕軒氏輯

果部下

諸荔

殼

陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有存者今錄之於左以備用

輿語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離枝亦曰麗枝麗離也文從兩日天地之數水一而火二故麗從兩日日爲五行之華月爲六氣之精日麗乎支猶之乎日出於扶桑也麗枝乃震木之

大者震木以扶桑爲宗子而麗支其支子故曰麗
支日出於離離盡午中故麗支以夏至熟離爲坤
之中其色黃故曰黃離麗支之核外赤內黃則黃
離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少
酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華
夏至而翕然子赤生於木而成於火也皮紅肉白
而核復純丹火包其外復孕其中也肉白爲金金
爲內外火所煉故味醇和而甘其液乃金水之精
甘又屬土備五行之粹美而以火爲主者也粵以
火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太

陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支爲長火
爲母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲
蜜一杯卽解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒
過醉則以荔支殼浸水飲之又荔支多露有過食
者味爽就樹間先吸其露次嚙其香使氤氲若醉
五內清涼則可以消肺氣滋真陰卻老還童○荔
支歲初而蕾二月而花發發時多電則花落實小
多雨則花腐少雨則花液相膠而不實估計者視
其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完
好者留蒂寸許蠟封之乃剪去蒂以蠟封剪口以

蜜水滿浸經數月味色不變

保和枝 產泉州北陳巖山蓮花峯實大色黃可
消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已
痢止腹痛

回春果 產漳郡康仙祠葉大如掌色翠與衆荔
殊其實味苦澀酸辣不可口采以浸酒能已風去
癘治癰如神葉亦然 以上閩產

紫玉環 產四川瀘洲曝乾啖一枚可除瘴癘卽
早行大霧中嵐氣不得侵也 以上川產

玉露霜 產廣東新會崖門山白殼丹為不摘經

冬不落其味甘酸啖之止嗽降肺火療怯症

妃子笑 產佛山色如琥珀大如鷺卵核小如豆

漿滑如乳啖之能除口氣使齒牙經宿猶香

牟尼光 產潮州大浦山中味如乳飲之功同參

苓 以上廣東產

墨荔 產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭而苦辣不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁二邑山中多有之味臭有大毒誤食之必心腐腸爛而死

按荔支名品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白

皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療各異故類及之

殼 痘出無漿心不爽快以荔支殼煎湯飲

不藥良方

○王聖俞云荔殼能理血透發分標凡一切疹瘡不能透達痘出模糊一片者非此不能解表成漿

血崩 同壽錄用荔支殼燒灰存性研末好酒空

心調服每服二錢輕者一服即止至重者三服愈

龍眼核

殼附

綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣止載其能治胡臭他皆未之及又不及其殼今悉採他本補之

腦漏 黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒烟起將筒熏入患鼻孔內數次卽愈

一切瘡疥 高只元傳世方用龍眼核煨存性麻油調敷卽愈

治癬 祝氏效方圓眼核二個去外黑皮搥碎雄黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共爲細末以生薑蘸擦患處卽愈○集聽方患癬用龍眼核去外黑殼用內核米醋磨擦

滅斑生髮 張覲齋云桂圓核仁凡人家有小子女者不可不備遇面上或磕傷及金刃傷以此敷

本草綱目拾遺 卷八
之定疼止血生肌愈後無癰若傷鬢髮際愈後更能生髮不比他藥愈後不長髮也

小腸疝氣 不藥良方荔支核龍眼核各七枚俱燒灰大茴二粒炒其爲末好酒調下外用生薑搗爛敷腎卽消○經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛神效荔支核炒龍眼核炒小茴香炒各等分爲細末空心服一錢以升麻一錢水酒煮送下

念珠丸 張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難忍乳香去油淨二錢圓眼核三錢黃蠟二兩和藥末成丸彈子大分爲一百零八丸蛤粉爲衣用線

穿起露一宿收貯遇症每服三九乳香湯下

小便不通 用龍眼核去外黑殼打碎水煎服如
通後欲脫者以圓肉湯飲之

足指癢爛 藥鏡用桂圓核燒灰摻之立效

無名種毒 黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱效能
止折傷出血療金創滅斑

烟筒傷喉 萬近蓬云凡烟管誤戳傷喉出血不
止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁焙搗爲極
細末看喉中傷處用筆管安末吹之卽定疼止血
而愈屢試果驗

治刀傷出血 殷仁趾傳方以龍眼核炒擣磨細敷之

刀斧傷 黃貶翁醫抄桂圓核不拘多少用火燒枯存性研末摻患處卽愈

按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核末敷金刃傷昔在西秦及巴里坤軍營救愈多人查本草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計矣

龍眼殼○乃龍眼外裹肉之殼本螯黃色聞人恐其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也廣中