

診家直訣  
二卷



診家直訣卷上

皖南建德周學海

脈象總義

總義三篇雖無奧旨而字字堅實各有著落從內經及仲景傷寒金匱書中融會得來先讀諸經再將此三篇逐字讀斷。

當覺意味深長無一字欺人語故曰直訣。

大者來去盛大也。形體空大也。小者形體不大也。來去不遠也。浮而不沈。形體薄也。沈而能浮。來勢盛也。緊有形細而堅。亦有勢艱而撼。撼者左右彈也有堅急而彈。有緩散而喘。彈爲挺瓦。脈與肌肉不親。喘則滲開。脈與肌肉無別也。緩爲至數不及。亦爲形體柔調。結爲形堅而濶。亦爲陰陽不和。故陽亢爲陽結。陰凝爲陰結。滑有暢達流利。亦有堅搏如珠。故曰滑者緊之浮名。卽動脈也。鬱者之脈多如此。數本音索。是至密而非勢洪。數又

音促。有上擊而無中止。濡主溼。弱主熱。卽緩之變也。弱主血虛。虛主亡血。卽芤之別也。實有屬氣。則類洪大。實有屬血。則類弦長。代本弱之名。而借爲止。後人乃但知止而忘弱矣。促本併迫之義。而通於止。後人亦但知止而忘迫矣。伏則無脈。沈猶有脈。而世或混稱芤爲陰虛。革爲陰僭。而世或罔辨。散有橫漫而無邊。亦有直閒而不續。橫漫必虛。直閒如濶。微有橫薄。亦有極細。亦有來去不大。亦有應指無力。長短有來去遠近。亦有尺寸伸縮。濶有起伏不勻。亦有前卻不利。脈形屬血。脈勢屬氣。血虛形虛。血實形實。氣盛勢盛。氣衰勢衰。勢衰而形實者。有氣虛不能運血。有血滿致鬱其氣。何以辨之。曰。

血累氣者。氣不虛其勢雖來去不大而按之必有樞殼。欲起之。情似動似滑。所謂陰中伏陽也。氣累血者。血不行。指下堅細而已。勢盛而形虛者。有氣亢以耗其血。有氣旺將生其血。何以辨之。曰。氣耗血者輕。診必帶弦。而來多去少。氣生血者輕。診必見濡而來去停匀。也經曰。脈濇而堅者。血實氣虛也。脈浮而大者。氣實血虛也。

指法總義

診脈之指法。見於經論者。曰舉。曰按。曰尋。曰推。曰初持。曰久按。曰單持。曰總按。無求子消息七法。曰上竟下竟。曰內推外推。曰浮按。中按。沈按。更有側指法。挽指法。輾轉指法。俯仰指法。舉而復按。按而復舉。是操縱指法。若

是者皆有舊論可攷也。至於私心所創獲，與得諸益友所陳示者，則又有移指法、直壓指法。夫脈有四科，位數形勢而已。位者，浮沈尺寸也；數者，遲數促結也。形者，短廣狹厚薄粗細剛柔，猶算學家之有線面體也。故者。斂舒伸縮進退起伏之有盛衰也。勢因形顯，斂舒成形於廣狹。伸縮成形於長短。進退成形於前後。陽氣前至，陰氣後至。故脈之動也。頭爲陽，本爲陰。三部合爲頭本，亦每部各有頭本也。起伏成形於高下。而盛衰則貫於諸勢之中以爲之綱者也。此所謂脈之四科也。而指法由此可辨矣。曰舉按以診高深也。曰上下以診前後也。上竟下竟曰尋推以診廣狹厚薄粗細也。曰初持久按以診遲數滑濶止代也。曰單持總按以診去來。

斷續長短也。病者氣口處骨肉不平。須用側指法。病者不能平臂而側置。須用挽指法。俯仰者三指輕重相騎也。輾轉者一指左右相傾也。操縱者舉按迭用以察根氣之強弱難經所謂按之奕。舉指來疾者此也。惟三指總按。橫度三關。三指縫中各有其隙。若三部脈形不同如寸濶尺滑。前小後大。卽無由得其接續之真迹矣。昔有同學示以移指法。如先診三關。再畧退半部。以食指加寸關之交。中指加關尺之交。終以有隙。而其真不見。後乃自創一指直壓之法。以食指直壓三關。而真象迸露矣。夫是法也。古人有言。祇可自怡悅。不堪持贈君。烏知世無閱之而齒冷者乎。

主病總義

病者何也。外六淫也。內七情也。六淫火暑風燥濕寒。七情喜怒思憂悲驚恐也。此十三者病之情也。有情必有證。證者寒熱虛實也。有證必有機。機者升降斂散也。然而情之傷也。傷於何藏。機之動也。動於何經。此必有地焉以載之者矣。載之者何也。曰氣而已矣。血而已矣。是故芤血虛也。遲氣寒也。伏氣閉也。代散氣脫也。濡弱虛微。氣血俱虛也。細緊氣血俱寒也。革陰盛於上也。牢陰盛於下也。洪促氣熱於氣分也。動滑氣熱於血分也。浮數氣熱於氣分也。沈遲氣寒於血分也。弦革氣寒於氣分也。緊結氣寒於血分也。細血中氣寒也。緩血中氣熱

也。長短同有氣鬱。氣橫於氣分則長。氣結於血分則短也。滑濇同有血虛。血實寒凝於血分。則實而濇熱亢於氣分。則虛而滑也。而且寒極似熱。熱極似寒。實極似虛。虛極似實。如滑主痰也。而痰亦見濇弦主肝也。而肝亦見濡。上氣喘促脈虛大也。而亦有緊細伏匿。孕脈必滑也。而亦有虛濇不調。又弦緩相反也。而風弦與熱緩相似。滑濇相反也。而熱濇與虛滑相似。搏與散相反也。而搏而累累不續。卽與散同論。洪與伏相反也。而戶厥霍亂。伏與洪同斷。長與短相反也。而長而勁。短而搏同。主氣逆氣鬱。散與結相反也。而同主癥瘕。正氣未衰則結。正氣既衰則散。亦有乍病食滯而脈散者。胃氣新亂而

未復也。或其人素有溼熱。加之新傷。而中氣益潰也。有以無脈爲病所者。芤脈中空。卽內主精血之傷也。有以有脈爲病所者。緊脈浮數。卽外主風寒之患也。抑尤有要焉。滑伯仁曰。察脈須識上下去來至止六字真訣。故審脈者。凝神於指下。起伏去來。頭本之勢。而脈之真象。無遁。卽病之升降。斂散之真機。亦迸露而無遁矣。明平此者必知脈證斷無相反。何則。有所以相反者在也。脈病斷無不應。何則。有所以不應者在也。仲景曰。邪不空見。中必有奸。景岳曰。脈之假者。人見之不眞耳。脈亦何從假哉。斯言盡之矣。

診家直訣卷下

二十四象會通

脈象至蹠。古人立二十八脈名目。不過懸象以  
提其綱。非謂脈之變化盡於此也。後人每泥其  
名而忘其實。執文字以求人脈之真象。烏能得  
其真耶。茲於物象中。檢取二十四字。以爲脈象  
提綱挈領。非敢擅易古法也。實以發明古義耳。

浮沈。以診氣之升降也。陽不能降。則脈見於浮。陰不能  
升。則脈見於沈。前人每以脈之在浮在沈。與脈之能  
浮能沈相混。能浮能沈。乃高深之義也。

遲數。以診氣之躁靜也。躁有因熱。有因燥。靜有因寒。有  
因鬱。有因虛。按內經手躁足靜。與遲數不同。手經  
之道近。其氣至也迫。足經之道遠。其氣至也緩。故有

躁靜之殊也。然先至者不能先去。必待後至者去。而始能與之俱去。故無遲數之異也。滑伯仁謂察脈須識上去來至止。至止卽察躁靜之事也。察其停於下者之久暫。又察其鼓於上者之久暫。而陰陽虛吸之躁靜瞭然矣。

強弱以診勢之盛衰也。應指有力謂之強。無力謂之弱。前人每以脈形之軟硬與脈勢之盛衰相混。內經凡言脈之大小。多指動勢之盛衰也。

剛柔以診形之軟硬也。形軟有因血虛。有因溼熱。形硬。有因血實。有因風寒。此卽內經之所謂緩急也。

滑濶以診形之枯潤也。血有餘則脈滑。血不足則脈濶。



然血由氣行故亦可徵氣之盛衰云。

氣血必有津以載之。推行始能

滑利。故內經以滑爲陰有餘。濇爲陽有餘。陰卽津液也。

促結以診氣之斷續也。二脈皆由氣滯經曰陽盛則促

陰盛則結。然氣由血滯故亦可徵血之寒熱云。

二脈當隸

於濇。但彼兼形勢強弱。此專指至數不調。

長短以診氣之鬱暢也。氣暢則雖弱而亦長。氣鬱則雖

強而亦短。按氣有出入。有升降。出入橫也。升降直

也。風寒外束。氣出不利。脈來弦緊。痰飲中結。氣升不

利。脈來厥厥如豆。是長短皆有氣鬱也。經曰長則氣

治。短則氣病。亦言其大概而已。

高深。以診氣之噓吸也。此指來去之遠近。所謂息之深

深達之疊疊者氣之操縱也浮沈是陰陽噓喞之已然高深是陰陽噓喞之方然一言氣之所在一言氣之所至

厚薄以診血之盈虛也。以形體言非浮沈之謂也。故有浮而厚有沈而薄。浮中沈三候俱有。按之不斷謂之厚。僅在一候。按之即斷謂之薄。

寬窄以診氣之寒熱也。熱則血散。寒則血斂。

堅鬆以診氣血之寒熱盈虛也。以形體兩邊之有邊無邊言。非寬窄之謂也。氣寒血盈。寬而亦堅。氣熱血虛。窄而亦鬆。亦非剛柔之謂也。剛柔指脈體之硬軟。堅鬆指脈邊之斂散。故血虛氣寒。軟而亦堅。血實氣熱。

硬而亦鬆脈中有脊而兩邊渾渾不清也。

粗細以診氣血之寒熱盈虛也。寬厚相搏謂之粗。窄薄相搏謂之細。

會通者二十四象之參伍錯綜也。浮而遲血虛而氣寒也。沈而數陰虛而陽陷也。強而剛洪緊之脈也。弱而柔微濡之脈也。薄而寬鬆浮散之脈也。厚而窄堅弦緊之脈也。學者先求二十四象各象之專義。瞭然胸中。則其參見錯出者。無不可以比例而得矣。此脈學一貫之義也。

八字真言

拙箸脈簡補義首篇求脈大指卽揭出脈象之位數形

言家選卷一  
三  
勢微甚兼獨八字。此八者一經一緯於脈象之千變萬化無不櫽括其中。能於各字中析其常變參伍錯綜隱顯畢貫則脈理靡不瞭然心目不必拘拘於二十八脈之名而三指既下卽洞見病證之源流矣此真無上妙諦也茲衍其說如左。

### 位數形勢

位數形勢者正脈之提綱也。位卽三部九候也。或在寸或在尺或在浮或在沈數以紀其多寡也。數與滑促其數皆多遲與濇結其數皆少卽屋漏雀啄蝦游魚翔舉該於數之類矣。至於形勢分見互見各有妙蘊挺立於指下而靜者形也血之端倪也起伏於指下而動者勢也。

也氣之徵兆也。內經曰。渾渾革革。至如涌泉。又曰。脈至如火。新然脈經曰。三部脈如釜中湯沸。此血不維氣。勢之獨見者也。內經曰。眞肝脈至。如循刀刃責責然。眞心脈至。如循薏苡子累累然。此氣不運血。形之獨見者也。故形勢分見者。皆氣血偏絕之死脈也。若在平人。無不氣血相融。形勢相洽矣。然氣血稍病。卽於相融相洽之中。不無彼此勝負之致。尤不可以不辨。如形勁於外者。氣悍於中。是動與大也。氣不甚悍。是弦與緊也。若氣甚歉。則爲細矣。爲芤矣。形微勝於氣者。此也。如形弱於外者。氣悍於中。是洪與滑也。氣不甚悍。是濡與弱也。若氣甚歉。則爲散矣。爲微矣。氣微勝於形者。此也。是故人之

診脈也。指到脈上先察其形之粗細硬軟再審其氣之至也。充於脈管之中微溢脈管之外既將脈形撐寬而又起伏高深有力無來去盛衰之參錯斯爲氣血和同矣。何者脈之正管其四旁必有無數微絲細管以達其氣於肌肉所謂腠理也若寒盛而陽氣不敵則微絲細管先爲寒束脈氣之來不能旁溢矣此卽緊脈之象也。更有脾肺中氣不足不能充於脈中往往脈形挺然指下而氣來如綫從脈中馳過既不能撐寬更不能起伏矣此脈形雖粗脈氣自細也更有中焦痰飲停結其溼熱濁氣上蒸肺中肺氣不能清肅脈管爲之贖菀其形挺然指下而中氣爲痰飲格拒不能暢達其來如綫過