

真中風

類中風

傷風

虛癆

醫宗必读



雲間李中梓士材父著

門人朱天定道力父叅

好孫李廷芳蘅伯父訂

真中風

靈樞經曰虛邪偏客於身半其入深者內居營衛營衛衰則真

氣去邪氣獨留發為痲痺此言邪氣深其邪氣淺者脉偏痛此

邪氣淺而中府者以痲為辨也又曰辨之為痲也身無痛者四肢不收志亂不

甚其言微細可治甚則不能言不可治也此亦言中藏之證

以志不甚亂微能言者不可治也此言中藏之證痲痺身無痛者也

志亂而不能言則不可治也痲痺身無痛者不可治也

不臥病在分肢之間巨針取之益其不足損其有餘乃可復也

此亦言中府之證。肢體必痛。且能言而神氣清明。淺而可復也。

愚按中風者。言爲風邪所中。其受病重。非若傷風之輕也。風是四時八方之氣。常以冬至之日自坎而起。候其八方之風。從其鄉來者。主長養萬物。若不從其鄉來者。付爲虛賊。風害萬物。體虛者。則中之。當時未必卽發。重感風邪。病遂發焉。藏府有俞。俞皆在背。中風多從俞入者。也。而有中府中藏中血脈之分。中府者。其病在表。多著四肢。故肢節廢。脈浮。惡風拘急不仁。外有六經之形證。太陽經證頭疼身熱脊強陽明經證目痛鼻乾不得卧少陽經證耳聾脇痛寒熱嘔口苦太陰經證腹滿自利潮乾少陰經證舌乾以少續命湯及疎風湯汗之中藏者口燥厥陰經證煩滿囊縮其病在裏。多滯九竅。故唇緩二便閉。脾不能言心耳聾腎鼻塞肺目昏。肝以三化湯及麻仁丸下之。中血脈者。病在半表半裏。

過汗恐虛其衛不可大下恐損其營惟當養血順氣以大秦其
湯羌活愈風湯和之中府者多兼中藏如左關脉浮弦面目青
左脇痛筋脉拘急目瞶頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼
中肝也用犀角散左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顛倒語言
蹇澁舌強口乾忪悸恍惚此中胞絡兼中心也加味牛黃散右
關脉浮緩或浮大面黃汗多惡風口喎語澁身重怠惰嗜卧肌
膚不仁此筋動腹脹不食此中胃兼中脾也防風散右寸脉
浮濇而短鼻流清涕面白多喘胸中官悶短氣自汗聲嘶四肢
痿弱此中大腸兼中肺也五味子湯左尺脉浮滑面目黧黑腰
脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀

脫兼中腎也。獨活散此皆言真中風也。而有氣血之分焉。氣虛者右手足不仁。用六君子加鉤藤薑汁。血虛者左手足不仁。四物湯加鉤藤竹瀝薑汁。氣血俱虛者。左右手皆不仁。八珍湯加鉤藤竹瀝薑汁。凡中風昏倒。先須順氣。然後治風。用竹瀝薑汁調蘇合香丸。如口噤。挾開灌之。如挾不開。急用牙皂生半夏細辛爲細末。吹入鼻內。有嚏可治。無嚏則死。最要分別閉與脫。三證明白。如牙關緊閉。兩手握固。卽是閉證。用蘇合香丸。或三生飲之類。開之。若口開心絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。聲如鼾。肺絕。卽是脫證。更有吐沫。血視肉。脫筋骨痛。髮直搖頭。宜如肝肺絕。卽是脫證。上據面赤如粧。汗出如珠。皆脫絕之症。大劑理中湯灌之。及灸臍下。雖曰不治。亦可救十中之一。若誤

弊而死者不可勝數故特表而出之

惟中藏之証是閉而非脫者宜蘇合香丸牛黃丸至

實丹活命金丹之類若中府與中血脉之証不宜用爲內有腐香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐反引風邪深

人骨髓如油入麵莫之能出

角弓反張陰陽經絡周環于身風氣乘虛入于諸陽之經則腰

背反折攣急如角弓之狀宜小續命湯

有汗不惡寒曰柔痙無汗惡寒曰剛痙

口噤手三陽之筋結入于頰頰足陽明之筋上夾于口風寒乘

虛入其筋則攣故令牙關急而口噤也秦艽升麻湯

用甘草

二段每段長一寸炭火上塗麻油炙乾挾開牙關令咬定約人

行十里許又換甘草一段然後灌藥極效或以蘇合香丸擦

牙或南星水片擦之

不語脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本心脾受風故舌強不語亦有因腎脉不上循喉嚨挾舌本者喉嚨者氣之所以上下會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客于會厭故卒然無音若因痰迷心竅當清心火若因濕癰管清脾熱若因風熱當清肝火若因風痰當導痰涎若因虛火上炎當壯水之主若因虛寒厥逆當益火之原神仙解語丹滌痰湯加味轉舌膏入味丸隨證選用取龜尿少許點舌神效龜置

于新荷葉上以猪

手足不隨肌膚盡痛諸陽之經皆起于手

鬚鼻內戳之立出

足而循行于身體風寒客于肌膚始為痺復傷陽經隨其虛處

而停滯與血氣相搏故風痺而手足不隨實者脾土太過當

寫其濕虛者脾土不足當補其氣血枯筋急者四物湯木旺風

瀝薑汁

自汗風多者桂枝湯若表虛者玉屏風散陽氣虛者耆附湯若
兼盜汗者補中益氣送六味地黄丸或當歸六黃湯半身不遂
譬如樹木或有一邊津液不蔭注而枝葉偏枯故知偏枯一證
皆由氣血不周經曰風氣通于肝風搏則熱盛熱盛則水乾水
乾則氣不榮精乃亡此風病之終由作也故曰治風先治血血
行風自滅古方有順風勻氣散虎骨散虎脛骨酒外用蠶沙二
石分作三袋蒸熟著患處冷再易以麤爲度內用羊脂入粳米
熬白薑椒豉煮熟日食一具十日止大效

口眼喎斜多屬胃土而有筋脉之分經云足之陽明手之大陽

筋急則口目爲僻皆急不能卒視此胃土之筋病也又云足陽

明之脉挾口環唇此胃土之脉爲病也口目常動故風生焉先耳鼻常靜故風息焉

燒皂角熏之以逐外邪次燒乳香熏之以順血脉酒煎桂枝取

汁一碗軟布浸收左啗榻右右啗榻左服清陽湯秦艽升麻湯

或三方合用外感加葱白

小便不利中風小便不利不可以藥利之自汗則津液外亡

便自少清熱止汗小便自行也

遺尿多屬氣虛宜參耆湯少加益智頻頻服之

多食風木盛則尅脾脾受尅求助于食當瀉肝理風以安脾脾

安則食自如常也

延延盛宜用吐法稀涎散或橘紅一片逆流水七碗煎至二

破頭服白湯導之。以之聖藥也。二陳湯。星龍散。竹葉湯。真中風。虛者。不若子同星香散。脉沉伏無熱者。三生飲加全蝎一個。養正丹可以墜下痰鎖。安元氣。肥人多中氣盛於外而歉于內。也。人肥必氣急而肺盛。肺金尅肝木。故痰盛。治法以理氣爲急。身痛中府者。多身痛爲風氣所束。經脉不和。宜鐵彈丸。虛寒者。十味劉散。

昏冒 心神不足。痰滯于心胞絡。宜至寶丹。或牛黃清心丸。

豫防中風 寶鑑云。凡大指次指麻木。或不用者。三年內有中風

之患。宜服愈風湯。天麻丸。薛立齋云。豫防者。當養氣血。節飲食。戒七情。遠瘴幘。若服前方。適所以招風取中也。脉中風之脉。每見沉伏。亦有脉隨氣奔。指下洪盛者。浮遲者吉。堅大急疾者。

凶 浮大為風浮遲為寒 浮數為熱亦為風 大為火 滑

為痰

三生飲 治卒中昏冒口眼喎斜半身不遂痰氣上壅或六脉

沉伏或浮盛者並宜服之但脫絕證見者難治

南星

生用一兩

川烏

去皮生用五錢

生附子

五錢

木香

二錢五分

每服五錢水二鍾薑十片煎六分服

小續命湯

通治八風五痺痲瘋等疾春夏加石膏知母黃芩

秋冬加桂附芳藥

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

炒

甘草

炙

川芎

杏仁

去皮尖炒

防已

官桂

各一兩

防風

一兩五錢

附子 炮去皮

疎風湯 治表中風邪半身不遂語言微澀

麻黃

去節三兩

杏仁

去皮尖炒

益智仁

各一兩

升麻

各五錢

每服五錢水煎熱服

三化湯

厚朴

薑炒

大黃

枳實

麩炒

羌活

各三錢

水二碗急火煎至一碗服

麻仁丸

厚朴

去皮薑汁炒

芍藥

炒

枳實

麩炒各四兩

大黃

蒸焙八兩

麻仁

別研三兩

杏仁

去皮尖炒三兩

右為末蜜丸梧子大每服三錢溫水下

大秦芩湯

秦芩

石膏各一錢

甘草炙

川芎

當歸

芍藥炒

羌活

獨活

防風

黃芩炒

白朮土炒

白芷

茯苓

生地黃

熟地黃各五

分

細辛三分

水煎服天寒加生薑五片春夏加知母一兩

羌活愈風湯

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或肢體偏

枯多思健忘

羌活

甘草炙

防風

黃耆蜜炙蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼炒麻黃去根

地骨皮

人參

知母酒炒

甘菊花去蒂

薄荷葉
白土
柏子
當歸
杜仲

秦艽
柴胡
半夏製
厚朴薑汁炒
前胡

熟地黃各二兩
白茯苓
黃芩各三兩
生地黃
蒼朮炒

石膏
芍藥各四兩
官桂一兩

每服一兩水煎服大寒之後加半夏人參柴胡木通迎而奪
少陽之氣也穀雨之後加石膏黃芩知母迎而奪陽明之氣
也季夏加防己白朮茯苓勝脾土之溼也大暑之後加厚朴
藿香桂迎而奪太陰之氣也霜降之後加當歸桂附勝少陰
之氣也

天麻丸 熱勝則風動宜靜是養血也宜和是行營衛壯筋骨
也非此藥不能治

附子一兩 炮

天麻酒浸三宿 晒乾

牛膝酒浸一宿 焙乾

草薺另研

玄參各六兩

杜仲七兩 炒 去絲

當歸十兩 全用

羌活十兩

生地黄十六兩

獨活五兩

右為末煉蜜九桐子大每服五錢空心白湯下服藥後饑

則食不饑且止大忌壅塞

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澀上焦

風熱口眼喎邪脚膝軟痛

犀角鎊

石膏各一兩

羌活去蘆

麝羊角各七錢半

人參去

甘菊花

獨活去蘆

黃耆

川芎

白朮炒

黃芩

天麻

枳殼去穰 炒

當歸去蘆

酸棗仁炒

防風去蘆

白芷各五錢

甘草炙二錢半

牛黃 另研

麝香 另研

犀角

羚羊角

龍齒 另研

防風

天麻 煨

獨活

人參

沙參

茯神 去木

川升麻

甘草 炙

白鮮皮

遠志 去木

天竺黃 各二錢半

硃砂 水飛

鐵粉 另研 麥門冬 各

右為末研令勻每服二錢麥門冬湯下

防風散

治脾藏中風手足緩弱舌強語澁胸膈煩悶志意恍

惚身體沉重

防風

麻黃 去節

人參

川芎

附子 炮去

桂心

黃耆 去蘆

赤茯苓 去皮 酸棗仁 炒

白朮 炒

獨活 去蘆

炙白皮 蜜炙 羚羊角 各七錢半

甘草 炙五錢

每服四錢水一盞薑五片煎服

五味子湯 治肺藏中風多汗惡風時咳短氣晝夜甚偃卧

胸滿息促鼻兩邊下至口上至眉色白急灸肺腧百壯若色

黃其肺已化為血不治

五味子 杏仁炒去皮

桂心各五錢

防風

甘草炙

赤芍藥 川芎各一錢

川椒二錢半

每服五錢水二盞煎至一盞服

獨活散 治腎藏中風腰脊疼痛脚冷痺弱頭昏耳聾語音渾

濁四肢沉重

獨活 附子

當歸

防風

天麻

桂心 川芎 甘菊花 枳殼 山茱萸