

全圖

名醫驗案類編

續編

第五冊

泄痢病案
瘧病案
喉病案

眼病案
牙病案

上海大東書局印行



當代全國名醫驗案類編續編目錄

二集 雜病案

第十七卷 泄痢病案

奇恆痢案·····尹性初

禁口痢案·····尹性初

飧泄案·····黃瑞書

濕溫挾痢發斑案·····李澤民

煙客洞泄案·····邱元熙

寒積五色痢案·····吳篆丹

赤痢案·····葛蔚堂

痢後脫肛案·····楊孕靈



南京中醫藥大學圖書館版權所

寒濕水瀉案.....邢玉田

寒濕痢疾冷汗如洗案.....邢玉田

寒痢夾暑案.....邢玉田

三陰虛寒下痢案.....張生甫

久痢變下瘀糞案.....李達三

寒濕痢案.....王玉玲

挾熱下痢案.....蔡菊農

噤口痢案.....吳篆丹

鬱火下痢案.....陳蓮峯

泄瀉傷脾陽案.....周錫璉

協熱下痢及痢後腫脹案.....李徵軫

痢疾案.....吳克潛



噤口痢夾食案……………俞步雲

痢疾案……………嚴子俊



當代
全國名醫驗案類編續編

二集 雜病案

泰和劉守仁山房珍藏

第十七卷 泄痢

○奇恆痢案

尹性初
湖北武昌

【病者】武昌電報局王君士華之母，年七十四，住轉角樓前街。

【病名】奇恆痢，俗名禁口痢。

【原因】素多痰，感受暑溼，至九月傷風而發。

【症候】下利赤白，裏急後重，脫肛，發熱惡寒，嘔吐不食，腹微痛。

【診斷】脈濇而緊，舌苔白厚，審係溼熱蘊蒸痰壅，胸膈則上逆而作吐，風邪滯於膚表，則營衛不和而發寒熱穢濁壅於大腸，則傳送不利，努責太過。



而脫肛。

【療法】某在旁。謂年高人不可下。余曰。年高不能勝病。當速去之。不汗。則表邪不徹。不下。則穢濁不去。蓋表邪去。則寒熱自退。痰飲蠲。則裏氣自和。膠粘除。則腸胃潔。而傳道自利。

【處方】葛根 三錢 桂枝 一錢 製蒼朮 三錢 黃連 一錢

黃芩 二錢 厚樸 二錢 木香 一錢 均薑 五分

大黃 二錢 水煎服

【次診】進一劑。寒熱解。嘔吐亦止。便能進食。前方去桂。葛加肉桂。調氣行血。

【次方】製蒼朮 二錢 厚樸 二錢 黃連 一錢 黃芩 二錢

木香 八分 均薑 五分 蘇條桂 四分

【效果】進二劑。諸症悉除。後八十二歲。以他疾終。

遠按 經言有故而隕。亦無隕也。觸類而旁通之。可知用藥以適合病情爲



準多所顧忌。反致姑息養奸。此案對於高年之人。速下以存陰。認證既的。處方亦當。可爲畏首畏尾者作南鍼也。

○禁口痢案

尹性初
湖北武昌

【病者】曾君紫墩之室人。年三十餘。住武昌保安門內。

【病名】禁口痢。

【原因】素有煙癖。感受溼熱而起。

【症候】下利膿血。紅白相兼。裏急後重。腹痛甚劇。日夜數十行。迭醫無效。遷延月餘。

【診斷】脈沉濇而緊。審知溼熱蘊結。膠粘穢濁。壅於腸胃。屢治無效。非用藥不當之過。乃鴉片收濇之過也。

【療法】用沉香末。調於煙膏之內。變收濇之品。而爲化氣之用。疏方調氣行血。另用沉香、肉桂、明礬治痢之品。爲末冲服。



【處方】製蒼朮 三錢

川厚樸 二錢

淨歸身 三錢

川黃連 一錢

黃 芩 二錢

枳 榔 二錢

桃 仁 二錢

炮附塊 二錢

大 黃 二錢

芒 硝 三錢

水煎服

又沉香 三分

肉 桂 二分

明 礬 三分

各為末沖服日三次

又所吸煙膏必調沉香末以斡旋之。

【次診】進二劑痢漸減後重漸除仍依前法。

【次方】諸如前法惟煎方去芒硝一味。

【效果】進六七劑而全愈。

【遠按】吸煙者患病用藥難效易致不救此案細心體貼分頭施治故能化

險為夷膽欲大而心欲小凡事皆然行醫者尤當奉為圭臬

○ 飢泄案

黃瑞書 麥根路麥根里
六弄八七〇號

【病者】許閣英年五十八歲木商住麥根路福新里第七弄第一家



【病名】飧泄

【原因】素有肝脾氣鬱。溼蘊三焦而爲腹癢。氣撐作痛。加以煙體。腸燥便難。恣服瀉丸。遂致泄瀉完穀。四日不止。

【症候】泄瀉完穀。日夜十餘次。已經四日。舌質光紅。苔分二截而膩。脈虛細。胃納不貪。

【診斷】此中氣虛而脾陽下陷。腎陽衰而腸溼有餘。丸藥直攻。徒傷脾腎之陽。溼仍不化。

【療法】仿東垣補中益氣合連理湯出入爲法。

【處方】焦白朮 二錢

砂仁拌熟地 三錢製附子片八分同炒

赤豬苓 各三錢

細川連 二分炮薑四分同炒

煨訶子肉 一錢

車前子 三錢

炙升麻 一錢半

炙鷄內金 一錢半

石蓮子肉 三錢

煨葛根 二錢

焦穀麥芽 各二錢

荷葉蒂 一枚



【覆診】三劑後泄瀉完穀即止。惟溏泄日有數次。胃納稍貪。膩苔略化。脈仍虛細。乃脾胃之陽漸振。中氣升舉有權。腸溼亦因之稍化。前法既效。仍遵前意擴充之。

【次方】砂仁炒大熟地

三錢製附子片八分同炒

煨肉菓 一錢

赤豬令 各三錢

焦冬朮

二錢炮薑四分同炒

炒潞黨參

二錢焦六麵三錢同炒

炙鷄內金

一錢半

炙升麻

一錢半

石蓮子肉 三錢

焦穀麥芽

各二錢

車前子 三錢

荷蒂 二枚

伏龍肝 二兩

煎湯代水

【三診】泄瀉已止。每日尚便下溏糞二次。穀納遞增。膩苔化清。舌紅亦淡。惟小便不爽。顯係脾腎通調。陽氣敷佈如常。而大腸溼濁未盡。膀胱氣化失宣。再與前法參分利州都。

【三方】潞黨參

三錢焦六麵三錢同炒

連皮苓 四錢

木通草 各八分

大熟地

三錢砂仁拌炒

製附子片 六分

車前子 三錢

野於朮 一錢半根殼八分同炒

炙升麻 一錢



漢防己 三錢

野料豆 三錢

炒薏仁 三錢

【效果】此係高年脾腎氣陰並虛。服瀉丸而致飧泄完穀者。中氣下陷。清陽不舉。腑蘊溼濁而然。始終用補中益氣。合連理湯。出入爲法。三診即愈。

【遠按】東垣脾胃論。久已無人能讀。蛩然足音。極爲可喜。亟錄之。

○溼溫挾痢發斑案

李澤民 寄居漢口橋口

【病者】李宗藩。年十四歲。住安徽太平縣。

【病名】溼溫挾痢。

【原因】民國十六年初秋。學校暑假未滿。宗藩好鬪蟋蟀。日暴露侵。致受溼溫。

時當九月。因秋風涼束而出病。兼之平日喜食瓜果生冷。夾有積滯。

【症候】初起身發寒熱。繼則但熱不寒。痢下紅白。噤口不納。裏急後重。腹中絞痛。時劇時緩。心中煩燥不安。

【診斷】脈來左部沉數。右部洪濇。舌苔黃膩。間有微白。症脈合參。乃溼溫挾痢。



也。溼與熱合。故脈左數而右洪。積滯內留。與溼熱相蘊。故脈有沉澹之象。此腹中絞痛之所以見徵也。按痢名腸澼。又名滯下。溼傷氣分。則下白痢。熱傷血分。則下赤痢。溼熱互傷。痢兼紅白。其裏急後重者。肺氣不流通之故也。太陰陽明合病。法當兼治。

【療法】清熱透溼。化滯理氣。方用銀花連翹清表裏之邪。黃芩薏仁大豆卷透

溼而清熱。神耬枳殼萊菔子化滯而理氣。苦桔梗開提肺竅以通大便。

【處方】金銀花 二錢

條黃芩 一錢二分酒炒

六神耬 一錢五分炒焦

青連翹 一錢五分

生薏仁 三錢

陳枳殼 一錢

苦桔梗 一錢

萊菔子 二錢

粉甘草 一錢

【次診】痢稍輕。腹痛未止。時緩時劇。尙有積滯逗留未去。因思葉案所載。熱甚

於裏者。當用黃連以清熱。火實而痛者。宜增大黃以逐邪。

【次方】金銀花 二錢

苦參 一錢

篇豆衣 一錢五分

宣黃連 五分

西錦紋 一錢五分酒炒

粉甘草 一錢

廣木香 一錢

六神糰 一錢五分炒焦

生穀芽 三錢杵

【三診】身熱已退。痛痢均止。因口納不慎。又作腹痛。病家另延某醫。藥用溫燥。前象均復。勢暴更甚。又延愚診。腹痛甚劇。紅斑隱現。二便忽不通暢。愚曰。雖因藥誤。本有伏熱膠固未除。因以麝香五厘。放於臍內。將青葱連根搗爛。敷於麝上。蓋以薄麵餅一枚。用常穿鞋底烘溫。連熨兩次。止其腹痛。方擬涼膈疎斑。

【三方】青連翹 一錢五分

川鬱金 一錢五分

粉丹皮 一錢五分

金銀花 二錢

雲茯苓 一錢五分

大力子 一錢五分

生石膏 二錢研末

山梔子 一錢五分炒焦

枳實汁 清水磨汁一杯冲服

【四診】紅斑上隱下現。下隱又復上現。二便已通。煩燥未除。王孟英云。溼溫之為病。如剝蕉。抽繭。層出無窮。此之謂也。溼隨熱化。治當專究陽明。方擬



化斑清熱。

【四方】生石膏 三錢 研末

肥知母 一錢五 分去毛

粉甘草 一錢

金銀花 二錢

金石斛 二錢

金汁 一酒杯 沖服

犀牛黃 一分五厘 分二道沖服

粉丹皮 一錢 五分

先將白茅根去衣一兩煎汁去渣後入前藥同煎。

【五診】紅斑漸沒精神清爽胃醒能納因元氣大虧面浮足腫方凝養胃清熱。

內用茯苓澤瀉通行三焦水道淡不損胃。

【五方】北沙參 三錢

雲茯苓 二錢

肥知母 一錢五 分去毛

杭寸冬 二錢 去心

建澤瀉 一錢 五分

白朮豆 二錢 杵

生穀芽 三錢 杵

粉甘草 一錢

白茅草根 四錢 去衣洗淨

【效果】當第五診時面浮足腫病家問於予曰症雖治愈浮腫亦為大患予曰

此虛腫也元氣復則自除矣因於養胃清熱中佐以通行水道之品四

劑而腫退全安。



〔遠按〕外感挾痢、勢難兼顧、最爲棘手、看他剝蕉抽絲、層層清解、手腕敏活、可法也。

○烟客洞泄案

邱元熙
上海小西門迎勳路

〔病者〕陳左、四十五歲、住陸家浜、

〔病名〕洞泄、

〔原因〕邪之所湊、其氣必虛、加以嗜癮之體、中虛有素、寒邪直犯中宮、莫之能禦。

〔症候〕便泄直下、腹部隱痛、胸窒欲嘔、納飲不進、脈象弦緩、舌苔白膩。

〔診斷〕脾爲中土而從溼化寒、溼困於太陰、中陽斡旋不力、烟客命火必衰、火衰不能生土、肝木侮其所勝、而成洞泄之候。

〔療法〕溫中土以扶陽、抑木健太陰、以化溼止瀉。

〔處方〕淡吳萸 五分

土炒白朮 錢半

采芸耬 三錢

大腹絨 錢半

炮黑薑 四分

焦白芍 三錢炒仁四分拌

煨木香 一錢

熟半夏 錢半

炒枳殼 錢半

熟穀芽 三錢

雲茯苓 三錢

清炙草 五分

猪桂心 四分飯丸分吞

【二診】嘔泄均止。腹痛已緩。納飲稍進。中陽漸振。脈形弦緩。舌白苔薄。再與和

化。

【二方】土炒白朮 三錢

新會皮 錢半

焦查炭 三錢

清炙草 五分

焦白芍 三錢

采芸糲 三錢

製半夏 錢半

煨木香 一錢

春砂仁 四分杵

大腹絨 錢半

熟穀芽 三錢

【效果】首方即已生效。次方善後而已。

【按】烟客泄利，最爲棘手。況係洞泄頃刻有亡陽之虞，非用薑桂恐致遷

延貽誤。

○寒積五色痢案

吳篆丹 江西景德鎮



南京中医药大学图书馆版权所有

【病者】劉姓、年已六十、住劉聚源筆店、

【病名】五色痢、

【原因】寒滯下痢。醫藥亂投。藏真日敗。

【症候】痢已月餘。五色兼見。日夜數十行。咳甚不能臥。口渴不引飲。

【診斷】脈軟。滿舌濁膩而厚。係沉寒痼積。陰凝不散。且胃納極少。久痢滑脫。屬

虛無疑。

【療法】主以真人養藏湯。參朮扶元健脾。歸芍養血斂陰。肉果訶子等澁腸收肺。

【處方】別直參

錢半
炮沖

炒白芍

錢半

炒訶子

三錢

土炒白朮

二錢

煨肉果

一錢

炒粟殼

三錢

炒歸身

錢半

煨廣木香

八分

炙甘草

六分

【效果】服後痢減咳少。食增。惟煩燥不寧。症屬戴陽。原方加肉桂五分。遂漸愈。



南京中醫藥大學圖書館版權所有