

普濟本事方

○腸風瀉血痔痛臟毒

治腸風瀉血久不止玉屑圓

儀真許

叔微述

槐根白皮

去麋皮

苦楝根白皮

去麋皮 各三兩

椿根白皮

去麋皮四兩三味於九月後二月前取乾者日乾

天南星

半夏

各半兩 並生

葳靈仙

一兩去苗洗

寒食麪

三兩

右為末滴水圓如桐子大乾之每服三十圓水八分

一盞煎沸下圓子煮令浮以匙抄取溫溫送下不嚼

空心食前頃年有一人下血幾盈盆頓爾疲茶諸藥

皆不効。予曰：此正腸風。今服玉屑圓三服，止。予苦此疾三十年，蓄下血藥方近五十餘品，其間或驗或否，或始驗而久不應者，或初不驗，棄之再服，有驗者未易立談。太抵此疾品類不同，對病則易愈。如下清血色鮮者，腸風也；血濁而色黯者，臟毒也；肚門射如血線者，蟲痔也。亦有一種下部虛，陽氣不升，血隨氣而降者，仲景云：脉弦而大，弦則爲減，大則爲亢，減則爲寒，亢則爲虛，寒虛相搏，此名爲革。婦人則半產漏下，男子則亡血失精。此下部虛而下血者也。若得革脉，却宜服溫補藥。蟲痔宜薰千金用蜎皮艾者佳。予嘗

千金薰蟲痔方

蝟皮

方三指
大切

薰黃

棗大
末

熟艾

雞子
大

右三味穿地作孔調和取便薰之口中薰黃烟氣出
為佳火氣消盡即停停三日將息更薰之凡三度永
差勿犯風冷囊臃將補忌猪雞等

治臟毒蒜連圓

鷹爪黃連末用獨頭蒜一顆煨香熟爛研和入臼治
圓如梧子大每服三四十圓陳米飲下此藥神妙

治腸風臟毒槐花散

槐花炒

柏葉爛杵

荊芥穗

枳殼去穰細切
麩炒黃

右修事了方秤等分細末用清米飲調下二錢空心
食前服

巢氏病源論腸癖為痔久困飽食過度房室勞損血氣
流溢滲入大腸衝發於下時便清血腹中刺痛病名脉
痔又論脾毒腸風本緣榮衛虛弱風氣進襲因熱乘之
便血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血宜椿皮
圓

臭椿白皮去粗皮
焙干四兩

蒼朮泔浸丁亥去皮
日干不見火

枳殼去穰細切麩
炒黃各二兩

粗皮作自采去皮

右細末醋糊圓如梧子大空心食前米飲下三四十圓

治腸痔在腹內有鼠爛下血方

白蕪荑

貫衆 刮去黑皮

狼牙根

椿 東引根白皮

槐 東引根白皮

蛻皮 炙焦各一分

雄黃 半兩水飛

白鱧頭 炙焦一个

右細末臈月猪脂和一圓彈子大綿裹內下部日三易

治痔有鼠乳結核作渴疼痛方

皂角 去皮弦醋炙

黃芪 蜜炙

荊芥穗 作餅

木香

露蜂房 炒黑

蛻皮 炙焦黃剉

鱉甲 淡醋煮去裙膜洗淨酸醋炙黃

桔梗 炒

六... 治風濕血痔痛腫毒

穿山甲

剉碎蚌粉炒

芍藥

各一兩

大黃

濕紙裏煎

此四字作炮三十

右細末煉蜜圓如梧子大每服二三十圓溫湯下食

前日三服未知加至四十圓

治遠年腸風痔痛黃芪圓

黃芪

蜜炙

枳殼

去穰細切麩炒黃

葳靈仙

去苗洗各二兩

續斷

洗推去節剉焙

槐角子

北礬

括

當歸

洗去茅切焙干炒

干姜

炮

附子

炮去皮臍

生乾地黄

連翹

炒各半兩

右細末煉蜜圓如梧子大米飲下三十圓晁推官方

治腸痔驚甲圓

鼈甲 淡醋煮去裙膜 洗淨 酸醋炙黃

蝟皮 炙黃 焦剉

穿山甲 剉碎 蚌粉炒

白礬 枯

附子

焙去_{三四}皮臍_二

猪牙皂角

各半兩 炙焦 存_二分_一性

麝香

一分 研

右細末研勻蒸餅圓如梧子大 米飲下二十圓 食前

日三服

又方

槐花 炒

白礬 枯各 一兩

附子 半兩 炮 去皮臍

右細末蒸餅圓如梧子大 每服二十圓 米飲下 食前

日三服 以上二方 麗老方

○ 衄血勞瘵吐血咯血

衄血勞瘵吐血咯血

治衄血無時茜梅圓

茜草根

艾葉

各一兩

烏梅肉

焙干半兩

右細末煉蜜圓如梧子大烏梅湯下三十圓

經云天暑地熱經水沸溢蓋血妄行陽勝陰也鞠運若

茂之嘗苦此疾予授此方令服後愈三黃散亦得

三黃散

大黃

一兩濕紙裹甌上蒸

黃連

半兩去鬚

黃芩

去皮半兩

右細末每服二錢新水調下蜜水亦得

山梔子散

山梔子不拘多少燒存性末之搗入鼻中立愈

蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄吐血甚已死

入殮血尚未止偶一道人過門聞其家哭詢問其由

道人云是曾服丹或燒煉藥予有藥用之即括囊間

出此藥半錢七吹入鼻中立止良久得活併傳此方

治鼻衄過多昏冒欲死方 梅師方

用香墨濃研點入鼻中

潤肺安血止嗽治吐血咯血天門冬圓

天門冬 一兩水 漉去心 茸艸 炙

貝母 去心 炒 白茯苓 去皮

杏仁 去皮尖 炒熟

阿膠 碎之蛤粉炒成 珠子各半兩

右細末煉蜜圓如彈子大含化一圓嚥津日夜可十

吐血勞瘵吐血咯血

圓不拘時候

因嗽咯血成勞眼睛疼四肢倦怠脚無力黃芪散

黃芪

蜜炙

麥門冬

本泄去心

熟地黃

酒酒九蒸丸曝焙秤

桔梗

炒各半兩

甘草

一分炙

白芍藥

半兩

右麩末每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓温

服日三名

治久嗽咯血成肺痿多吐白涎胸膈滿悶不食白扁豆散

白扁豆

飯上蒸

生薑

各半兩

枇杷葉

去毛

半夏

湯浸七次

人參

去

白朮

各一分

白茅根

分三

右細剉水三升煎至一升去滓下栝榔末一錢和勻分四服不拘時候

治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳剪草膏

剪草一斤婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜一斤和爲膏以器盛之不得犯鐵九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙抄藥和粥服每服四匙良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄

行每服一匙可也

有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之爲屋土墜器中不可服再合既成又將服爲猫覆器又不可食又再作未就而是人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈或云是陸農師夫人鄉人艾孚先嘗親說此事渠後作大觀本草亦收入集中但人未識不苦信爾

○眼目頭面口齒鼻舌唇耳諸疾

鎮肝明目羊肝圓

肝若大止用

甘菊花 去萼 梗 栢子仁 研 羌活 去

細辛 去葉 官桂 不見火 白朮

五味子 揀各半兩 黃連 三分 去鬚

右細末煉蜜圓如梧子大空心食前溫水下三四十圓

又方

白羯羊肝 只用于肝一片薄切新瓦上焙乾

車前子 麥門冬 水浸

薤仁 决明子 澤瀉

地膚子 去殼 防風 去 黃芩 利

熟地黃 酒酒丸蒸 兎絲子 酒浸曝乾

本草方 卷五 眼目頭面口齒鼻舌唇耳諸疾

白茯苓 度 虫

五味子 揀

枸杞子

荒蔚子

杏仁 大者去 皮尖炒

細辛 華陰者 去葉

苦草蘆 炒令 香

桂心 不見 火

青箱子 已上各 一兩

右細末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓溫水下日
三服不拘時候

張臺卿嘗苦目暗京師醫者令灸肝俞遂轉不見物因

得此方服之遂明有一男子內障醫治無効因以餘

劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如隔門縫

見火者及且視之眼中翳膜且裂如線張云此藥靈

勿妄與人忽之無驗予隘之且欲廣其傳也

羌活 去

川芎 洗

旋覆花 去梗

防風 去 各半兩

甘草 炙

蒼朮 薄浸一夕去皮 日乾不見火

楮葉 自采下不生 楮子煮

桑葉 並八月採曬乾 押已上各一兩

甘菊花

楮實

蟬退 去

木賊 各一分

右木臼中治為末茶清調下二錢早晚食後臨臥各

一服

暴赤眼亦治赤眼忌濕麵及酒楮葉須真無實者餘不

堪不爾諸藥悉無効合時不得焙及犯鐵器予觀此

方取楮葉必無實者蓋陰陽二物相匹配爾有實者

陽也無實取業者陰也所以不得其真諸藥悉無効
治肝腎風毒熱氣上衝眼痛菊花散

甘菊花

牛房子

炒熟各八兩

防風

三兩去

白蒺藜

一兩去刺

甘艸

一兩半炙

右細末每服二錢熟水調下食後臨臥

素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝主目昏肝傷則自生風熱氣上湊目其昏亦甚不可專服補藥須服益血鎮肝明目藥地黃圓

熟乾地黃

酒酒九蒸九曝焙乾秤一兩半

黃連

一兩去鬚

决明子

沒藥

甘菊花

研別