

95215

鼎鑊幼幼集成卷之二

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勣宋孟氏 校正

遂陽周宗顧虛中氏 參定

○胎病論

兒之初生有疢亦惟胎弱胎毒二者而已矣胎弱者稟受於氣之不足也子於父母一體而分而稟受不可不察如稟肺氣爲皮毛肺氣不足則皮薄怯寒毛髮不生稟心氣爲血脈心氣不足則血不華

色面無光彩受脾氣爲肉脾氣不足則肌肉不生
手足如削受肝氣爲筋肝氣不足則筋不束骨機
關不利受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不
能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強
母弱生女必羸父弱母強生兒必弱故小兒有頭
破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不齊
髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足
之故也

胎毒者卽父母命門相火之毒也命門者男子以藏

精女子以繫胞道家謂之下丹田也夫二五之精
妙合而凝純粹之精鎔液而成胎淫佚之火蓄之
則爲胎毒矣蓋人生而靜天之性也感物而動人
之欲也成胎之後其母之關係尤緊凡思慮火起
於心悲怒火生於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於
脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胞遂結爲胎
毒凡胎毒之發如蟲疥流丹濕瘡癰癰結核重舌
木舌鵝口口瘡與夫胎熱胎寒胎搐胎黃之類是
也更如一七之臍風百日之咳嗽半歲之真搐一

週之流丹此又毒之至酷至烈而不可解者也

胎寒者母娠時患熱病多服寒涼之藥又或過食生冷令兒受之生後昏昏多睡間或覘乳瀉白此內因也或百日之內忽病戰慄口冷手足踈曲不伸腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫散指迷七氣湯助胃膏爲佳

胎熱者母娠時喜食辛熱炙燂之物或患熱病失於清解使兒受之生後目閉面赤眼胞浮腫弩身呢呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澁此胎熱

也。若不早治，則丹瘤瘡癰由此而至，宜集成沉瀝丹，徐服解之以平爲度。

胎搐者，母娠時曾因驚恐，氣傳於子，生後頻頻作搐，其後身熱面青，手足搐掣，牙關緊閉，腰直身僵，睛邪目閉，多啼不乳，此乃胎癇不治之證。如因身有熱而作者，必先啼叫，雖曰胎病，由外因也。宜天麻丸，後以六味地黃湯滋其化源，久服自愈。

盤腸氣者，幼科稱內吊者是也。皆因胎氣鬱積壅結，榮衛五臟六腑無一舒暢，其氣不能升降，築隘腸

胃之間抵心而痛其聲輓輓如猫吐惡乾啼口開
手足皆冷宜疎散通氣調中散及木香丸

臍突者小兒多啼所致也臍之下爲氣海啼哭不止
則觸動氣海氣動於中則臍突於外其狀突出光
浮如吹起者捏之則微有聲用亂髮燒灰枯礬等
分爲細末敷突臍上以膏藥貼之自消

不乳者小兒生下三二日間忽然不乳當詢問之勿
以不乳作臍風治蓋臍風有多啼撮口之證此則
無之但不乳耳有吐乳乳之又吐者或因拭口不

淨惡穢入腹也宜用檳榔木香甘草煎湯與服如啼哭不乳者腹痛也亦胎寒之證宜木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服如無已上諸證無故不乳宜問其母之乳汁多少乳多者傷乳也宜少節之不久自思乳矣乳少者必有他證細心察之

胎黃者兒生下面目渾身皆黃如金色或目閉身上壯熱大便不通小便如梔子汁皮膚生瘡不思乳食啼哭不止此胎中受濕熱也宜茵陳地黃湯母子同服以黃退爲度

胎肥者兒生下遍身肌厚肉色通紅面色亦紅而黑
睛多時時生痰自滿月以後漸漸肌瘦五心熱而
大便難白睛粉紅色此名胎肥是亦在胎時母食
甘肥濕熱太過流入胞中以致形質虛肥血分壅
熱也加減大連翹飲外以浴體法浴之

胎怯者生下面無精光肌肉瘦薄大便白而身無血
色目無精彩時時哽氣多噦者此卽胎怯也非育
於父母之暮年卽生於產多之孕婦成胎之際元
精既已澆漓受胎之後氣血復難長養以致生來

怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散助之

○入方

指迷七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出入無刻不與天道陰陽之氣通故六淫外襲則感而致病翕受之理也內氣閉塞則天道不通升者不升降者不降寒熱由此而生也是方疎利臟腑

神化無方最宜領會

廣陳皮 杭青皮 藿香葉 芽桔梗 蓬莪朮

香附米 法半夏 上肉桂 公丁香 益智仁

老生薑 大紅棗 炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏

治胎寒內釣胃氣虛弱胸脇脹滿呢乳便青

白豆蔻

肉豆蔻

麴包煨
去油

官揀參

廣木香

各五

錢

公丁香

三錢

藿香葉

雲茯苓

漂白朮

土炒

真青桂

西砂仁

炙甘草

各一兩

廣陳皮

一兩二錢

洋沉香

二錢

懷山藥

兩五

爲末蜜丸芡實大每一丸炒米湯化服

集成沆瀣丹

音亢械北斗夜半所降之甘露也

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉鵝口口瘡

重舌木舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉

結麻疹斑癰遊風疥癬流丹癰疹痰食風熱疥腮

面腫十種火丹諸般風搐並皆神效

此方古書未載得之異授微似古之神芎丸近有

能者妙出化裁而增損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主治蓋凡臟氣流通者必不鬱滯或受毒於妊前或感邪於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證方內所用黃芩清上焦之熱黃柏清下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新之功活血除煩之力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮苦寒凝臍後加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之佐使川芎薄荷引頭面風熱從高而下趨連翹解毒除煩赤芍調榮活血牽牛利水走氣分而

舒鬱滑石清潤抑陽火而扶陰又能引邪熱從小
便而出用治以前有餘諸證應如桴鼓予生平最
慎攻伐惟此方用之最久功效莫能殫述真濟世
之良方也

杭川芎

九錢
酒洗

錦莊黃

九錢
酒蒸

實黃芩

九錢
酒炒

厚川柏

九錢
酒炒

黑牽牛

炒取頭末六錢

薄荷葉

四錢
五分

粉滑石

水飛六錢

尖檳榔

七錢五分
童便洗晒

陳枳殼

四錢
分炒

淨連翹

除去心隔取淨六錢

京赤芍

六錢
炒

右十一味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜爲

丸如芡實大月內之兒每服一丸稍大者二丸俱用茶湯化服乳母切忌油膩但覺微有泄瀉則藥力行病即減矣如不泄再服之重病每日三服以愈爲度此方斷不峻厲幸毋疑畏惟胎寒胎怯面青白者忌之

天麻丸 治胎穉先以此丸通其經絡次服地黃丸

明天麻

薑製

法半夏

北防丰

川羌活

牛膽星

直殭蠶

北全蝎

各五錢

爲末蜜丸芡實大每一丸鈎藤湯下

六味地黃丸

卽仲景所製金匱地黃丸、原治腎水虧損、小便淋瀝、頭目眩暈、腰腿酸軟、陰虛發熱、自汗盜汗、憔悴瘦弱、精神疲困、壯水之主、以制陽光、此方是也、

錢仲陽以之治小兒胎怯、稟受先天不足、併肝疳白膜遮睛、瀉血失音、身瘦瘡疥、腎怯語遲、解顱行遲等證、

薛立齋又以治小兒肝經血虛燥熱、腎經虛熱作渴、小便淋秘、痰氣上壅、或風淫客氣、癰癰結核、或

四肢搐搦、眼目睜動、或欬血吐血、頭目眩暈、或咽
喉燥痛、口舌生瘡、或稟腎不足、解顱失音、五遲五
軟、腎疳肝疳、凡腎肝不足之證、皆宜用此以滋化
源、其功不能盡述、

予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足、誠卓
然有識者、予所敬佩、奈今之小兒、體質元氣、更不
及前、古以地黃丸爲補劑、今則實爲涼劑矣、此藥
用於陰虛枯燥者、誠爲得宜、倘兒肌肥面白、脾弱
多痰者、服此必致膩膈、變生他證、其害不小、非方