


灰黑胎乾紋裂舌



土邪勝水而舌見灰

黑紋裂涼膈調胃皆

可下之干中可救

三下後渴不止熱不

退者不治。




# 灰根黃尖中赤舌



舌根灰色。而中紅尖黃。乃腸胃燥熱之證。若大渴譫語五六日不大便。轉矢氣者。下之。如濕病熱病惡寒脈浮者。涼膈雙解選用。




# 灰 色 重 暈 舌



此瘟病熱毒傳遍三  
 陰也。熱毒傳內三次  
 舌卽灰暈一層。毒盛  
 故有灰暈最危之證。  
 急宜涼膈雙解解毒。  
 承氣下之。一暈尙輕。  
 二暈爲重。三暈必死。  
 亦有橫紋二三層者。  
 與此重暈不殊。

# 灰黑乾刺舌



灰黑舌中又有乾刺  
而見咽乾目燥喘滿  
乃邪熱結於少陰當  
下之然必待其轉失  
氣者方可下若下之  
早令人小便難





灰 黑 尖 舌

紅

灰黑


已經汗解而見舌尖  
灰黑有宿食未消或  
又傷飲食邪熱復盛  
之故調胃承氣湯下  
之



南京中医药大学图书馆版权所有

# 灰黑尖乾刺舌


紅



舌尖灰黑有刺而乾  
是得病後猶如飲食  
之故雖證見耳聾腸  
痛發熱口苦不得用  
小柴胡必大柴胡或  
調胃承氣加消導藥  
方可取效



灰 中 墨 滑 舌




淡淡灰色中間有滑  
 胎四五點如墨汗此  
 熱邪傳裏而中有過  
 食未化也大柴胡湯



中医药大学图书馆版权



舌少根黃多黑灰



舌灰色而根黃乃熱  
 傳厥陰而胃中復有  
 停滯也傷寒六七日  
 不利便發熱而利溼  
 出不止者死正氣脫  
 也



淡 灰 中 紫 舌



舌淡灰黑而中淡紫  
 時時自嚙舌尖為夾  
 乃少陰厥氣逆上非  
 藥可治



北京中医药大学图书馆版权所有



修  
金  
余



紅色舌總論

夫紅舌者伏熱內畜於心胃自裏而達於表也仲景云冬傷於寒至春變爲溫病至夏變爲熱病故舌紅面赤又有瘟疫疫癘一方之內老幼之病皆同者舌亦正赤面加積胎也若更多食則助熱內蒸故舌紅面赤甚者面目俱赤而舌瘡也然病有輕重舌有微甚且見於舌之根尖中下左右瘡蝕脹爛癢細長短種種異形皆瘟毒火熱蘊化之所爲也其所治亦不同當解者肉解其毒當砭者砭去其血若論湯液無過大小承氣黃連解毒三黃石膏等比類而推可也





南京中医药大学图书馆版权所有

純紅舌



紅

舌見純紅色乃瘟疫  
之邪熱初蓄於內也  
宜敗毒散加減或升  
麻葛根湯等治之。






紅 中 淡 黑 舌



舌紅中見淡黑色而  
 有滑者乃太陽瘟疫  
 也如惡寒有表證雙  
 解散合解毒湯微散  
 汗之汗罷急下如結  
 胸煩燥直視者不治




紅 中 焦 黑 舌



舌見紅色。中有黑形  
 如小舌。乃瘟毒內結  
 於胃。火極反兼水化  
 也。宜涼膈散。若黑而  
 乾硬。以指甲刮之。有  
 聲者。急用調胃承氣  
 湯下之。



紅中黑斑舌



見小黑斑星於紅舌  
上者乃瘟熱乘虛入  
於陽明胃熱則發斑  
也或身上亦兼有紅  
赤斑者宜黑參升麻  
湯化斑湯等治之。