

書匯彙編成卷二十一

泉江蔡宗玉茗莊手輯

男婦 綬 受采 校刊

婦科

男女有生之後。男則氣血俱足。女則氣有餘而血不足。至於病。外感內傷之症。未嘗不同。但女則別有調經胎前產後之別。

故更立一科。調經專以理氣補心脾為主。胎前專以清熱和脾為主。產後專以大補氣血行滯為主。餘病與男同者。治不重出。

調經 辨色 審多少 先期後期 身痛 腹痛 發熱 寒熱 熱入血室 月水不斷 月水不利 過期不止

梅論

大全云。經曰。女子七歲。腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。天謂天真之氣。癸謂壬癸之水。壬為陽水。

配丁而化水。癸為陰水。合戊而化火。故曰水火者。陰陽之徵兆也。女子陰類。故得癸焉。衝為血海。任主胞胎。二脈流通。經血漸盈。應時而下。天真氣降。與之從事。故曰天癸也。常以三旬一見。以象月盈則虧。不失其期。又名月信也。若遇經行。最宜謹慎。否則與產后症相類。若被驚恐勞役。則血氣錯亂。經脈不行。多至勞瘵等疾。若逆于頭向肢體之間。則重痛不寧。若怒氣傷肝。則頭昏脇痛。嘔吐。而生瘰癧瘡瘍。



書匯彙編成卷二十一

泉江蔡宗玉茗莊手輯

男婦 綬 受采 校刊

婦科

男女有生之後。男則氣血俱足。女則氣有餘而血不足。至於

病外感內傷之症。未嘗不同。但女則別有調經胎前產後之

故更立一科。調經專以理氣補心脾為主。胎前專以清熱和脾

主產後專以大補氣血行滯為主。餘病與男同者治不重出

調經辨色 審多少 先期後期 身痛 腹痛 發熱 寒熱

熱入血室 月水不斷 月水不利 過期不止

大全云。經曰。女子七歲。腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。任脈通

太衝脈盛。月事以時下。天謂天真之氣。癸謂壬癸之水。壬為陽水

癸水

梅論

配丁而化水。癸為陰水。合戊而化火。故曰水火者。陰陽之徵兆也。女

于陰類。故得癸焉。衝為血海。任主胞胎。二脈流通。經血漸盈。應時而

下。天真氣降。與之從事。故曰天癸也。常以三旬一見。以象月盈則虧

不失其期。又名月信也。若遇經行。最宜謹慎。否則與產后症相類。若

被驚恐勞役。則血氣錯亂。經脈不行。多至勞瘵等疾。若逆于頭向肢

體之間。則重痛不寧。若怒氣傷肝。則頭昏脇痛。嘔吐。而生瘰癧瘡瘍



經水不調

若經血內滲則竅穴淋漓無已。凡六淫外侵變症百出。犯時微若大毫成患重如山岳可不畏哉。凡經行之際禁用苦寒辛散之藥。

月水不調

陰之經蓋衝任之脈皆起于胞中。而傷衝任之脈損于本陽。表裡上為乳汁下為月水。然月水為經絡之餘。苟能調攝得宜。則經

經水不調

應以時矣。萬密齋云。得其常候者為無病。不可妄投調補之藥。或不及期而經先至者。或過期而經後行者。或一月而經再行者。或數月而經一行者。或經閉不行者。或崩下者。此皆失其常候。不可不調也。大抵調治之法。熱則清之。冷則溫之。虛則補之。滯則行之。

經水不調

滑則固之。下陷則舉之。對症施治。以平為期。如芩連梔柏清熱之藥也。丁桂薑附溫煖之藥也。參苓歸芍補虛之藥也。川芎香附青皮元胡行滯之藥也。牡蠣赤石脂棕櫚灰側柏葉固澁之藥也。升麻柴胡

經候不調

有三。治病之主。一曰脾胃虛弱。經曰二陽之病發心腹。其在不

經水不調

也。胃主受納五穀。長養血氣。灌既藏府。流行經隧。乃水穀之海。血氣

之母也。惟憂愁思慮則傷心。心氣受傷。脾氣失養。苑結不運。腐化不行。胃雖能受。而所謂長養灌漑流行者皆失其令矣。故脾胃虛弱。飲

經血凝滯

清痰凝滯

辨色

有熱甚

食減少氣漸耗血漸少其有血枯血閉及血少色淡數月一行之病

二曰衝任損傷

經曰氣以吹之血以濡之故氣行則血行氣止則血止也女子之性執拘偏急忿怒妬忌以傷肝氣肝為血室

衝任血海之系衝任失調則氣血妄行褚氏曰女子血本行而強台以動其血則他日有難名之疾或干月事未斷之時而男手強台不已衝任內傷血海不固由斯為崩為漏有一日再行先期而行者矣

三曰脂痰凝滯

女子之身內而腸胃開通無所阻塞外而經隧流通無所凝滯則血氣和暢經水應期惟彼肥碩者膏脂充備

元室之戶不開挾痰者痰涎壅滯血海之波不流故有過期而經不行或數月而經一行及為濁為帶為經閉為無子之病

辨色

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火氣也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯

氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後乍痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣其由病源論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北方水色也紫淡于黑非冷而何予曰經曰亢則害承乃制熱甚者必

如黑豆汁

經黑口渴

經行腹痛有塊色紫

紫黑成塊

經行不止

中漏下

兼水化。所以熱則紫甚則黑也。況婦人性執而見鄙。嗜慾加倍。厥陽之火。無口不起。非熱而何。若曰風冷。必須外得。設或有之。百一二者也。經綿日冷症。外邪初感。入經必痛。或不痛者。變熱矣。正機微表。血得寒則凝。既行而紫黑。故非寒也。

經水如黑豆汁四物加芩連湯

海內四物兩

芩連

各兩二葉苦

燥濕寒勝熱

酒糊丸

經黑口渴倦怠形短色黑脈不勻似數

丹

用赤芍

香附

製各五錢

黃柏

黃芩

各三錢

甘草

二錢

為末醋糊丸

白湯下

五六十丸

或加牡丹皮

經事二月不來忽行小腹痛有塊血紫色用白芍

白朮

陳皮

各五錢

黃芩

川芎

木通

各二錢

甘草

炙少許

煎

紫黑成塊及經行不止崩

中漏下固經丸

黃芩

清上焦之火

中漏下固經丸

黃芩

清上焦之火

黃柏

酒炒三兩

龜板

炙各四兩

白芍

酒炒三兩

酒糊丸

酒炒三兩二者以滋陰而

香附

辛以散鬱

檳榔皮

牆以止脫

酒糊丸

各兩半

酒糊丸

各兩半

酒糊丸

養血皆壯水以制陽光也

香附

辛以散鬱

檳榔皮

牆以止脫

酒糊丸

各兩半

酒糊丸

各兩半

酒糊丸

氣滯血凝脈不瀉經不調或前或後紫色口苦

色淡

白帶口渴
初黑後淡

審多少

氣滯血凝脈不瀉經不調或前或後紫色口苦

澤生瘡大便秘滯丹用麻仁 桃仁 白芍各二兩 枳殼炒 白米

歸尾 威靈仙 訶子肉泄氣降火 生地黃 陳皮各五錢 大黃煨

經水色淡者氣血俱虛人物湯即八珍湯之類如兼他症隨症加藥或加黃芪香附

因有白帶口渴月經多初血黑色後來血淡倦怠食少臍上急丹用白

術錢半 白芍 陳皮各錢 木通 枳殼 黃芩各五分 縮砂仁 甘草各三分

紅花許煎湯下保和丸見內傷飲食 三十丸抑青丸見雜症 二十丸

審多少 婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛醫者不審一

則包藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍

陽勝經多

陰勝經少

經過多

經少

肥經多

瘦經少

多而在月前當和氣血平陰陽斯為善也。經水過多為虛熱為氣虛不能攝血。經水澀少為虛為澀虛則補之。澀則濡之。

陽勝陰月水多者當歸飲四物湯加黃芩補脾白朮補脾每三錢煎

陰勝陽月水少者及經水愆期或多或少腹痛四物湯加乾薑溫中木

香等分每四錢煎經水過多丹用黃芩炒白芍炒龜板炙各雨三

錢椿根白皮七錢香附二錢酒糊丸經水澀少四物加葵花湯藏

四物兩葵花兩一方加紅花血見愁或四物湯倍用生地歸身濡

脈弦而大不數形肥初夏時倦怠經來時多此稟受弱氣不足攝血故行多宜補氣丹

用白朮錢黃芪生陳皮各人參五甘草炙二分薑棗煎

瘦人經水來少者責其血虛少也四物加人參湯萬四物加人參香附童便甘

經水來少

草煎 肥人經水來少者 實其經 二陳加芩歸湯 萬歸身 川芎

陳皮 白枳殼 炒 半夏 製 茯苓 香附 童便 炒 甘草 五 滑石 三 薑 三

經水來大多 不問肥瘦 四物加芩連知柏湯 萬 四物湯 各 加知母

連 條貫黃芩 各 熟地黃 五 黃柏 七 煎 兼服三補丸 見陽 明後

先期後期 王于亨曰經者常候也 謂候其一月之陰陽愈伏 知其安否 故每月一至太過不及皆為不調 陽太過則先期而至 陰不

及則後期而來 其有乍多乍少 斷絕不行 崩漏不止 皆由陰陽衰盛 所致 有謂先期而來者 血虛有熱 後期而來者 血虛有寒也

經不及期者 血 四物加芩連 肥人不及日數而多痰者 血虛 南星白

朮 蒼朮 黃連 香附 川芎 作丸 俱丹 形肥 多痰多癥 責 四物湯去白芍

餘各 二陳湯 各五 加黃芩 香附 童便 黃連 酒炒 入薑 三 煎 如後姓 七分



性溫和

急多怒

血熱

身熱且

熱藥

水過期

已淡

無有塊

無他疾者責其血盛且有熱也。四物湯內芍歸各七分加知母麥門冬地骨皮各錢五

如性急燥多怒多妬者責其氣血俱熱且有苑也。四物湯內生地用七分加黃芩炒黃連炒

各甘草五分煎形瘦素無他疾者責其血熱也四物加芩連湯見前再加生薑五分

煎兼服三補丸和之如形瘦素多疾且熱者責其衝任內傷也四物湯用熟地黃加人參

知母各錢五分甘草分薑黃煎更宜常以六味地黃丸見雞症服之

辛熱煖官之藥者責其衝任伏火也。四物內川芎用七分加黃柏炒知母木通各錢五分煎

更兼服三補丸和之俱萬氏方。薛立齋曰有因肝經血燥者宜加味逍遙散肝火怒火者宜加味小柴胡湯

經水過期者血少芩歸湯見後加人參白朮與治痰藥。色淡者痰多也淡白者虛也

或挾痰停水。二陳湯加川芎當歸。色紫有塊者血熱也氣滯也血以混之也

或風冷乘之也。血

血熱氣滯

溫利無疾

性急多怒

素無他疾

形瘦食少

加人食多

痰

熱氣滯必作痛四物湯加
甘附黃連俱丹風冷乘之者升麻和氣飲

見後經溫利之如德性溫來腹痛如德性溫八珍湯主之如性急燥多怒

少八珍湯加香附炒青皮等煎兼常服蒼朮和中蒼朮米香附

童便浸一日條黃芩酒炒為末湯浸蒸餅為丸白湯下如形瘦食少

氣血俱不足也十全大補湯主之如形瘦食少異功散合芩歸湯後

主之如肥人及飲食過多芩歸六君子湯主之陳治其痰

芩歸活其經血蓋兼服蒼朮如素多痰者參朮大補丸主

人參五錢白朮五錢白茯苓五錢陳皮五錢蓮肉五錢歸身五錢甘草三錢山藥兩

砂仁各二錢川芎各二錢石菖蒲各二錢共為末薄荷包米煮飯為丸米飲下氏

肺虛損

心肺虛損血脈虛弱月水過期滋血湯入珍湯去白朮甘草加山藥黃芪

月再行

如血虛氣滯去參芪山藥加桃仁紅花肉桂木通甚者加蓬朮

一月而經再行

如性急多怒氣者責其傷肝動衝任之脈

四物加柴胡湯主之

物湯加

柴胡

黃芩

黃連

甘草

煎更宜常服補陰丸

以瀉衝任之火

黃柏

辛熱藥

知母

去皮毛諸酒炒等分

蜜丸

如魚服辛藥者

四物湯加黃蘗知母及三補丸主之

月一行

數月而經一行

瘦人責其脾胃弱氣血虛

十全大補湯及地黃丸主之

肥人責其痰濕及氣血虛

六君子湯加芩歸蒼朮

米泔浸

香附

童便炒

枳殼

麩炒

入薑煎更服蒼朮

痰丸

蒼朮

泔浸

香附

童便炒

合二陳

各二兩

加膽星枳殼

各兩

薑汁

煎餅為丸

經行復止血少神衰

經曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而終于胞中今氣上逼肺心氣不得下降故月事不來也

此丸可服平利也

虛損無子

栢子仁丸 良方 栢子仁 安神養心去酒 卷栢 各五錢生破 澤蘭 二者活血服生

膝五錢續斷 兩熟地黃 兩三者補肝 密花米飲下 經行或前或後

悉從 虛治 八珍益母丸 八珍加益母膏等分 蜜丸 或八珍 加陳皮丹皮丹參香附

脾胃虛弱衝任損傷血氣不足經候不調以致無子烏雞丸 服之白鳥

骨雄雞 一隻要未斂者以梗米喂養七日勿令食 蟲蟻野物吊死去毛并肚雜以一觔為率 生地黃 熟地黃

天門冬 麥門冬 各二兩 甜美醇酒 十碗入瓦罐煮爛取出再用 桑柴火焙去藥更以餘酒淹

盡焙至焦 乾研為末 再加杜仲 鹽水炒 人參 甘草 炙 肉蓯蓉 酒洗破故紙 鹽水

小茴 炒各 歸身 酒炒 川芎 白朮 漂 丹參 酒洗 茯苓 各二 香附 醋浸三月

砂仁 兩 共焙研和上末酒糊丸空心溫酒下每服五七十九

經脈不勻

小腹滿痛

有汚血

經

經脈不勻或三四月不行或一月再至當歸散簡
當歸 川芎 黃芩

炒白芍酒炒 白朮漂 山藥肉各兩 為細末空心溫酒下二錢

如寒者去黃芩加肉桂兩 經水不利小腹滿痛一月再見

土灰根散金匱 土灰根 白芍 桂枝 麝蟲各七錢半 碎為散酒服

七日三準繩云按此方乃 破堅下血之劑則經不及期有汚血者前

三月一行為居經問曰婦人 姙娠三月師脈之言此婦人非孕今月經

將大也榮反而弱謂左脈反弱也浮大則氣強反弱則血少孤陽獨

呼陰不能吸二氣不停降榮竭陰為積寒陽為聚熱陽盛不問經

絡不足陰虛陽實故令血時發洒淅咽燥汗出或溲稠數多唾涎

沫此令重虛津液漏泄知非軀畜煩滿血陰盛則泄名曰居經

經來身痛產實云經水者 氣血通陰陽以榮于身者也氣血盛陰陽

足經候欲行。身體先痛也。血氣虛寒者越痛散。虎骨錢五茯苓。甘草或續斷。

藥本 防風 白芷 當歸 赤芍 白朮 附子炮各三錢 每五錢。

經來腹痛

大全云由風冷客于胞絡。衝任虛損月候不調或來多或來少。

或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛。

煩熱並宜大溫經湯。吳茱萸湯牡丹皮 白芍 肉桂或川桂枝 人參。

當歸 川芎 阿膠碎 甘草炙各錢 麥門冬去心二錢 半夏二錢 薑片五錢 煎。

小溫經湯簡 當歸 附子炮等分 每三錢煎。局方溫經湯 四物湯。

去地黃加蓬朮各錢半 人參 牛膝各二錢 桂心 丹皮各錢 甘草五錢 煎。

衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏帶下小腹急痛每至經厥行時。

小腹急痛

小腹急痛

小腹急痛

行頭

頭眩飲食減少氣滿心怯肌肉不澤悉宜加味吳茱萸湯 吳茱萸

湯當歸各錢半 半夏二錢 麥門冬去心 乾薑炮 白茯苓 苦桔梗

防風 牡丹皮 甘草各錢 肉桂 細辛各五分 薑三片一煎服

經前腹痛不可忍桂枝桃仁湯 桂枝 赤芍 生地黃各兩

去皮四十九粒 甘草兩 每五錢薑三片一煎 若夏思氣起而血滯用上方

若風寒傷脾者六君子湯加炮乾薑 思慮傷血者四物湯加人參

白朮 思慮傷氣者歸脾湯加柴胡梔仁 驚怒傷血者逍遙散

經水將行腰脹腹痛氣滯血實 桃仁四物湯萬歸尾 川芎 赤芍 丹皮

香附 五胡索各錢 生地五分 紅花五分 桃仁二十粒 煎其有火 加芩連各錢



北京中医药大学图书馆版权所有

經來腹痛

肥人責其有痰。加枳殼、蒼朮。各錢月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛。陰陽

其血氣便不相勝，以平為期。宜紫石英丸。本紫石英細研水飛，治血海虛寒不孕。川烏。炮

杜仲。炒去禹餘糧。血分重劑。遠志。去心桑寄生。桂心。龍骨。新洗

人參。肉蓯蓉。酒浸石斛。乾薑。炮五味子。甘草。炙各兩牡蠣。煅

去目及合口者。炒出汗，各五錢。蜜丸，桐子大，每二十丸，米飲下。經水紫色，或前或

寒色惡寒

後惡寒。似寒。喜熱，或時感寒，腹亦作痛，脈皆細濡，近滑，兩尺重按，暑

洪而滑。此血熱也。用黃連。酒煮四兩香附。歸身尾。各二兩五靈脂。兩粥丸，效。

經來腹痛

經來腹痛，不來腹亦痛。戴云：皆血之不調也。欲調其血，先調其氣。濟生方論：經云百病皆生于氣。經所謂七氣者，喜怒

憂思悲恐驚也。益以寒熱二症，而為九氣。氣之為病，男子婦人多有之。唯婦人血氣為患尤甚，蓋血隨氣行，氣滯則血與氣併，或月事不

氣滯

痛甚

腹痛

調心腹作痛或將行先作痛或已行淋瀝作痛或連腰脇或引背脊
上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或為癰
肌肉消癯非特不能受孕久因氣滯者升麻和氣飲局乾薑

兩大黃酒蒸枳殼炒桔梗炒蒼朮漂升麻各白芍七錢

草各兩當歸半半夏製白芷各二錢每四錢薑三片燈心一

菴加香附五兼吞獨附丸一香附一筋擦去毛米醋浸醋糊為丸

方香附全上艾葉兩當歸二名艾附丸寒者宜之或四物湯加吳茱萸五

香附錢和氣飲加吳茱萸五亦可痛甚者四去生地加玄胡索枳

榔木香山稜我木厚朴練子官桂之類然又恐感外邪傷飲食痛不

臨經先臍腰痛甚則腹中亦痛柴胡丁香湯東垣柴胡丁香生地黃