

東醫西寶鑑

十四

東醫寶鑑雜病篇卷之六

御醫忠勤貞亮庵 聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則虛虛則病起於上留著於脉稽留不去息而蘖

積○著於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢

則益小○著於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢

則安飢○著於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食

則安飢則痛○著於膻筋在腸後者飢則積見飽食

則積不見按之不得○清濕蘊虛則病起於下積

之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足惋足惋生積

脛寒脛寒則血脉凝澁血脈凝澁則寒氣上迫於

腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚

不得散日以成積○卒然多飲食則脹滿起居不

節用力過度則陽絡脉傷陽絡傷則血外溢陰絡

傷則血內溢血內溢則後血沫與血相搏則并合

則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

傷則血內溢血內溢則後血沫與血相搏則并合

則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

凝聚者何不得散而積成矣○帝曰人之善病腸中積而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃成腸胃之間寒溫不次邪氣稍至蓄積留止大聚乃起○內經曰寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血溢不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

論五積六聚

積六聚者病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚
積名曰積氣之所聚名曰聚積者五藏所生聚者
六府所成積者陰氣也其始發有常處其痛不離
其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也
其始發無根本上下無所留止其痛無常處故以
是別知積聚也辨○病有積有聚有滯氣何謂也
師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時
展轉痛移為可治滯氣者脇下痛按之則愈復發
為滯氣熱○肝之積名曰肥氣在左脇下如覆盆
有頭足久不愈令人發咳逆脇痛痰瘧連歲不已
○有心之積名曰伏梁緇深之櫛起臍上大如臂上

至心下久不愈令如人頭心○脾之積名曰痞氣
收發黃疸飲食不為肌膚○肺之積名曰息賁
熱喘咳發肺癰○腎之積名曰奔豚
發於小腹上至心下若豚狀或下或上無時久不
已令人喘逆骨痠少氣○肝積面青脉弦而長
細○脾積面黃脉大而虛而○腎積面黑脉寸
積面白脉數而浮○在右脇下○腎積面黑脉寸
口大實而○

伏梁有二證

帝曰病有可治否岐伯曰病有上下左右皆有根此為

血居腸胃之外不可治之每切按之致死○帝
曰人有身體解股肱皆腫環臍而痛是為何病岐
伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於
育育之原在臍下故環臍而痛不可動之動之為
水尿泄之病此二病
同名而實異也

脉法

鬱脉多沉伏或結或促或代或得肺脉鬱脉沉瀆積脉

甚結微則積微肺脉雖不見右手脉當沉伏

積其脉皆大關脈聚之脉皆弦緊為積脉弦長脾腎有

癥也夫癥癥積聚之脉皆弦緊在臍下即尺弦緊下即寸弦緊

在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊診積聚其脉堅

見脉難治見一脉相應為易治○診積聚其脉堅

強急者生虛弱者死○脉弦而伏者腹中聚積在

可轉也○心死不治○細○五藏為積六府為聚積在

本位聚無定處○緊浮牢小而沉實或結或伏為

聚為積實強者生○沉小者死○而沉實或結或伏為

附骨肝弦以抗腎沉急滑脾實且長肺浮喘率○

六聚結沉痼則浮結○又有癥癥其脉多弦弦急

癥疾弦細癥堅○沉重中散食成癖瘕左轉沉重

氣癥膏前若肉癥右轉橫旋○積聚癥癥緊則

痛纏虛弱○診婦人死實強可痊○脉弦急者生虛弱小

弱者死○

六鬱湯

通治六鬱香附子二錢川芎蒼朮各一錢半

縮砂甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服

氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘊葉○薑○濕鬱加白朮羌活防己○木香檳榔黃連連翹○痰鬱加南星瓜蒌

仁海粉○血鬱加桃仁牡丹皮韭汁○食鬱加山楂子神麴麥芽

六鬱湯

川芎赤茯苓貝母枳殼紫蘊葉各一錢陳皮五分

薑三片水煎服

麴丸

等分右為末水便香附川芎神麴炒施子炒各

十丸如寡婦僧道之類名剉不遂或先富後貧或久

病不愈者皆宜服此

麴保和丸

開鬱行氣消積散熱白朮三兩山楂肉二兩蒼朮川芎神麴少便香附陳皮半

夏白茯苓實黃連酒炒當歸酒洗各一兩梔子
炒連翹薤蒿子炒木香各五錢右為末薑汁沱蒸

餅和丸梧子大薑
湯下五十丸

加味麤麤丸解諸鬱開膏膈進飲食蒼朮
陳皮去白朮炒黃芩炒各一兩半山楂肉蒸二

兩右為末稀糊和丸梧子大白湯下五六十丸
膏滿脇痛脉沉宜用香附燕芎蒼朮陳湯煎水

氣鬱木香調氣散解鬱調胃湯麤麤丸○二陳湯煎水
吞下交感丹

周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發脉沉
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓○宜服參濕湯

濕鬱
散觀平胃

熱鬱
目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附

熱鬱
蒼朮川芎施子門○宜服升陽散火湯火鬱湯

附

卷之六

口

卷

痰鬱

附子 瓜蒌 仁南星 附子 〇宜服瓜蒌枳殼湯升發二

血鬱

四枝無力能食小便淋大便紅脈沉芤宜用桃

食鬱

噫酸惡食黃疸鼓脹痞塊脈氣口緊盛宜用蒼朮

木香調氣散

治氣鬱烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴

皮甘草各三分右剉作

解鬱調胃湯

治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由

歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤

神麴炒麥芽炒各七分川芎六分桃仁生甘
草各四分右剉作一貼薑三片水煎服

瓜蒌枳殼湯治痰鬱瓜蒌仁枳殼桔梗川芎蒼朮香

縮砂木香各五分片薑草三分右剉
作一貼水煎入竹瀝薑汁調服

升發二陳湯治痰鬱柴胡防風升麻甘草各一錢右

剉作一貼入薑
三片煎服

生韭飲治血鬱胃脘有瘀血作痛生桃仁七箇

順氣丸治血鬱香附子八兩以童便浸
晒乾為末以粟米糊和丸服

當歸活血湯治血鬱當歸赤芍藥川芎桃仁各一錢

紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三
分右剉作一貼入薑薑三片水煎服

香砂平胃散治食鬱蒼朮厚朴陳皮便香附各一錢

各五分甘草炙三分右剉作一貼
入薑三蘿菹子炒研一撮煎服

散鬱湯治食鬱陳皮赤茯苓各一錢二分枳殼香附各一錢甘草

草五分右剉作一貼入薑三煎服○鬱則胃熱鬱
散則上焦行下脘通水穀之陰自滋沛身中之陰

氣自生矣

痞塊積聚所屬部分凡痞塊積聚在中為痰飲○在右

為血塊右為食積中為痰飲此言誠然夫左關肝
膽之位主藏血液右關脾胃之位主藏飲食中間

則為水穀出入之道路所以左為血
塊右為食積中為痰飲其理昭然

痞塊證治塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死
血塊也宜用化塊丸○凡痞塊在皮裏膜外

俱宜二陳湯加補氣行氣藥先須斷厚味○治
塊當降火消食積○痰行氣死血塊去後須大補之

其○不能移動者是癥塊也或有或無或上或下或

左或右者是瘕塊也俱用瀆堅湯丸為主
下有鬼宜當歸龍薈丸五功觀加桃仁薑黃各一兩

蜜丸服之
甲妙驚甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五

七十九以利為度
加味柴平湯消積保中丸痞塊宜用連薈丸消塊凡

化痞丹兼用膏藥外貼之
積聚瘕瘕俱為惡候切勿視為尋常若脹滿已成

膏腹鼓急雖倉扁復生
亦莫能救其萬一也

化塊丸治痞塊及血塊海粉酒煮三稜蓬朮並醋煮
右為末醋糊和丸梧子大

白朮湯下三五丸
右為末醋糊和丸梧子大

連薈丸治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈
同炒去菜黃一半以益智五錢同炒去益智白芥

子薈蒿子並炒各一兩半
子薈蒿子並炒各一兩半

仁香附子山查肉神麴各一兩青皮五錢右為末
蒸餅和丸梧子大
白湯吞下五六丸

白芥丸
名消積丸
今

消塊丸
治痞塊癥瘕
大黃四兩
硝石三兩
人參甘草

大黃煎不住手攪使微沸盡一升下餘藥末煎至可丸則丸如梧子大朱飲下三十丸當利如雞肝

惡物
名硝石丸
針

加味柴平湯
治積塊有熱柴胡黃芩半夏蒼朮厚朴

各七分甘草五分
右判作一
貼入薑三棗二水煎服

消積保中丸
治痞塊癥瘕
白朮土炒三兩
陳皮去白二

芥子炒神麴炒黃連薑汁炒
施子薑汁炒
各一兩

檳榔七錢蓬朮三錢
連薑汁炒
各八錢
麥芽炒
六錢

乾漆炒五錢青皮香油炒
縮砂炒
各四錢
木香阿

下
九
醫

開懷散

治心下積塊痞悶或發熱柴胡草豆蔻各一錢三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子檳榔枳實紅花甘草各七分右判作一貼薑三煎服

柴香散

治心腹有氣一塊略通或膨脹寒熱枳實地骨皮三稜蓬朮各錢柴胡黃芩各七分赤芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分甘草三分右判作一貼水煎服

芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分甘草三分右判作一貼水煎服

保和丸

治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白朮五兩陳皮半夏茯苓神麴山楂肉各三兩

連翹香附子酒炒黃芩酒炒厚朴蘿藦子炒各二兩枳實麥芽黃連酒炒黃芩酒炒各一兩右末薑汁糊和丸

梧子大茶清下

化痞丹

消積塊專攻之劑大黃四兩醋浸七日日晒夜露又七日穿山甲土炒二兩木鱉子去油

香附子便浸炒桃仁各一兩紅花二錢青黛五分右為末將大黃和好醋煮為糊和丸葉豆大茅根

葛根煎湯下

積聚治法

可治積當察其所痛以知其病有餘不足可補

結者散之客者除之留者行之堅者削之強者奪之

行之節飲食慎起居和其真氣藥補之隨所利而

積病不可飲用藥徒損真氣病亦不退當用消積

藥使之消積按積磨積而無下積之說蓋不治積聚有

取下以傷胃氣也難可吐五積古有吐下五方今增損

積亦不去奔豚尤不可吐五積古有吐下五方今增損

五積九更妙凡積大聚消其大半乃止藥過劑則死

而止藥凡積大聚消其大半乃止藥過劑則死

疝氣肝積用肥氣丸心積用伏梁丸脾積用

聚宜用散聚湯香稜丸大七氣湯大阿魏丸大安

九通玄二八丹消塊丸辛寒推蕩木香檳榔九所

惡者攻之所喜者誘之則易愈如砂水銀治

肉積○神麴麥芽治酒積○易水蛭如礪砂水銀治

木香積柳治氣積○牽牛甘遂治水積雄黃臍粉
治痰積○礞石巴豆治食積各從其類也
云三接蓬朮治血積香附枳實治食積山楂阿魏

治肉積海粉礞石治痰積雄黃白礬治虫積乾薑
巴豆治寒積黃連大黃治熱積明礬○五積六聚通

用增損五積九消積正元散肥氣九○伏梁九痞氣
九息貴九奔豚九又有奔豚湯散聚湯香拔九大

七氣湯潰堅又真入化鐵湯端○宿血帶
氣凝結為癥瘕腹中痞塊堅硬作楚當以破氣藥

伐之或以類相從如敗梳治風癥銅屑治龍癥麴
藥治米癥瘕石

灰治髮癥瘕
增損五積九通治五積○黃連肝積五錢脾腎積七

錢○脾腎積八錢○心積五錢○肺積二兩半○厚朴肝心脾腎積五
分○脾肺積二錢○腎積五錢○肺脾腎一錢半○腎脾積五

心脾肺積二錢○腎積五錢○肺脾腎一錢半○腎脾積五
五分○右為末蜜丸梧子大初服二九漸加以微瘡

為度治積塊不拘臍上下左右通用○如肝積加
柴胡一兩川椒四錢蓬朮三錢皂角昆布各二錢

東醫寶鑑監註卷六

半○心積加黃芩三錢肉桂茯神丹參各一錢
蒲五分○肺積加桔梗三錢天門冬青皮陳皮白

豆蔻各一錢紫苑川椒各一錢半○脾積加吳茱
萸黃芩縮砂各二錢澤瀉茵陳各一錢川椒五分

○腎積加玄胡索三錢苦練肉全蠋附子獨活各
一錢澤瀉芎藭各二錢肉桂三分丁香五分

消積正元散治痰飲氣血滯結食積氣不升降積聚
脹痛白術一錢半神麴香附枳實玄胡

索海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽炒山
楂肉甘草各七分剉作一貼薑三水煎服○

名開胃正元散
和實附桔

肥氣丸治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒
四錢甘草三錢蓬朮人參昆布各二錢半皂

角白茯苓各一錢半乾薑巴豆霜各五分川烏二
分右為末蜜丸梧子大初服二九日加一九二日

加二九至大便秘溏便漸減服
周而復始塊減半勿服

伏梁丸治心積黃連一兩半厚朴人參各五錢黃芩
桂枝茯苓神丹參各一錢乾薑芎藭巴豆霜川