

醫方便蒙中

敬恕堂張訂



中華民國卅三年閏四月上澣

醫方便蒙

中卷

古彭張宗震訂讀



醫方便蒙卷三目錄

傷寒

感冒

傷風

時疾

舌胎

畜血

越經

大頭瘟

補傷寒

真中風

類中風

中暑

痰厥

中惡

氣厥

食厥

癰瘕

中寒

中暑

中濕

燥疔

火證

氣鬱滯

氣虛

血瘀

血虛

食滯

積聚

發熱

咳嗽

痰證

喘證

哮喘

瘧疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

噎氣

吞吐酸



醫方便蒙卷之三

傷寒

傷寒傳變固多端不外陰陽表裏間今擇常見此數證餘

證罕見另詳參

方書之難者惟傷寒傷風感冒春溫夏熱瘟疫時疾之七種何也為因有傳經之變亂故藥性以前繪圖以明示之除七種之外別門皆易知也傷寒有七種曰傷寒傷風感冒春溫夏熱瘟疫時疾也其形勢雖分概用辛溫之劑重發其汗治後使學者一目了然今將七證治法顯列於後使學者一目了然真捷法也傷寒者寒氣侵於表也始自太陽經入太陽經乃人身最外一層即皮毛是也始自太陽經入太陽經乃人身太陽傷寒其證發熱惡寒頭痛雖厚衣烈火不除輕則加味香蘇飲重則麻黃湯以發其汗出而寒隨汗去矣傳經者足太陽脾陽傳足少陰腎陽傳足厥陰肝傳至足



者是也

仲景治傷寒用方甚多。後人見其挾雜多不遵用。是書只取恆用數方。開釋於後。足可通用。實余生平之經驗者也。

太陽證治

寒傷榮分脉浮緊。渾身疼痛。惡寒風。無汗而喘。已未熟嘔逆。麻黃湯最靈。解釋在後

太陽傷風證治

風傷衛分脉浮緩。頭項強直。惡寒風。病即發。熱汗自出。鼻鳴乾嘔。桂枝功。

湯頭歌

桂枝湯中藥三般。芍藥甘草一處攢。若把二方同煎服。方



名各半治傷寒

桂枝湯治傷風惡風有汗有嚏此仲景之治也余見今人多不遵用竟以蘇葉荊芥防風發汗無不應手取效不可見古今人未嘗不如古人也

陽明證治湯頭歌

升麻葛根散陽明日痛鼻乾額更疼升麻葛根芍藥草四味煎來卧自寧

邪傳陽明經則目痛額痛鼻乾不得卧是也升麻葛根散陽明之邪熱加芍藥以斂之耳

少陽證治湯頭歌

小柴胡湯^和少陽半表半裏兩相當柴芍夏人參草引用

大棗共生薑

此方治邪傳少陽胆經其證寒熱往來胸滿脇痛口苦耳聾是也



柴胡散少陽之邪黃芩清少陽之熱風寒在表則寒若
傳裏則寒化為熱也半夏通陰陽引邪外出邪在少陽
猶恐乘虛入裏故加人參以補裏裏補實則邪不能入矣

小柴胡湯

柴胡 半 夏 黃芩 赤芍藥 党參

生薑三片大棗二枚為引水三盞煎八分

表裏證治

大柴胡湯表裏攻表證未除裏證成柴芩芍藥合半夏枳

寔大黃姜棗同

此乃邪傳少陽胆又並太脾陰也有少陽證之寒熱往
來胸滿脇痛口苦耳聾又有太陰脾症腹滿不大便此
因兩經同病故此方亦用兩經之藥柴胡黃芩芍藥半
夏解少陽之邪熱加枳實大黃以攻太陰之熱結故曰
表裏兩劑



大柴胡湯即小柴胡湯減去人參加枳實大黃

枳實平大黃平量其虛實加減分兩

小柴胡湯五般藥人參柴芩半夏芍若是裏急將參減加
上實黃大柴合

太陽證煩燥不安

證雖傷寒脉中風太陽煩燥大不安寧麻黃湯中用石膏
榮衛同病大青龍

大青龍湯治傷寒太陽煩燥不安然麻黃桂枝杏仁草加
上石膏解熱煩

蘇葉荊防散表風芩壳桔梗裏熱清太陽煩燥用此藥勝
是幾劑大青龍

此乃麻黃湯加石膏耳若發熱頭疼惡寒無汗乃太陽傷寒也又加煩躁者因胃原熱又加外寒以閉之也發熱頭疼惡寒故用麻黃湯以散之胃熱煩燥故加石膏以清之耳今人用蘇葉荊芥防風以散表加黃芩枳殼

蘇葉 荊芥 防風 黃芩 枳殼 桔梗

九味羌活湯 為至寶 不論春夏秋冬傷寒瘟疫皆治 俗醫遵

九味羌活散 太陽 蒼朮 細辛 生地 黃川 芎白芷 同甘草 防

風 黃芩 共葱薑

此潔古張元素之方也 元素云春可治溫夏可治熱秋可治涼冬可治寒乃五路之應兵也今之庸師遵為至寶治誤無窮毫不自醒殊不知蒼朮燥而細辛熱芷芎竄而地黃泥豈非傷寒之最忌者也何如加味香蘇飲之穩而多效也

蒼朮燥而芷芎竄熱性細辛泥地黃數約豈非傷寒忌何



如香蘇多穩當

以上諸方斟酌備用亦不可不知

三陽解汗三陰下平或用大柴或用三承並若火
虎行陰證肢冷四逆湯寧不可不記
脉來沉瀉囊縮舌蹇傳至厥陰肝病煩滿

總理太陽陽明諸表證

俗名發汗散多功不論傷寒與傷風感冒時疾皆可治只
有分兩不相同重者不妨照數用輕者減半即可行傷食
加上三仙散內熱煩燥黃芩增切記大黃莫早下誤服熱
陷成結胸假使邪竟傳胃府也要斟酌驗證憑口乾舌燥
有謔語腹中硬痛便不通縱然當用忌太過莫令有差證



反凶

俗名發汗散

治傷寒傷風感冒時疾發熱頭痛惡寒

俗名發汗散蘇葉共荆防陳皮枳梗草香附薄荷薑

蘇葉 辛 荆芥 辛 防風 辛 陳皮 辛 桔梗 辛 枳殼 辛

薄荷 辛 生香附 辛 甘草 辛 生薑為引

傷寒傷風感冒等證皆發熱惡寒頭痛必須發汗以散之汗出則風隨汗亦出矣蘇葉惡寒發汗並之荆防以助之則發汗最速者也加陳皮香附只桔以順氣助汗自易出也猶恐蘇葉荆防之不足故又加薄荷以助之耳此方乃發汗之通劑用此以代麻黃桂枝等湯穩而多效屢經屢驗也

蘇葉發汗並荆防陳皮香附順氣良枳桔寬中提肺氣薄

荷消風助之強

加減法



內熱煩躁心不安須要清涼黃芩漆傷食又將何藥治查
曲麥芽號三仙

黃芩 山查 神曲 麥芽

有內熱者加黃芩乃清涼發汗有食者加三仙散乃消
導發汗也外感者多有內傷
仲景云表症未除雖有裏症滿大便秘不通者加不
擅用大黃恐下早邪熱內臨而成結胸名誤下結胸成
凶險之症須至邪傳胃府口乾舌燥譫語亂言腹中硬
痛大便不通者方可斟酌用大黃下之切之慎之
麻黃湯 治傷寒太陽症在表發熱頭痛腰痛骨節痛項背強惡寒惡風無汗
而喘脉浮而緊亦治太陽陽明合病喘而胸滿亦治哮喘症

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒與頭痛須
知一服汗淋漓

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 炙甘草 引生薑三片

麻黃發汗甚猛故人多用蘇葉荊防以代之若是冬月
傷寒頭疼惡寒雖厚衣烈火不知暖者乃寒極也此非



蘇葉荊防大所散也。必用麻黃重劑以發之。方能汗出。也。麻黃能大發汗。桂枝和氣血。和汗自易出。杏仁利肺氣。此仲景之用。意而令人皆不依此。

麻黃肺藥走膀胱杏仁散寒降氣強桂枝能引營分邪甘草發散和中央

四時感冒最輕者證治

四時感冒寒與風憎寒拂冷頭微疼噯氣惡食胸滿悶即用香蘇飲收功

感冒與傷寒傷風不同。不過憎寒拂冷。微發熱微惡寒。乃受風寒之最輕者也。輕則香蘇飲重則加減發汗散之以散

香蘇飲治感冒之最輕者

香蘇飲內蘇葉最香附陳皮甘草配本方只用四般藥感



冒風寒 一服退

蘇葉

香附

陳皮

甘草

生薑為引

此方治風寒之最輕者也。故只用蘇葉發汗。香附陳皮以順氣耳。

加減法

傷食三仙嗽。杏桑傷風。桂枝寒麻黃頭痛。白芷痰半夏鼻塞頭暈。荊芥羗。若是心疼。怎生醫。外加胡索燒酒良。

查肉

神曲

大麥芽

桂枝

麻黃

桑白皮

白芷

荊芥

延胡索

羗活

杏仁

半夏

燒酒

肺受風寒 咳嗽痰喘證治

咳嗽痰喘肺受寒。髣髴太陽微甚間。不用麻黃用定喘哮。



吼之證亦安然

肺受風寒咳嗽痰喘與太陽證勢髣髴不用麻黃湯謹用
蒸發熱此不過微惡寒微發熱所以不用麻黃湯
定喘湯
湯耳

定喘湯 專治肺受風寒通治哮喘之證

肺受風寒定喘湯哮喘痰喘也相當蘇子黃芩杏半草欬
冬白果與麻黃余每用時減白果麻換蘇葉用亦良

麻黃 杏 仁 半 夏 蘇 子 白 果 欬 冬 花

黃 芩 桑 皮 甘 草 此方中有加桔梗 開通肺

氣加陳皮 溫肺順氣

肺受風寒咳嗽痰喘者此方主之哮喘急者亦用此
方主之方中麻黃散肺中之風寒白果杏仁桑皮蘇子
降氣定喘半夏化痰欬冬花散肺黃芩清熱甘草緩急
每用每效真佳方也比之蘇子降氣湯中誑加肉桂者

相隔天
淵矣

麻杏桑甘善解表欵果溫潤收塞好蘇芩降氣清肺熱半
夏燥痰不可少

傷風證治

傷風傷寒非一途發熱惡寒却髣髴寒傷血分風傷氣脉
象緊緩亦各殊傷寒無嚏傷風有汗傷寒無頭疼
骨蒸血分證鼻流清涕氣分屬莫像傷寒重發藥只可輕
散症自除加味香蘇是正治不可拘泥桂枝服余每用之
應手效何必今人不古如

傷風與傷寒不同皆發熱頭疼但寒傷榮榮者血也風
傷衛衛者氣也傷風有嚏况脉也寒惡寒傷寒無汗傷風有
汗傷寒無嚏傷風有汗傷寒無頭疼傷風有汗傷寒無汗
脉浮緩以此為別亦不必拘泥古人之成法傷寒無汗

