

時方妙用

張立才

黃盛



記

醫方妙用卷三

收藏者愧士氏

閩吳航陳念祖修國甫著

男

元氣虧道處古思全校字

血症

吐血
舌血

咳血
大便血

小便血
男血

血淋
血崩

經曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血血之
流溢半隨衛任而行於經絡半散於脉外而
充肌膚皮毛若外有所感內有所傷則血不
循經從上而湧則為吐血咳血咯血鼻衄齒

血。舌。衄。從。下。而。走。則。為。大。便。血。溺。血。婦。人。血。
崩。其。源。則。一。或。問。諸。書。皆。分。別。五。臟。六。腑。之。
血。而。施。治。茲。何。以。懽。統。言。之。余。曰。五。臟。有。血。
六。腑。無。血。觀。剖。諸。獸。腹。心。下。夾。脊。包。絡。中。多。
血。肝。肉。多。血。心。脾。肝。腎。中。各。有。血。六。腑。無。血。
近。時。以。吐。血。多。者。謂。吐。胃。血。皆。耳。食。前。醫。之。
誤。凡。吐。五。臟。血。必。死。若。吐。血。崩。下。皆。是。經。絡。
散。行。之。血。也。或。問。既。無。分。別。何。金。匱。以。瀉。心。

湯治心氣不足為吐衄乎曰百病不離於五臟六腑臟腑病以致血不循經而為吐衄崩下非吐衄崩下之血從臟腑中脫出也循經之經字作常字解時醫誤解謂歸脾湯引血歸脾脾能統血即是歸經害人無算余再為之喝醒一語曰隨者仍其隨之常行者仍其行之常散者仍其散之常充者仍其充之常血循經常之道路則無吐衄崩下之病矣干

古無一人談及。余於高士宗引而不發處。細
繹斯論。大為快事。

身熱脈大者難治。○身涼脈靜者易治。○

若喘咳急而上氣逆。脈見弦緊細數有熱。
不得卧者死。

一外感吐血。先見頭痛惡寒發熱等症。必取

微汗則愈。宜

香薷飲。加荊芥穗一錢。丹皮白芍各一錢。

五分。
五三十

一夏令秋令。感暑氣燥氣而吐血。方治見咳
嗽門。不贅。

一內經云。不遠熱。則熱至。血溢血泄之病生
矣。凡人不避暑熱。及過食燂炙之物。以致
血熱妄行。宜

四生丸。
百一

一瘀血而吐。必先胸痛。血色必紫。或黑而成。

塊脈必滯。宜

四物湯。加醋炒大黃。桃仁。丹皮。香附。各一

錢五分。○如紫血盡。鮮血見。即用六君子

湯加當歸調之。

九出高
武峯心法

一傷寒及溫病。應發汗而不汗之。內熱蓄血。

及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便黑。面黃。

宜

犀角地黄湯。九十

一高鼓峯心法於血症獨精其云除瘀血與

傷寒外其餘俱屬七情饑飽勞力等因必

見惡心

驗症分明

一味固元湯主之方用人參

炙芪歸身甘草煨薑大棗白芍水煎服血

症最繁以一方統治胡念齋深服之○胡

念齋云補藥可用溫藥亦須急加附桂炮

薑隨宜

一楊齋直指謂陽虛陰必走大吐大衄外有

寒冷之狀。可用理中湯加南木香。或甘草
乾薑湯。其效更著。又有飲食傷胃。胃虛不
能傳化。其氣上逆。亦能吐衄。亦宜上二方。
○余用甘草乾薑湯。其乾薑炮黑。加五味
子二錢。甚效。從慎齋五書得來。

一內經云。血氣者喜溫而惡寒。寒則泣而不流。
溫則消而去之。此數語為治血之要旨。所
以楊仁齋高鼓峯方法神驗。即張景岳用

熟地一兩澤瀉附子牛膝各一錢五分肉桂一錢炙甘草二錢水煎服名為鎮陰煎方雖駁雜而溫藥較多亦能奏效一諸氏遺書云血雖陰類運之者其陽和乎陽和二字指心肺而言其心肺之陽宣布如日月一出燭火無光此諸般邪熱之劑俱除血無所擾則循行於道矣之運者三字更妙血不自運必藉氣以運之既已運

矣。則隨衝任而行於經絡。散於脈外。充於
皮毛。有經常之道。可行何至妄行而為失
血之症耶。諸家俱贅此二句之妙。絕未能
發明其旨。甚矣醫道之難也。高鼓峯雖未
能悟到此旨。而固元陽與之暗合。慎柔和
尚以保元陽為主。亦不過取貴氣補氣以
生血。而亦與此旨暗合。合之則效速。二公
所以名噪一時也。余於此千慮一得。不敢

妄解

保元湯

七

煨薑

三片

黑棗

二枚

桂枝

有

當歸補血湯六

一血症有不宜剛燥之劑者。或血虛煩渴。

熱睡寤不寧。五心煩熱。宜

聖愈湯八

一舌上出血如孔鑽者。煎香薷汁服。外用槐花炒研。摻蒲黃炭亦可。摻之。齒斷血出。

用生竹茹四兩醋浸一宿含之。○牙縫出血以紙紐蘸乾蟾酥少許於出血處按之立止。○滿口齒血出。枸杞子為末煎湯漱之。然後吞下根亦可。○鼻衄用生芫花或根一兩煎服。已上症或統用

甘露飲

七八十

滋腎丸

九十

一血淋尿血用苧麻根十枚水煎服又用海
飄消乾地黃赤茯苓各等分為末每服三
錢以栢葉車前子煎湯下又用亂髮燒灰
用麝香少許用米醋溫湯調下如痛不可
當以藕汁蘆薈汁白蜜調下○又房勞兼
有便尿血宜鹿角膠半兩投藥另麻油頭
髮繩各三錢為末茅根蜜為丸如梧桐子
大每服五十丸鹽湯下

一下血先便後血為遠血用灶中黃土八錢
甘草生地白朮熟附子阿膠黃芩各一錢
五分水煎服名黃土湯○下血先血後便
為近血宜赤小豆三兩浸令出芽晒當歸
一兩共為末以漿水服一錢五分日三服
名赤小當歸散○二方俱出金匱
一大便下血不止諸藥不效者宜

濟生烏梅丸
九六十

一皮膚血汗宜瀉李仁去皮研二錢以鷄梨
汁調淡鹽湯入中白焙乾入麝香少許溫
酒調服立效。又用六味地黃湯加五味一
錢麥門冬川續斷各二錢。

一諸竅出血宜頭髮敗棕陳蓮蓬各等分俱
燒灰研每服三錢木香湯下。

婦人血崩審其寒熱虛實照已上諸方擇
用若脫血之頃不省人事大汗不止者宜

參附湯貧者以當歸補血湯加熟附子二

三錢

一百零五

一大吐大衄太崩之症血若消止急用

獨參湯服服後聽安神定魄勿驚醒則陰
血復生大