

醫說卷第六

宋張杲原著

明王肯堂續輯

臟腑泄痢

當暑勿食生冷

當盛暑時食飲加意調節緣伏陰在內腐化稍遲又果蔬園蔬多將生噉蘇水桂漿唯欲冷飲生冷相值剋化尤難微傷卽殮泄重傷則霍亂吐利是以暑月食物尤要節減使脾胃易於磨化戒忌生冷免有腹臟之疾雖盛夏暑難爲全斷飲冷但剋意少飲勿與生硬果菜油膩甜食相犯亦不至生病也

辨臟腑下痢

病水泄青白或黃白或米穀不化腸鳴腹痛者此傷冷也爲洞泄寒中又爲霍亂吐瀉其脉細弱而緊宜理中丸平胃散調中湯以溫補之盛則金液丹朝真丹主之或藥入則吐出者內陰盛也用湯者當以冷服用丸者以地漿服熱因寒用之法也

病水泄下深黃及有完穀小便赤腹脅但脹滿而不

痛煩燥悶亂渴而喜飲者此傷熱也爲挾熱下利

脉洪大而數宜駐車丸參連散藥皮湯以和之甚則

黃丸調胃承氣湯挾熱下血者藥皮湯主之

病泄濕色黃而有沫腸鳴腹脅脹滿時微作痛者爲
冷熱不調其脉沉緊而小數也服熱藥則轉甚戊巳
丸香連丸主之下部注悶裏急後重者必欲變膿血
利之則愈

病暴泄注下或青白或黃白米穀或化或不化腹脅
或脹或不脹或痛或不痛但噫生熟氣全不思食因
與溫補諸藥而後轉有異證者有所傷也此爲殮泄
其脉外虛而內實關脉沉且緊也宜消積丸不二丸
以化之甚則用備急丸主之

右不二丸用砒不可
多服曾見醫者有害

又春傷以風夏必殮泄又風氣行於腸胃則暴泄下

利其脉浮緩而虛也並宜服羌活安中湯胃風湯荆黃湯訶梨散主之

病赤白下利或膿多血少或膿少血多皆爲有積或先挾熱泄瀉更服溫藥因變膿血下利關脉沉緊按之有力而小疾也並宜先與消化積滯才微利過卽以香連丸駐車丸戊己丸便愈化積滯用消積丸不二丸感應丸淹延惡利用朱粉丹主之

集驗方

治赤白痢

有人久患痢赤白兼下或純白或純赤百藥不愈者病久服藥已多治痢多用毒藥攻擊得臟氣不和所

以難愈史載之用輕清和氣藥與之遂愈後來屢有
驗其方用鴛粟殼蜜炙人參白朮白茯苓川芎甘草
炙黃耆等分爲細末二錢水一盞生薑棗烏梅半箇
煎八分溫服不以時

久患泄瀉

有人久患泄瀉以暖藥補脾及分利小水百種治之
不愈醫診之心脉獨弱以益心氣藥補脾藥服之遂
愈蓋心火也脾土也火生土脾之旺賴火之燥心氣
不足則火不燥脾土受濕故令泄瀉今益心補脾而
又能去濕豈有不效者

又有一種泄瀉作冷作積作心氣不足治之及服硫黃附子甚多皆不效因服火坎丸而愈此腸胃有風冷也胃風湯兼服暖藥亦佳

又有一種脾泄瀉服泰山老李灸肝散而愈乃白芷白朮白芍藥桔梗四味也

醫餘

痢有赤白

凡人患痢不問赤白脉小身涼者易安脉大身熱者難差患痢未有不腹痛者皆緣有積也暑積及熱積多患赤痢冷積多患白痢亦有腸胃有風而患赤痢者有冷熱不調而患赤白痢者暑積痢可用黃連阿

膠丸綿煎散加滑石白痢可用駐車丸感應丸之類
冷熱不調用戊巳丸巴豆丸子之類綿煎散入滑石
治赤痢極有功又有豆飲子加減亦有功治諸般痢
用之每有效官局靈砂丹亦甚奇此數藥自夏及秋
皆不可闕也

同上

鷲粟治痢

治痢以鷲粟古方未聞今人所用雖其法小異而皆
有奇功或用數顆慢火炙黃爲末米飲下或去粟用
殼如上法或以殼五七枚甘草一寸半生半炙大碗
水煎取半碗溫溫呷蜀人山叟曰用殼并去核鼠查

子各數枚焙乾末之飲下尤治噤口痢

治宅編

車前止暴下

歐陽文忠公常得暴下國醫不能愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效公曰吾輩臟腑與世人不同不可服夫人使以國醫藥雜進之一服而愈召賣藥者厚遺之求其方乃肯傳但用車前子一味爲末米飲下二錢匕云此藥利水道而不動真氣水道利則清濁分穀臟自止矣

良方

薑茶治痢

憲宗賜馬總治瀉痢腹痛方以生薑和皮切碎如粟

米用一大盞并草茶相等煎服之元祐二年文潞公
得此疾百藥不效而予傳此方而愈

同上

二藥治痢

鄂渚有統制王存病痢幾年無休無息骨立垂死逢
道人令煎四物湯下駐車丸每服一百粒初服此藥
減半併服之不數日頓愈

近世養生方

治臟腑

肉苳蔻剉作甕子入通明乳香少許復以末塞之不
盡卽用麴和少許果苳蔻煨焦黃爲度三物皆碾末
仍以茶末對烹之

大全集

半夏益脾止瀉

半夏今人惟知去痰不知益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經曰濕勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升甕瓶中慢火燒爲熟水時時呷數日便已

乳煎草撥治氣痢

獨異志唐貞觀中張寶藏爲金吾長 嘗因下直歸櫟陽路逢少年畋獵割鮮野食倚樹歎曰張寶藏身年七十未嘗得一食酒肉如此者可悲哉傍有僧指

曰六十日內官登三品何足歎也言訖不見寶藏異
之卽時還京師時太宗苦於氣痢衆醫不效卽下詔
問殿廷左右有能治此疾者當重賞之寶藏曾因其
疾卽具疏以乳煎葷撥方上服之立差宣下宰臣與
五品官魏證難之逾月不進擬上疾復發問左右曰
吾前飲乳煎葷撥有功復命進之一啜又平因思曰
嘗令與進方人五品官不見除授何也證懼曰奉詔
之際未知文武二吏上怒口治得宰相不妨已授三
品官我天子也豈不及汝邪乃厲聲曰與三品文官
授鴻臚卿時正六十日矣其方每服用牛乳半升葷

撥三錢匕同煎減半空腹頓服

良方

臟腑祕澁

老人臟腑不可用大黃老人津液少所以祕澁更服大黃以瀉之津液皆去定須再祕甚於前只可服寬潤大腸之藥如養生必用方二仁丸是也更用槐花末煎湯淋洗亦妙風藥燥腸

又有一種風祕者當用檳榔七聖丸雖有大黃斟酌服之勿令瀉可也又有婦人產後大便秘須四五日六七日不通者出血已多津液少也濃煎紫蘇湯飲一兩盞自通更一日不通服局方大麻仁丸三十九

醫餘

腸胃流熱

腸胃流熱則糞門暴腫用蝸牛細研塗之則消

腸風痔疾

痔腸風臟毒

痔腸風臟毒一體病也極難得藥亦緣所以致疾不同雖良藥若非對病固難一槩取效常人酒色飲食不節臟腑下血是謂風毒若釋子輩患此多應飽食久坐體氣不舒而得之乃脾毒也王渙之知舒州下血不止郡人朝議大夫陳宜父令其四時取其方栢葉如春取東枝之類燒灰調二錢服而愈予得方後

官賴上以治貳車吳令昇亦卽效提點司屬官陳逸
大夫偶來問疾吳倅告以用陳公之方而獲安陳君
蹙額曰先人也仍須用側柏爲佳道場慧禪師曰若
釋子恐難用此不若灼艾最妙平直量骨瘡與臍平
處椎上灸七壯或年深更於椎骨兩傍各一寸灸如
上數無不除根者又予外兄劉向爲嚴掾予過之留
飲訝其瘦瘠問之荅曰去歲臟毒作凡半月自分必
死得一藥服之至今無苦問何藥不肯言再三扣始
言只這卓子上有之乃是乾柿燒灰飲下二錢本草
曰柿治腸癖解熱毒消宿血有病者宜求之素問腸

辨爲痔

泊宅編

腸風下血

人患腸風下血者何也人腸皆有脂裹之厚則腸實而安腸中本無血血緣有風或有熱以消其脂腸遂薄滲入身中血初患者必服冷藥而愈服之過當則腸寒而脂愈不生其血必再作凡熱者其血鮮冷者其血青黑察其冷熱用藥可也

醫餘

酒利

有人日逐飲酒遂成酒利骨立不食但飲酒一兩盞利作幾年矣因與香茸丸一兩服遂止蓋麝能治酒

毒

臟毒下血

洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹穢理
之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十
度太便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止
血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而
無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦
稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥則泄注氣羸
粥愈減服溫平藥則病不知將基歲醫告術窮垂命
待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服

之才一服知二服減三服膿血皆定自此不十服其
疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下
痢膿血疼痛多日不差檮根白皮人參各一兩爲末
二錢七空心溫服調不飲酒以溫米飲代忌油膩濕
麵青菜果子甜物雞魚蒜等

衍義

脫血

臂多青脉曰脫血尺脉緩濇謂之解衠安臥脉盛謂
之脫血臥久傷氣也

癰疽

服石發疽