

傷寒指掌

貞

傷寒指掌卷四

傷寒變症

衄血 吐血 蓄血 熱入血室 痞 痞滿

結胸 下痢 癰疹 發黃 瘧 發狂

煩躁 停飲 心下悸 嘔吐 吐衄 噎

呃逆 喘 奔豚 動氣 戰振慄 筋惕肉瞤

循衣摸床 不食不便 不便能食 百合

狐惑 陰毒 陽毒

臨城縣志

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

卷四

1040

附錄

不

鐵

12

1

卷之四

21
7

卷之五

大

1

張氏

卷之四

輝

25

卷之四

解

金不

不

2

6

—

1

1

1

10-11-1964

1

2

10

1

1

傷寒指掌卷之四

傷寒變症

傷寒有本病有變病。本病者如太陽有頭痛項強陽明有潮熱譫語是。治法不外本經。故即附于本經之下。變病本不應有此病。祇因治不中竅。或遷延日久而變生諸症。如蓄血結胸等症是也。治法不得不隨症用藥。因病施治。用列于左。以盡傷寒之變。

衄血新法

衄血者。血從鼻中來也。傷寒衄血。其因有三。太陽失

表熱於經而衄者有頭疼目暝之徵宜清解之
角湯主之不可再汗也

羚羊湯

羚羊 鮮地 赤芍 黑梔 牛膝

薄荷 丹皮 連翹 元參 澤瀉

荆芥 茅花

陽明失下熱於手裡而衄者有漱水不欲嚥之徵宜
下解之

生地 桃仁 查炭 赤芍 中白

大黃 丹皮 牛膝 知母

此釜底抽薪法大黃不妨重用也

更有濕熱之症藥宜涼解候用辛溫而動經血亦能致衄宜清血分之熱

犀角 丹皮 連翹 茜根

生地 赤芍 元參 茺蔚根

如衄後身涼脈靜邪從紅汗而解也若衄後病勢反劇者更傷其陰也大為危候其衄勢必重須大劑六味飲加麥冬五味主之衄止則生有衄勢太甚陽隨陰走四肢厥冷者六味加牛膝肉桂以鎮之

仲景論云若頭痛者必衄宜桂枝湯此桂枝湯補在

上文當須發汗下又云劉者必衄乃解麻黃湯主
之此麻黃湯補在上文當發其汗下乃古人倒筆法
是申明致衄之由於失表非謂衄後服麻黃桂枝也
觀下文衄家不可發汗之戒義可知矣

吐血新法

傷寒吐血每因失治所致有因太陽感寒無汗惡寒
頭痛發熱寒邪外束法當發汗若失于表散陽氣不
得外洩則逆走陽絡之血妄行則致吐血或由其人
素有血虛寒邪犯肺而咳震傷血絡亦致咳血均當
以清疏榮衛表散寒邪為治古人皆以麻黃桂枝等

湯治血症是也。然未免太峻。當小其製。解散榮衛之邪。自然嗽止。身涼。血不治自止矣。

荊芥 薄荷 淡芩 橘紅 生叶

防風 蘼藜 芍藥 杏仁 茺根

薤白 荊防薄荷以散風去寒。橘紅杏仁以降氣。芍藥甘草以調榮。微煎渴者少佐黃芩以清熱。則榮衛之邪解散矣。

若內有伏火。外感寒邪。熱被寒束。火逼絡血。而致衄血。欬血者。外症亦惡寒發熱。但兼舌乾口渴。為異治。宜辛涼清解榮衛。

桂枝 羌活 黃芩 黑梔

石膏 桑葉 丹皮 生艸

羚羊 杏仁 加芎藭根

次用和血清紛之品調之

和血清紛丸

細地 當歸 連翹 茯苓 阿膠

丹皮 白芍 黑梔 生艸 童便

桑葉 羚羊 湖藕

有因風溫之邪候汗動血有因三陽熱盛沸騰經血
皆致吐血凡見眼閉目紅神昏語亂煩躁漱水皆熱

傷血絡之症也宜治絡中之瘀熱

犀角地黃湯加山查一金川連喬銀花若大便

閉者加製大黃尤妙

若見胸滿而疼者血瘀于絡也當攻之清之

犀尖 歸尾 桃仁 查炭 生軍

生地 赤芍 降香 青皮 牛膝

有候發少陰之汗動其經血從口鼻耳目中出者名
下厥上竭不治用大劑人參熟地五味杞子阿膠童
便之屬勉冀萬一或用中白散亦得

有暴吐臭腐之血名內潰不治

有吐熱眩然吐血。瀉血色。脈形氣俱實者。三黃湯主之。

疫癘多有此症。其來必暴。勢不可遏者。是也。

蓄血述古

凡太陽病不解。其邪由經入腑。熱結膀胱。則血凝蓄。血瘀則心氣結。其人故如狂。血自下者。愈邪從血下而解也。其外不解者。當先解其外。宜桂枝湯。外已解。但小便急痛者。是血蓄也。桃仁承氣湯下之。

太陽病六七日。表症仍在。脈微而沉者。病邪向裡也。反不結胸者。熱結下焦也。其人發狂。少腹鞭滿。小便

自利者以太陽隨經瘀血蓄于裡也抵當湯下之則愈

太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也此濕熱不行之故小便自利人如狂者血結諦也陽明病其人喜忘者必有蓄血蓋心主血之凝則心氣結而失其官矣故喜忘此素有瘀血非傷寒所得者屎雖硬大便反易其色必黑以浮血隨便而下故也俱宜抵當湯下之傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘宜抵當緩其血

以上述仲景論蕪參來蘇集類方註釋

蓄血新法

蓄血一症雖病在血分亦須分別陰陽治之如血瘀
上焦為陽血蓄下焦為陰太陽失表熱瘀于裏血蓄
上焦為陽太陽悞下陽氣下陷蓄血下焦為陰
上焦蓄血因不得汗不能發斑而蓄血也其脈人迎
必緊者數而有力之象也外症面紅舌燥發躁欲
狂或頭搖目瞪大便下血水而手除食指外其餘各
指皆抽掣是也法當清之行也

犀角 歸尾

丹皮

丹參

芎

生地 赤芍 桃仁 一金 鮮藕汁

下焦陽虛蓄血即仲景所稱熱結膀胱是也桃仁承氣湯下之

下焦陰虛蓄血乃因誤下陽氣下陷陰血受傷血因寒而凝也其見症面白目青眉皺目瞪寒戰口噤舌蒼白滑大便下血心兩手除食指之外其餘各指皆抽掣是也宜溫補之

人參 當歸 安桂 炙艸

白朮 升麻 附子 牛膝

此方乃溫補以升陽氣如服後寒噤稍止一二

時復作者此葯力不及再進之以續陽氣寒禁
得止者生不已者死

凡血蓄在上焦其人多妄蓄血在下進其人多狂
凡蓄血症大便下血水見糞者生不見糞者死

下血

下血

下血

熱入血室

婦人傷寒經水適來適斷之時熱邪乘虛而入血室其症晝日明了暮則譫語如見鬼狀若發熱惡寒日輕夜重以腹脹滿者血為熱瘀也法當和血散邪

柴香歸丹參益母草荊芥炭

芩蘓芎丹皮查肉炭

又方

荊丹一金黑膏芎

柴芩香附藕汁

如汗多為表虛加桂枝拌白芍以和解之

寒熱如瘧前方加桂枝和解之

厥而下痢者此熱乃寒邪所侵也前方去芍加桂枝乾姜溫散之

煩渴者屬裡熱去香附芫蕪加黑梔花粉以清之
小腹硬滿作痛當以逐瘀為主前方去芫蕪加桃
仁紅花延胡牛膝等攻以行之合參金鑑第一書
徐大椿云凡女人經至而寒熱不至不得即名為熱
入血室若果熱入血室必有入暮昏譫之症為據