

丹
玄
玉
案

卷六

丹臺玉案卷之六

明新安休邑後學孫文胤對微父榮著

古潤外父江東銘懷一父

常山縣庠盟弟黃袁仁德懷父

蘭陰盟弟方調元善長父

全閱

小兒科

男子婦人之病可以問而知。可以切而得。斷然生辯。雖易審差劇。猶有所依據而不至於大悞。若小兒者。懷抱之時。雖有所苦。而不能言。及能學語。又不能猜。

其苦之處。欲診其脉。則骸骨短小。氣血未足。寸關尺
將何以分。浮中沉。將何以定。雖有一指滾取二部之
說。而終未得其部位。沉至數急促。豈能以悉審之。大
約八九至爲平。五六至爲遲。十二至爲數。依稀彷
彿之間而已。故啞科治療之難。每十倍於大人。而尤
不可以不慎者也。惟虎口之脉。稍爲可驗。其脉在食
指外側。每一部一關。三節爲三關。男視在左。女視在
右。有筋脉如糸。暎於肉內。仔細觀之。紫則爲風。紅則
傷寒。青則爲驚。白則爲疳。黃則爲脾困。青黑則爲蠶

驚。八掌則爲。內而若三關通處爲沉疴之候。惟此可以少知之耳。雖然幼科之治病。當多方求之。豈可執虎口之脉法。而盡小兒之諸病哉。必於病之未形。而用意察之。庶可以爲預消之地。如小兒呵欠連綿。乃小兒臟腑受邪。病之漸也。若面赤。則知其風熱而渴。肝之劑可以先服。面青。則知其驚風。而治驚之劑可以先服。面黃。則知其爲脾虛。而補脾之劑可以先服。多睡。則知其爲內熱。而清熱之劑可以先服。口中氣熱。則知其爲傷風。而疎風之劑可以先服。皆當隨症。

形而先治之。勿俟其發而後用藥也。其有不治之症者。尤不可以不知。小兒眼上有赤脉。顛睡及陷者。一不治也。魚口氣龕。齒咬人者。二不治也。令汗如雨。痰熱不退者。三不治也。臍風撮口。鎖肚吊腸者。四不治也。風攻頤領。脣項腫硬者。五不治也。臭有黑色者。六不治也。喉喘心痛者。七不治也。四肢浮腫者。八不治也。曾高而突起者。九不治也。五軟五硬者。十不治也。凡見此等之症。卽當去矣。苟不知幾而復藥之。則病者之眾。雖不由於我。我亦何辭於彼哉。大凡小兒

之病有常。多者不得所憇則易怒而啼。故疝痛常多。飲食不知節。雖飽而猶求食。故脾病常多。心神未定。間響易動。故驚病常多。性喜吮乳。甘食停積。而易感風熱。故痰病常多。治兒之病。審其所常多者。酌而施之。以已之意。叅病之情。亦庶乎用藥之無悞也。然此數種。雖或常有。而肝脾之病。尤多神而明之。存乎其人。得心應手。不可以言求也。

初誕法

小兒在胎。稟陰陽五行之氣。以生臟腑。百骸。藉胎液

以滋養。受氣既足。自然生育。出世之時。口含血塊。啼

聲一出。隨卽喫下。而毒伏於命門。遇天行時氣。或飲

食停滯。或外感風寒。驚風發熱等。因發爲瘡疹。須急

於未嘗時。用軟帛聚指空出其血。用黃連砂甘草

解之後。出痘亦輕。有喫人卽時肚脹。嘔吐氣短。不乳

者。用茯苓丸治之。但黃連性寒。若母稟氣有染積熱

者。宜服若滋味淡薄。胎元弱者。又不宜用。硃砂固能

解毒。金石鎮墜。不若牛黃分許。蜜調與吮爲佳。又

有嬰兒因其難產。或冒風寒。而垂危者。切不可斷隔。

帶急烘綿絮包抱懷中。急以胎衣置火中。煨燒更用大紙捲於臍帶上。往來燎之。使煖氣入腹。須臾氣復白甦。猶戒洗浴恐腠理不密。元氣發泄而外邪乘之也。

立方

硃蜜法 朱以黃連煎湯拭兒口。吐去惡汁。再以硃砂一分研細。蜂蜜少許抹兒口。吮之鎮心定竅。安神解毒。

牛黃法 以牛黃二分。硃砂半分。竹葉七片。煎湯調

灌益肝膽除煩熱祛驚邪辟惡氣除小兒百病。

茯苓丸

赤茯苓

黃連

胎冷者易芍藥

枳殼

各等分

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大。每服一丸。乳汁化下。

護胎丸

小兒初生。肌膚未實。宜用舊絮護其背。不可太煖。更宜頻見風日。則血氣剛強。肌肉緻密。若藏於重幘密室。或厚衣過煖。則筋骨軟脆。不任風寒。多易致病。衣服當隨寒熱加減。但令背煖爲佳。亦勿令出汗。恐表

虛風邪易傷乳哺。不宜過飽。若宿滯不化。用消乳丸。
治之陳氏所謂恐三分寒。喫七分飽。頻揉肚少洗澡。
要肚暖頭涼。皆至論也。須令乳母預慎。七情六淫厚
味炙煩。則汁清寧。見不致病。保嬰之法。未病則調治。
乳母既病。則審治。嬰兒亦必兼治。其母爲善。

立方

消乳丸

砂仁

炒

蓬术

煨

三稜

陳皮

神麴

麥芽

各五錢

香附

一兩

炒

丹臺玉案


六慄

護喉丸

五

右爲末。麴糊爲丸。麻子大。每服三丸。白湯下。

面部氣色舉症圖



下頷屬腎水。左腮屬肝木。天庭屬肺金。半週兩歲爲嬰兒三四歲爲孩兒五六歲爲小兒七八歲爲童子十歲爲

面部氣色采症

古云。小兒謂之芽兒。如草之芽。如水之源。蓋。肺。臟。腑。脆嫩。口不能言。最難投劑。當首察色。而知其。所屬。次驗。虎口以辨其所因。實爲治法之簡要也。

小兒有病。看面部全依氣色。決分明。望聞問切。能窮究。臨病方無拘手尋。面部諸般。各有屬。眉稜上。下。俱屬木。左目太陽。右太陰。鼻準。脾家。土心。應唇。口兩傍。脾所居。兩目。顧。問。腎之墟。額。同。顧。臉。屬心火。左頰。原來肝所主。右頰。脣中。是肺基。四時。各有

一色強。依時無急逆時殃。要分旺相休囚否。盡在
人心自酌量。春天青旺亦爲相。黑休白囚黃否家。
夏天赤旺黃相吉。青休黑囚白不良。假爲肝病而
青時白色當春未易醫。此是肺金來剋木色黃。又
彼脾家欺心病。夏天尚面赤。望色只愁形色黑。此
披腎水克心火。白色又彼肺家屈肺病。愁來面白
宜。若行赤色最難除。此因心火剋肺金。青色反令
肝作威。腎病面黑。各天相。黃色現時多悒怏。此乃
脾土尅腎木。色赤反致心磨障。脾居四季面形黃。

如遇青色最難當。此爲用木克脾土。色黑反使腎家強。春赤夏黃秋黑色。冬青雖相亦無益。從前來者實形傳實。瀉其子乎方吉。五臟所屬各一官。五色分來人不全。色內能分明與滯。據色方能辨吉凶。心赤順時鷄冠色。不宜瘀血糊塗赤。肝形翠羽順光多色。如嫩草安爲吉。脾色貴如蟹腹黃。形如枳實必災殃。肺形獨貴猪脂狀。枯骨定知壽不長。腎色最尚如鳥羽。形如炭煤非吉理。色色去將兩色分。吉凶灼然不虛語。更看人氣清明順。神昏氣

緩作內認。瘦而氣壯色必實。肥而氣怯色必嫩氣。
壯則實以安祥。氣怯則虛壽不長。再看得病面如
何。發熱額上紅必多青色。現時急驚作若成昏暗。
定知殂。額冷足冷夾食驚。額熱足熱傷風重。顙門
貴合不宜陷。腫起成坑兩無用。印堂青色驚之病。
紅色心驚白主和。或見微微青紫色只因客忤暮
相過。山根青兮驚爲疾。紫色傷於乳和食漏脫宜。
黃白須亥年壽黃爲吐利基。若成脫白是平虛。兩
頰赤爲啼哭熱。左腮紅是痰氣爲。右腮紅是傷風。

熱面青脣亦傷寒至面白皆黃濕熱生面黃弄舌
五心熱兩眉紅主兒夜啼。肩繩頭疼。痢疾爲眼脬
浮腫主久嗽。病之將瘥目皆黃。淡紅心熱無多說
目多直視乃驚風。赤脉貫睛肝病凶。魚目定睛非
吉兆。瞳人中陷死之宗。

二關觀指舉症

虎口三關左手圖應心用

虎口三關右手圖應肺脾

魚鰾形

男兒進奉大指於外爲驚。脣爲逆

女兒進奉大指猶然爲順於爲逆

青色驚吼亦身熱

懸鉤形



青黑紫駁赤色膚熱慢驚

如環形



主血食腥吐。

如蠻形




主諸寒米酒物。

水字形



主疎密積滯驚風。

如釣形



主傷牛冷物。

曲向外形



主傷風寒客汗。

七字形



土駁駕色舌黑慢脾風

雙釣形



主傷寒

曲向裏形



主傷寒無汗