

重鑄陸要三書

道光乙未年嘉平月

重鵠醫災三書

板藏黔省江西會館

重鑄醫要三書目錄

第一種

傷寒六經定法

瘟疫論

痢門絜綱

論吐血

論蟲證

第二種

胎前產後證治

第三種

福幼編慢驚證治

遂生編痘疹證治

按醫要三書本是貽硯堂所刊余目擊耳聞活人
不少卽刷訂千部溥散海內因板毀失無從刷印
不知者踵接索取不勝其煩爰募時賢重鐫壽世
附入瘟疫胎產吐血諸法以助好生者所需

傷寒

傷寒六經定法

進賢舒詔馳遠著

太陽之脈從頭項下肩臂挾脊抵腰中故其見病如此

風傷衛脈浮緩
寒傷營脈浮緊

太陽病少陽勝脾

此爲太陽經証

時有微汗者爲風傷衛法主桂枝湯以驅衛分之風

桂枝、白芍、甘草

生薑、大棗

壯熱無汗者爲寒傷營法主麻黃湯以

發營分之寒

杏仁、甘草、麻黃、桂枝

頭身疼痛發熱惡寒不汗出

而煩燥者爲風寒兩傷營衛

法主大青龍湯營衛互

風傷衛主桂枝湯寒傷營主麻

黃湯風寒兩傷營衛主大青龍

湯一定之法也然必察其脈候不可

用若元陰不用

太陽邪傳膀胱口渴而小便不利

此爲太陽腑証法主

足、桂麻青龍湯中、宜加歸地、
陰助汗、真陽素虛、宜加薑附、
經禦表、此又法中之法也。

五苓散以去腑邪。

按小
猪苓、茯苓、白朮、澤瀉、肉桂、

便不利、氣化不行、病在氣分、不可

用猪苓血分之藥、當以桔梗易之、

太陽腑証、有蓄

尿、蓄熱二端、膀胱有尿、熱邪入而搏之、則少腹滿、爲

少腹不滿、爲

蓄尿、若無尿、熱邪入無所搏、則

肉桂、蓄熱者易滑石、有爲蓄尿

爲蓄熱、蓄尿者倍用桂、蓄熱者易滑石、有爲蓄尿

過多膀胱滿甚、脹翻出竅、尿不得出、膀胱異常者、名

爲癃閉、不可用五苓、愈從下利、其脹愈加、而竅愈塞、

尿愈不得出、法宜白蔻。

宣暢、砂仁、半夏、醒脾、化

桔梗、開生薑、升散、如壺吸蓋、胸膈、使上焦得通、中樞得運

開胃、肉桂、氣

而後膀胱之氣、方能轉運、斯竅自順、而尿得出、若少

而腹硬滿、小便自利者、爲膀胱蓄血。

方用紅花、小茴、生地、歸尾、加入五苓

胃太陽

散中從小便以逐其邪

陽明經病脈洪而長。陽明主肌肉其脈挾鼻氣於目故身熱目痛鼻築氣。

陽明腑病脈滑而實。

陽明病前額連眼眶脹痛。鼻築氣而流清發熱不惡寒。此爲陽明經証法主葛根以解陽明之表。口燥心煩汗出惡熱渴欲飲冷。此熟邪漸入陽明之裏法主白虎湯以撤其熱。石膏知母甘草粳米張目不眠聲音响喎口臭氣粗身輕惡熱而大便閉者。此熟邪已歸陽明之腑法主小承氣湯微蕩其熱。畧開其閉。大黃枳實厚朴加之胃實腹滿微發譏語者可以調胃承氣湯以蕩其實而去其滿。大黃芒硝甘草更加舌胎乾燥噴熱如火痞。胸腹塞悶滿胸腹實胃上硝更加舌胎乾結堅。按

石。與夫狂讖無倫者。法主大承氣湯急驅其陽。以救。

其陰。○大黃、芒硝、厚朴枳實。

少陽頭痛在側耳聾喜嘔不欲食胸脇滿往來寒熱。

此爲少陽經証

法主柴胡湯以解少陽之表。

柴胡半夏人參甘草生薑大棗

口苦咽乾目眩。

此爲少陽腑証

法主黃芩以瀉少陽裏熱。

太陰經病脈沉而細。太陰之脈布胃中絡於嗌。故腹滿而吐食不下。

太陰腹滿而吐食不下時腹自痛自利不渴手足自溫。法主理中湯加砂半。

人參白朮、乾薑

甘草砂仁、半夏。若胸膈不開。

飲食無味而兼咳嗽者乃留飲爲患。法宜理脾滌飲。黃芪、白朮、砂仁。若由胃而下走腸間瀝瀝有聲微痛。白蔻、半夏、乾薑。

胆三生

少陽受病脈弦而數。少陽主胆其脈循脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。

脾

斬關丸。硫黃五兩。猪腸煮過肉桂一兩。白蔻。川椒。生附子。生白术。吳茱萸。半夏。雞內金。各五錢。共爲末。飯搗成丸。

作泄者。名曰水飲。卽于前藥內加附桂。若由胃而上入胸膈。咳逆倚息。短氣不得臥者。名曰支飲。卽于前藥內加故紙。益智。更用斬關丸。以下。若由胃而旁流入脇。咳飲刺痛者。名曰懸飲。

卽于前藥內加芫花。草葉。搜出助經之痰。則愈。若由胃而溢出四肢。痺軟瘻痛者。名曰溢飲。卽于前藥內加虎骨。威靈仙。在手更加薑黃。在足更加附子。又有

着痺行痺二症。痛在一處者爲着痺。流走無定者爲行痺。與溢飲相似。而証不同。乃爲火旺陰虧。熱結經隧。赤熱腫痛。手不可近。溢飲不近赤。不熱。法宜清熱潤燥。人參竹瀝。生地阿膠。天冬玉竹。在手加桑枝。在足加桑根。

若身目微黃。而小便不利。不惡寒者。爲陽黃。法宜

陰黃、顏色暗濁

少陰之脈貫腎絡於肺繫舌本故見小便短咽中乾心煩躁臥等証

外邪挾火而動之証脈細沉數

外邪挾水而動之証脈微沉細

厥陰經病脈沉而弦厥陰之脈循陰氣而絡於肝

茵陳五苓散若腹痛厥逆身重嗜臥而發黃者爲陰黃法宜茵陳附子湯人參、白朮、茯苓
附子、乾薑、茵陳

少陰督真陽素旺者外邪傳入則必協火而動心煩不

眠肌膚燥神氣衰減小便短而咽中乾法主黃連

阿膠湯分解其熱潤澤其枯

黃連、黃芩、白芍、阿膠、雞子黃

真陽素

虛者外邪則必協水而動陽熱變爲陰寒目瞑倦臥

聲低息短少氣懶言身重惡寒四肢逆冷腹痛作泄

法主溫經散邪回陽止泄

附子、乾薑、黃芪、白朮、半夏、砂仁、故紙、益智

厥陰有純陽無陰之証有純陰無陽之証有陰陽錯

厥陰經病脈沉而弦厥陰之脈循陰氣而絡於肝

喻嘉言曰。厥陰有純陽無陰之証。有純陰無陽之証。有陰陽差多。差少之証。有陽進欲愈。陰進未愈之証。復有陰居八九。陽居一二之証。厥而發熱。熱深厥深。上攻而成喉痺。下攻而便膿血。此純陽無陰之証也。脈微細欲絕。厥冷。炙之不溫。惡寒。大汗大利。燥不得臥。與夫冷結關元。此純陰無陽之証也。厥三日。熱亦三日。厥五日。熱亦五日。手足厥冷。而熱邪在胸。水熱在胃。此陰陽差多。差少之証也。渴欲飲水。飢欲得食。脈滑而數。手足自溫。此陽進欲愈之証也。默默不得食。嘔吐涎沫。腹脹身疼。此陰進

劇。此陰陽錯雜之証也。法主寒熱互投。以去錯雜之。
雜之証。張目不眠。聲音响亮。口臭氣粗。身輕惡熱。熱深厥深。上攻而爲喉痺。下攻而便膿血。此純陽無陰之証也。法主破陽行陰。以通其厥。喉痺者用玉竹。天白。便膿血者用生地。阿膠。黃連。雞子黃。雞子甘寒潤燥。其白象天。輕清上浮。用治上燥。其黃象地。重濁下降而潤下燥。四肢厥冷。爪甲青黑。腹痛拘急。下利清穀。嘔泄。以回其陽。附子乾姜砂仁半夏黃芪白朮吳萸川椒腹中急痛。吐利厥逆。心中煩熱。頻索冷飲。飲而卽吐。煩渴轉增。腹痛加劇。此陰陽錯雜之証也。法主寒熱互投。以去錯雜之。

未愈之証也。下利清穀裏寒外熱。嘔而脈弱本自寒。下復悞吐。

煎濃另用黃連浸取輕清之汁。挽和溫服。

下面反戴赤此陰居八九陽居一二之証也。大率陽脈陽証當取用三陽經治法。陰脈陰証當取用少陰經治法。厥陰病見陽爲易愈。見陰爲難痊。其表裏雜錯不分。又必先溫其裏。後攻其表。設見喚咳不利。吐唾膿血。則溫法不可用。仍宜分解其熱。而潤澤其枯。世醫遇厥陰諸証。如涉大洋。茫無邊際可測。是以開口動手。卽鑄茲發共窓。俾後學奉爲指南云。

邪。附子、乾姜、砂仁、半夏、黃芩、白朮、吳萸、川椒。

凡病總不外乎六經。以六經之法。按而治之。無不立應。一經見証。卽用一經之法。經証腑証。兼見卽當表裏兩解。若太陽與陽明兩經表証同見。卽用桂枝葛根以合解兩經之邪。兼少陽更加柴胡。兼口渴而小便不利。卽以三陽表藥加入五苓散之中。兼口苦咽乾目眩。更加黃芩。兼口燥心煩渴欲飲冷。當合用白虎湯于其間。併三陽表裏而俱解之。若三陽表証與三陰裏寒同見。謂之兩感。卽當

用解表于溫經之內。若裏重于表者。但當溫裏不可兼表。無論傳經合病。併病陰陽兩感。治法總不外乎此。

陰陽二字。迺辨証最要之綱領。
此而有悞。必致殺人。

少陰中寒。脈沉弱無力。

病有陰陽之辨。不得其法。無從分認。卽如舌胎乾黑。芒刺滿口。皆有陰陽之分。有爲少陰中寒。眞陽遭其埋沒。不能薰騰津液。而致舌胎乾黑。芒刺滿口者。法當驅陰救陽。陽回則津回。方用附子。乾姜。黃芪。白术。砂仁。半夏。故紙等藥。其証必目瞑嗜臥。聲低息短。少氣懶言。身重惡寒。
此辨陰病十六字有爲陽。

陽明火旺、脈滑實有力

傷寒之經分注

明火旺。燦乾津液。而舌胎乾黑。起刺者。法當驅陽。
救陰。陰回則津回。方宜斟酌于白虎承氣諸法。以
消悉之。其証必張目不眠。聲音响喨。口臭氣粗。身
輕惡熱。此辨陽証十六字。凡辨諸証總不外此。陰陽各十六字。

又如厥逆一証。亦有陰陽之分。凡四肢厥逆者。外
見張目不眠。聲音响喨。口臭氣粗。身輕惡熱之証。
爲陽厥法。主破陽行陰。以通其厥。若外見目瞑倦
臥。聲低息短。少氣懶言。身重惡寒之証。爲陰厥法。
主驅陰散邪以回其陽。

陽厥證。脈沉有力。
陰厥證。脈沉無力。

讞語爲實。實者邪實也。陽明實熱。上乘於心。心爲熱冒。則神魂昏亂。而讞妄無休。此實邪也。實邪爲病。其聲必高。其氣必壯。其脈必強。其色必厲。凡登高罵詈。狂呼躁擾之類。皆是。鄭聲爲虛。虛者神虛也。元神失守。爲邪所乘。神志昏沉。而錯亂不正。此虛邪也。虛邪爲病。其聲必低。其氣必短。其脈必無力。其色必萎悴。凡其自言自語。喃喃不全。或見鬼恠。或驚恐不休。或問之不應。答之不知之類。皆是。

又如讞語一証。原有陰陽虛實不同。經言實則讞語。虛則鄭聲。在陽明爲實証。爲讞語。乃陽明冒實。燥結不通。陽火亢極。真陰立亡。而神明內亂。狂讞無倫。法主大承氣湯。急驅其陽。以救其陰。在少陰爲虛証。爲鄭聲。乃少陰中寒。魄汗出而下利。氣虛陽脫。神魂無主。細語呢喃。錯亂顛倒。法當急回其陽。以固其脫。方用附子炮姜。人參黃芪。茯苓白术。故紙益智藥。二証陰陽均以上十六字訣辨之

又如煩燥一証。陰陽互關。曰陰煩陽燥。又曰煩出。

子心燥出于腎其實不然煩者未有不燥燥者未

有不煩煩燥皆同而証之陰陽不同有爲少陰亡

肾

少陰煩燥脈微沉細

陽明煩燥脈洪滑

少陰昏睡脈微細
陽明昏睡脈洪滑

陽身熱多汗而煩燥者乃腎中真陽隨汗而浮越于外法主附子炮姜黃芪白朮故紙等以回其陽有爲陽明熱越身熱多汗而煩燥者乃胃中津液隨熱而盡越于外法主人參白虎等法以撤其熱

二証陰陽亦以上十六字訣辨之

又如昏睡一証在少陰爲陰霾盛而陽不開法當急回其陽以禦其陰在陽明爲熱盛神昏法當速

撤其熱以退其陽

其証陰陽總以上十六字訣辨之

且昏睡與

不眠其証不同而法相同在陽明

胃

張目不眠者其

常也然又有熱盛神昏之証其人均爲口臭氣粗

汗出惡熱其法亦均當撤其熱在少陰但欲寐者

腎

其常也然又有裏陰過勝隔拒真陽隨汗外越不

得內交于陰亦不得眠其人均爲頭懸身重少氣

懶言其法亦均當回其陽

咽喉痛者有火有寒寒痛不赤不熱不腫不作臭

穢身倦惡寒畧可硬飯飲水吞津則痛甚

可食硬不可食