

校刻傷寒圖歌活人指掌卷之五

百二三 赤茯苓湯厥陰消渴氣上衝 吐下後身振搖筋肉惕

赤茯苓

陳皮

人參

各一錢

白朮

芍藥

半夏

各一錢

水二盞煎至八分去滓服

百二四 猪苓湯嘔渴心煩不得眠 熱在下焦小便不利

猪苓

茯苓

滑石

澤瀉

阿膠

各二錢半

水一升三合先煮四味取七合去滓內阿膠分三服

百二五 大半夏湯傷寒痰証

半夏

二錢半

白茯苓

二錢半

生薑

各一錢二分半

水二盞煎至一盞去滓臨臥時服

只作一服若有熱痰加甘草脾胃不利去甘草加陳皮

百二六 半夏生薑湯 卽小半夏湯 咳逆 穀不下而嘔吐

半夏 一兩二分 生薑 二兩

水三盞煎至二盞去滓分二服

百二七 半夏桂枝湯 痰癰夏感寒非時暴寒伏於少陰脉微細次必下利名腎傷寒咽痛

半夏 桂枝 甘草 各一分

水二盞生薑五片煎至八分去滓旋旋呷之

百二八 生薑汁半夏湯 胃中似喘不喘似嘔不嘔微心煩

半夏 半兩

水一盞半生薑自然汁半盞同煎至七分去滓溫服

百二九 厚朴半夏甘草人參湯

厚朴 四錢 半夏 一錢半 人參

水二盞生薑五片煎至八分去滓服

百三十一 甘草瀉心湯 即十夏瀉心湯此內減甘草十三分下之心下痞

甘草 兩 半夏 八錢一字 黃芩 乾姜

人參 各一兩 黃連 三錢一字 大棗 十二枚

水三升三合煮取二升去滓再煮取一升分三服

百三十二 附子瀉心湯 心下痞惡寒汗出

大黃 半兩 黃連 黃芩 各二分半 附子 半枚

先以水一盞煮附子取半盞次以白沸湯二盞漬上

一時 乃去滓入附子汁和勻溫分二服

百三二 生姜瀉心湯

下利心下痞腹中雷鳴

於甘草瀉心湯內減甘草沫三錢一字半加生薑一

兩三錢

百三三 三黃瀉心湯

心下痞按之濡其脈關上浮者可限惡寒不可服

於附子瀉心湯內去附子

百三四 霹靂散

陰盛陽身冷脉沉煩燥不飲水

附子 一枚炮

取出用冷灰培之取半兩入真臘茶好

錢同

更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜半

匙候溫冷服須煩燥止得汗出差

百三五 桔梗半夏湯

喉腫見後一日七十四

自三六附子湯

陰證四肢身痛

沙陰背寒惡口中和

附子

一枝生

茯苓

芍藥

人參

各一兩

白朮

一字兩三錢

水二升六合煮取一升去滓分三分

自三七朮附湯

風濕小便不利溫濕

白朮

六錢二字

甘草

二錢一字

附子

生薑

各半兩

水二升棗二枚煮取一升去滓分二服

自三八羌活附子湯

咳逆

羌活

附子

炮七次

茴香

各一錢半

木香

乾薑

一兩許

為細末每二分水一盞塩一捻煎十數沸熱服

百三九 真武湯

陰證脈沉身痛發汗過多筋惕肉瞤少陰腫痛小便不利

茯苓

芍藥

生薑

各一兩

附子

一枚

白朮

大錢二字半

水二升六合煮取一升三合去滓分三服欲者加

五味子細

辛乾

姜小便利者去茯苓下利者去芍藥加芫姜嘔者去

附子加生姜

百四十 白通湯

少陰下利

葱白

四莖

乾薑

三分一字半

附子

一枚

水一升二合煮取六合去滓分二服

百四一 白通加豬膽汁湯

下利厥脈不至

附子

一枚

乾姜

三分二字半

葱白

四莖

人尿

一合

豬膽汁

水一升者取半升去滓內八尿膽汁相和分二服無膽汁亦可

百四三 乾姜附子湯

下後復發以汗唇青不得臥無表證脈微者

乾姜

三錢一字半

附子

一枚生

水一升煮取三合半去滓內服

百四三 乾薑黃芩黃連人參湯

上寒血吐下寒氣內格食入即吐

乾薑

黃連

黃芩

人參

各三錢

水一盞半煎至八分去滓內服

百四四 正陽散

陰毒傷寒面青身冷心硬四肢冷

甘草

乾姜

各二分

附子

二兩

麝香

一兩

皂莢

一兩

皮

為細末每二錢水一中盞煎至五分熱服

霍亂

百四五理中湯

太陰自利不渴寒多而腹痛

人參

甘草

乾姜

白朮

各二錢

水二盞煎至八分去滓服

腎氣動者去朮加桂三錢吐多者去朮加生薑二錢下多

者還用朮悸氣小便不利者加茯苓二錢渴者加朮一錢半腹痛者加人參一錢半寒者加生薑一錢半腹滿

附子下利加

百四六理中加茵陳湯

傷冷中寒脈弱氣虛變為陰

本方內加茵陳蒿二錢

百四七理中加石膏湯

霍亂轉筋

本方內加石膏半兩

百四八理中丸

痞而胃寒霍亂吐寒多不渴未成結胸者厥陰當不能食食即吐之

大理中湯同但為細末練蜜丸如彈大沸湯半盞化

百四九 增損理中丸

太陰下之胸痛硬 諸結胸宜服此

人參

白朮 各二兩

甘草

乾姜

各一兩半

黃芩

半兩

枳殼

十二片

為細末煉蜜丸如彈大沸湯化一丸

渴者加姜薑有汗出者加牡蠣

百五十 枳實理中丸

寒實結胸

茯苓

人參

白朮

乾薑

甘草

各二兩

枳實

十六片

為細末煉蜜丸如雞子黃大每一丸熱湯化下

連進三服

百五一 四順丸

少陰十餘日下利不止手足微冷

理中丸內加甘草一倍

四順湯

身無熱脉沉苦者默默不飲見光時腹痛下利手足逆冷

埋中湯加甘草一倍是也依本方煎服

百五二 脾約丸

老人津少大便澀 脚氣大便燥

大黃

二兩

枳殼

厚朴

白芍藥

各半

麻子仁

一兩

杏仁

三分

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水

下未治再加

金匱鳳引湯

大黃

乾姜

龍骨

各四兩

桂枝

二兩

甘草

牡蠣

各二兩

凝水石

滑石

赤石脂

白石脂

石膏

紫石英

各六兩

右十二味杵為粗末以韋囊盛之取三指撮井花水三升煮三沸去滓溫服一升

百五三 柴胡半夏湯

痰熱頭疼手足煩熱

柴胡

二兩

半夏

白朮

各半斤

甘草

人參

黃芩

麥門冬

各三分

每服七錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八

分夫滓服

百五四

食積心腹滿痛

治中湯即理中湯加青陳皮各二錢

百五五 百合知母湯

百合病

百合 七枚 知母 一兩

先以水洗百合漬一宿洗去白汁別以二盞煮取一盞
去滓入以水二盞煮知母至一盞去滓相和煎取一盞
半分二服

百五十六 百合地黃湯 百合病

百合 七枚 生地黃汁 一盞

先洗漬百合如前法以水二盞煮取一盞去滓內地黃
汁煮取盞半分二服大便當如漆中粘勿服

百五十七 百合洗方 百合病

百合一升

水一斗漬一宿溫煖洗身洗已

食黃餅勿用鹽鼓即淡熟麵條也

皇八犀角地黄湯

血證大便秘救水不欲嚥

衄後脉微當汗不开內有瘀血

發狂發黃

芍藥二錢

生地黃

一兩半

牡丹皮

二錢半

犀角屑

二錢半如無以升麻代之

分三服每服水一盞半煎至七分去滓服

皇九犀角大青湯

斑瘡出煩疼

大青三分

梔子十枚

犀角犀

二錢半

豉三

分二服每服水一盞半煎至八分去滓服

百全大青四物湯

發赤斑

一名阿膠大青湯

大青一兩

阿膠

甘草

各三錢半

豉

二合

分三服每服水一盞半煎至一盞去滓入膠候烱溫服

百六 青黛一物湯 發赤斑

青黛如棗大水研服

青木香一物湯

右以青木香一物濃煮汁服

五物木香湯

青木香 一兩

丁香

薰陸香

白礬

各二兩

麝香 一分

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫

服熱盛者加犀角屑一兩輕者去白礬大効

白三黑奴丸

陽明

發斑煩躁大渴倍常

黃芩

釜底煤

芒硝

竈突墨

梁上塵

小麥奴

麻黃

各一兩

大黃

一兩

為細末煉密丸如彈大新汲水化服飲水盡足當

發寒已

乃差若一時頃不汗再服一丸須見微利若不大渴不

可與

黑膏

溫毒

炎斑嘔逆

生地黄

二兩六錢

好鼓

一兩陸錢

以猪膏十兩合露之煎令三分減一絞去滓雄黃麝香

如豆大內中攪和三服毒從皮中出則愈忌蕪荑

李根湯

半夏

半兩

芍藥

一分

生薑 半兩

茯苓 一分

桂枝 一分

芍藥 一分

黃芩

甘草 各一分

甘李根白皮 一合

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

百六十四紫雪

發斑

脚氣暑中三陽所患必熱煩躁者

升麻 六錢

黃金 十兩

寒水石

石膏

各四兩八錢

犀角

羚羊角 各一兩

玄參

一兩六錢

沉香

木香

丁香 各半兩

甘草 八錢

右以水五升煮黃金至三升去金入諸藥再煎至一升

慮去滓投朴硝三兩三錢微火煎以柳木篋子撓勿停

手候欲凝入盆中更下研朱砂麝香各三錢急撓冷勻

候冷凝成雪也每服一錢七細細嚥之

芒硝猪膽塗瘡法

右以芒硝猪膽相和塗之即痂落無瘢仍臥黃土末上
良此病小便澀有血者中壞也瘡皆黑壓不出膿者死
不療

百六五 吳茱萸湯

吐利手足厥冷煩燥欲死

嘔而胸滿

吳茱萸

生姜

各半兩

人參

一分

水二盞棗一枚煎至八分去滓服

百六六 旋覆代赭湯

汗吐下後心下痞

旋覆花

一兩

人參

六錢

代赭石

五錢

二錢

甘草

一兩