

周庚
殿酉學
鼓書

經筋第十三

足太陽之筋起于足小指上結于踝邪上結于膝其下循足外側結于踵上循跟結于膕其別者結于腨外上膕中內廉與膕中并上結于臀上挾脊上項其支者別入結于舌本其直者結于枕骨上頭下顏結于鼻其支者爲目上綱綱或作絅誤此謂目上胞內開闔之筋也下結于頤頤音求卽額也其支者從腋後外廉結于肩髃其支者入腋下上出缺盆上結于完骨其支者出缺盆邪上出于頤其病小指支稜擗挂便也跟腫痛膕攀脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔鍼

劫刺以知爲數。以痛爲輸。名曰仲春痹也。足少陽之筋。起于小指次指上。結外踝上。循脛外廉。結于膝外廉。其支者。別起外輔骨上。走髀。前者結于伏兔之上。後者結于尻。其直者。上乘眇季脅。季脅二字。乃眇之此上走腋前廉。繫于膺乳。結于缺盆。直者上出腋貫缺盆。出太陽之前。循耳後。上額角。交顰。上下走頷。
篇中開上結于頷。支者。結于目。皆爲外維。其病。小指次指支轉筋。膝不可屈伸。膕筋急。前引髀。後引尻。卽上乘眇季脅。痛上引缺盆。膺乳頸維筋急。從左之右。右目不

領字皆與常說不同。乃指眉後陷中。謂之振犗也。一作頷。

篇中開

開上過右角竝蹻脈而行左絡于右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟春痹也足陽明之筋起于中三指結于跗上邪外上加于輔骨上結于膝外廉直上結于髀樞上循脅屬脊其直者上循骻結于缺此缺謂缺其推之當在伏兔之下文也馬注作缺外輔骨合少陽其直者上循伏兔上結于髀聚于陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合于頰下結于鼻上合于太陽太陽爲目上綱陽明爲目下綱其支者從頰結于耳前其病足中指支脛轉筋腳跳堅伏兔轉筋髀前腫

獨詳治法

癩。痼。腹筋急引缺盆及頰。卒口僻。急者目不合。熱則筋縱。目不開。頰筋有寒。則急引。頰移口有熱。則筋弛縱緩。不勝收。故僻。治之以馬膏膏其急者。以白酒和桂以塗其緩者。以桑鉤鉤之。卽以生柔灰置之坎中。高下以坐。等以膏熨急頰。且飲美酒。啖美炙肉。不飲酒者。自強也。爲之三拊而已。治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。名曰季春癩也。足太陰之筋。起于大指之端。內側上結于內踝。其直者絡于膝內輔骨。上循陰股。結于髀。聚于陰器。上腹。結于臍。循腹裏。結于肋。散于胷中。其內者著于脊。其病足大指支。內踝痛轉。

筋痛。膝內輔骨痛。陰股引髀而痛。陰器紐痛。上引臍兩脅痛。引膺中。脊內痛。治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。命曰孟秋痹也。足少陰之筋。起于小指之下。竝足太陰之筋邪。走內踝之下。結于踵。與太陽之筋合。而上結于內輔之下。竝太陰之筋。而上循陰股。結于陰器。循脊內。挾脅。上至項。結于枕骨。與足太陽之筋合。其病足下轉筋。及所過而結者。皆痛及轉筋病。在此者。主癘癧。及瘻在外者。不能俛。在內者。不能仰。故陽病者。腰反折。不能俛。陰病者。不能仰。治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。在內者。熨引飲藥。此筋折。

紐。紐。發數甚者死不治。名曰仲秋癥也。足厥陰之筋。起于大指之上。上結于內踝之前。上循胫上結內輔之下。上循陰股結于陰器絡諸筋。筋陰主筋爲諸筋之所繫屬也其病足大指支內踝之前痛。內輔痛。陰股痛。轉筋陰器不用傷於內則不起。傷於寒則陰縮入。傷於熱則縱挺不收。治在行水清陰氣。其病轉筋者治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。命曰季秋癥也。手太陽之筋起于小指之上。結于腕上循臂內廉結于肘內銳骨之後。彈之應小指之上入結于腋下。其支者後走腋後廉上繞肩胛循頸出足太陽之前結于耳後完骨。

○分○釋○不○用○事○例

○分○教○治○法

其支者入耳中直者出耳上下結于領上屬目外眞
其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下
痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引領目
瞑良久乃得視篇中獨是氣化之病頸筋急則爲筋瘻頸腫
寒熱在頸者似當作寒熱在頸者則爲筋瘻頸腫治在燔鍼劫刺以知
爲數以痛爲輸其爲腫者復而銳之本支者上曲牙
循耳前屬目外皆上領結于角其病當所過者支轉
筋治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸此四十一字與手少陽之
之筋起于小指次指之端結于腕上循臂結于肘上
筋文重複且支者上本字即舌本之本字錯衍之迹顯然名曰仲夏痹也手少陽之

繞膾外廉。上肩走頸。合手太陽。其支者。當曲頰入繫舌本。其支者。上曲牙循耳前屬目外眞。上乘領結于角。其病當所過者卽支轉筋舌卷。治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。名曰季夏痹也。手陽明之筋起于大指次指之端。結于腕上。循臂上結于肘外。上膾結于髑。其支者。繞肩胛挾脊直者。從肩髑上頸。其支者。上頰結于頰直者。上出手少陽之前。上左角絡頭下右。視其病當所過者。支痛及轉筋。肩不舉。頸不可左右視。治在燔鍼劫刺。以知爲數。以痛爲輸。名曰孟夏痹也。手太陰之筋起于大指之上。循指上行。結于魚

後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺益結肩前髃上結缺益下結胷裏散貫責合責下甲乙經作脅下當是責鬲也其下無可合也抑或言合於責下之脅處也抵季脅其病當所過者支轉筋痛甚成息責脅急吐血治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲冬痺也手心主之筋起于中指與太陰之筋並行結于肘內廉上臂陰結腋下下散前後前後脅前後也故下云挾脅下文前及胸痛前似當訓膺挾脅其支者入腋散胷中結于臂臂字可疑詳見下條足太陰條有結於臍循腹裏結于臂散于胸中之說也其病當所過者支轉筋前及胷痛息責治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟冬

痺也。手少陰之筋起于小指之內側結于銳骨上結
肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結于胷中循臂胸之
臂字必誤也下繫于臍其病內急心承伏梁此挾乳
中之下爲肘綱其病當所過者支轉筋筋痛治在燔
鍼劫刺以知爲數以痛爲輸下爲肘綱句是遙承上
其證治也下文又遙承伏梁說敘事組織斷續有趣
○又按循臂下爲肘綱是一串事疑本條有脫文錯
○每多如此

簡其成伏梁唾血膿者死不治經筋之病寒則反折
筋急熱則筋弛縱不收陰瘻不用陽急則反折陰急
則俛不伸猝刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔
鍼名曰季冬痺也足之陽明手之太陽筋急則口目

又補敘

一經亦

有口目

辟急謂

復○不○置○者○是○筋○病○莫○重○於○此○也○

爲僻皆急不能卒視治皆如右方也。

十二排直起直落不提不束此種文格內經獨多其摩繪曲折之妙與經脈同而彼以雄闊勝此以堅樸勝。筋病起於寒熱成於燥溼其見證則拘急緩縱支轉痠痛俛仰屈伸而以癟瘡偏廢口僻皆急爲重也篇中多有錯脫處宜細攷之

卷之三

骨度第十四

黃帝問于伯高曰。脈度言經脈之長短。何以立之。伯
高曰。先度其骨節之大小廣狹。長短而脈度定矣。黃
帝曰。願聞眾人之度。人長七尺五寸者。其骨節之大
小長短各幾何。伯高曰。○敍頭身之開大是橫說。頭之大骨圍一尺六寸。胷圍
四尺五寸。腰圍四尺二寸。髮所覆者。顱至項尺二寸。
髮以下至頤長一尺。君子終折。甲乙經作參折。蓋君子髮際常高於眾人。則髮所覆者不及尺二寸。故須參互而折數之。結喉以下至缺盆。中長四寸。缺盆以下至鶻骱長九寸。過則肺大不滿。則肺小。鶻骱以下至天樞長八寸。過則胃大不及。○帶。○藏。○府。○便。
○曲。○折。○有。○致。

則胃小。天樞以下至橫骨長六寸半。過則迴腸廣長。
不滿則狹短。橫骨長六寸半。橫骨上廉以下以至內
輔之上廉長一尺八寸。內輔之上廉以下至下廉長
三寸半。內輔下廉下至內踝長一尺三寸。內踝以下
至地長三寸。膝膕以下至跗屬長一尺六寸。跗屬以
下至地長三寸。○束○筆○以上○敘○身○前○之○直○長○也故骨圍大則太過。小則不及。角以下至柱骨長一尺。
行腋中不見者長四寸。腋以下至季脅長一尺二寸。
季脅以下至髀樞長六寸。髀樞以下至膝中長一尺九寸。
膝以下至外踝長一尺六寸。外踝以下至京骨長三寸。
○以○上○敏○身○側○之○直○長○也京骨以下至地長一寸耳。後

當完骨者。廣九寸。耳前當耳門者。廣一尺三寸。兩顴之間。相去七寸。兩乳之間。廣九寸半。兩髀之間。廣六寸半。足長一尺二寸。廣四寸半。肩至肘長一尺七寸。肘至腕長一尺二寸半。腕至中指本節長四寸。本節至其末長四寸半。項髮以下至背骨長二寸半。督骨以下至尾骶。二十一節。長三尺。上節長一寸四分分之一。奇分在下。故上七節。至于督骨九寸八分分之七。以文義推之上句當是一寸四分又十分分之七也。經文詞不吻合。數此眾人骨之度也。所以立經脈之長短也。此眾人骨之度也。所以立經脈之長短也。是故視其經脈之在于身也。其見浮而堅。其見明而

大者多血細而沈者多氣也。

以理推之當是其見浮而堅者多氣明而大者

多血細而沈者少氣也第原文義亦可通未敢擅改

本論脈度也却通篇只說骨度而脈度僅於首尾見之結末數語忽然離開與前文似斷似續使堆梁盡化煙雲○篇中句句皆實事却句句皆虛境讀時須胸中牢記目中注視是爲脈度立根便覺字字皆立於空中