

沈氏尊生書卷五

傷寒論綱目

太陽經

症

沈金鰲輯

綱

仲景曰太陽病。發汗太多。因致痙。脉沉而細。身熱足寒。頭項強急。惡寒。時頭熱。面赤。目脈赤。獨頭面搖。卒口噤。背反張者。痙病也。

目徐彬曰。痙病。概爲風寒濕所中。然原其因。多由亡血筋無所榮。邪得以襲之。故仲景原痙病之由。而曰太陽病果寒多。本宜發汗。太多則血傷。不能榮筋而成痙也。

古人以強直爲痙。外症與傷寒相類。但其脉沉遲弦細。而項背反張。强硬如發癟爲異耳。仲景既以無汗有汗。分辨剛柔。此則以脉沉細爲辨。謂太陽病發熱。是表中風矣。復加以濕。纏綿經中。內挾寒氣。今筋脉

抽急而項背強直。脈反沉細。沉細者寒濕用事邪。欲侵陰之象也。于是項背強直。故名痙。痙脉本伏。弦細則元氣憊。卽難治。中風症多角弓反張類痙者。但中風強直其先必無太陽形症。脈亦必浮大而非沉細弦遲。故內經曰。諸暴強直皆屬於風。但陽主動。陰主靜。是當以強直而安靜主濕。強直而搐搦主風。此治中風辨法也。千金謂濕病熱入腎中亦爲痙。小兒癇症熱盛亦爲痙。亦中風類也。前人云。傷寒。痙症有五。皆屬太陽。若頭低視下。手足牽引。肘膝相挾。陽明痙也。若一目或左或右。并一手一足搐搦者。少陽痙也。太陽固屬風寒。陽明少陽亦風火熱之內作中風類也。皆當兼養陰清熱爲治。若此所論痙雖外感風寒濕不同然由亡陽筋燥則一矣。如無汗反惡寒爲剛痙。有汗不惡寒爲柔痙。此辨症之法。非痙家本症也。此乃舉痙症之。

最備者以詳病時之形狀。且言治之不得過汗。而脉有常體也。
身熱太陽表邪本盛。乃因血液衰少。寒邪復挾濕搏結。衛中陽
氣不下。而寒濕隨太陽經下項。稍侵陽明。而頸項強急。真陽不
達於表而惡寒。於是太陽經無非寒熱。而格熱于上。爲頭熱面
赤目赤。獨頭動搖。太陽主開。寒濕搏之。開閤不利。不能發聲而
卒口噤。液衰邪盛。筋失所養。失養而背反張。此痙病本然之形
症也。

綱仲景曰。太陽病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛痙。太陽病。汗出。不
惡寒者。名曰柔痙。

目李梴曰。太陽病純傷風。純傷寒。則不發痙。惟先傷風。而又感
寒。先傷風。而又感濕。過汗。俱能發痙。重發太陽汗大。發濕家汗。
皆能發痙。外症寒熱類傷寒。但脉沉遲弦細。搖頭露眼。口噤手

足搐搦。項強。背反張。如發癟。終日不醒爲異。風性勁。爲剛痙。因重感寒或冷。故無汗。宜葛根湯加羌獨活防風。濕性緩。爲柔痙。因先傷風。故有汗。宜桂枝湯加花粉葛根。其或痰塞氣盛。則茯苓星夏以消痰。枳實陳皮紫蘇以順氣。痰消氣盛。然後分剛柔治之。通用小續命湯。有熱去附子。自汗去麻黃。剛痙二三日。仰面壯熱。胸滿如結胸狀。便閉。脚踰卧不着席者。大承氣湯下之。輕者敗毒散。小柴胡湯。柔痙二三日。不瘥。汗多厥冷。筋脉拘急者。附子防風湯。時發時止。危者附术散。又有剛柔不分之痙身。熟詰語似剛。微厥便滑似柔。宜小續命湯加生附子。有汗下後。乍靜乍躁。偏左眼左手足牽搦者。少陽痙也。小柴胡加防風。又虛血之人。及產後傷風過汗。破傷風症發痙。俱不可純作風治。四物湯加防風。或八物湯去茯苓。加羌防黃芪救之。凡痙脉如。

雨濺出指外者立死。又戴眼反折瘻癰汗出如珠。或反張離席一掌許。小兒離席二指許者無不死。

徐彬曰此二條卽辨寒傷營風傷衛法也。取以爲痙病剛柔之別。蓋痙卽痙強直之謂也。痙病必有背項強直等的症。但治痙病剛柔之辨最爲吃緊。故特首拈無汗反惡寒爲剛。有汗不惡寒爲柔。以示辨症之要領。謂發熱無汗惡寒本傷寒家症。若痙而項強背直者見之。乃衛陽與腎中真陽氣本相通。今太陽經寒濕相搏而氣侵少陰。真陽不達故反惡寒也。寒性勁切故曰剛。有汗不惡寒本傷風而併陽明症。若痙而項強背直者見之。是太陽陽明傷濕而兼風非寒邪內侵之比也。風性溫和故曰柔。非止項強而身體則軟爲柔痙也。瓜蔞桂枝湯乃治柔痙主方也。

李中梓曰此太陽中風重感寒濕而致也。仰面開目爲陽。合面閉目爲陰。燥渴爲陽。口中和爲陰。脈浮緊數爲陽。沉細澀爲陰。陽痙易治。陰痙難治。通用小續命湯。陽痙去附子。陰痙去麻黃。柯琴曰此以表氣虛實分剛柔。原其本而名之也。亦可以知其人初病之輕重。稟氣之強弱而施治矣。金匱用葛根湯則謬。

綱仲景曰瘡家身雖疼。不可發汗。汗出則痙。

目徐彬曰瘡家血本虛燥。以疼痛爲風而發其汗。則液亡。筋燥而不能和調。乃亦爲痙。雖汗下後。或有邪乘。然總以陰虛液脫爲主。故特詳其致痙之因如此。

鰲按瘡家病與風寒不同。風寒外症必頭項痛。身腰痛。骨節痛。非痛偏一處。風寒內症必嘔逆。或乾嘔。不得飲食。故發熱惡寒。雖亦相同。而辨其內外症。則可知彼此之異。不得誤認。

癰膿爲風寒而錯治矣。此仲景借瘡家以明治傷寒之法。
當發汗非論。傷寒而雜及瘡家也。其言當明。

綱仲景曰。太陽病無汗而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作
剛痙。葛根湯主之。

目徐彬曰。剛痙之背項強直。而無汗發熱。又反惡寒。原屬寒濕。
居中陰陽兩傷之象。有如發熱而太陽病矣。無汗乃寒傷營本。
症也。此時邪尚在表。不在裡。而小便反少。氣上衝胸。明是太陽。
隨經之邪。自腑侵臟。動其冲氣。且口噤不語。是太陽主開而反
閤。聲不得發。則陰陽兩傷勢必強直惡寒。所不待言。故曰欲作。
藥用桂枝全方加葛根麻黃。風寒兼治也。然足陽明脉起于鼻
交頰中。旁納太陽之脉。故自太陽而侵及陽明。勢將頭項強不
已。而漸胸滿。特以葛根主之。以杜兼并之勢。爲無汗剛痙主方。

且桂枝原能治冲氣也。

李中梓曰。陰瘡厥逆。筋脉拘急。汗多。宜桂心白术散。閉目合眼。
附子防風散。胸滿口噤。卧不着席。咬牙攣急。大承氣湯。頭項強。
小腹滿。小便小利。五苓散。風盛血燥。防風當歸湯。

癥癓不仁

沈金齋輯

綱仲景曰太陽病。脈陰陽俱浮。自汗。身重。多眠。鼻鼾。語言難出。不可下。不可火。若被火者。微則發黃。劇則驚癇。癆癓。

目吳綬曰夫癆癓者。一伸一縮。手足相引。搐搦不已。大抵與嬰兒發搐相似。古人以此症多屬於風。風主動搖也。駱龍吉言心

主脉。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火相扇。則爲癆癓也。若不因汗下所生者。當平肝木。降心火。佐以和血脉之劑。

如羌防柴芍芎歸芩連生地天麻之類。若兼有痰。必加竹瀝星夏。如風邪內煽。加全蝎姜蚕。若傷寒。曾經汗下後。多所傳變。而得爲病勢已過。多難治也。蓋因虛極生風所致。須用小續命湯。或大建中湯加減。一二味主之。凡傷寒汗出露風。則汗不通流。遂變筋脉攣急。手足搐搦。宜牛蒡根。如本條由風溫被火。宜歲

蕤湯若瘻癰戴眼反折絕汗乃出大如貫珠着身不流者此太陽終也。不可治。又有四肢繁習動而不止似瘻癰而無力抽搐者此爲肝絕蓋汗下後變生此症者多死。凡用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩要在通變而已。

綱仲景曰風濕爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘻癰。

目成無己曰瘻者筋脈急也癰者筋脈緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘻癰俗謂之搐搦是也。內經以瘻爲契合之契癰爲放縱之縱以急爲瘻以緩爲癰理至明矣瘻癰者風疾也而癲癇則瘻癰焉傷寒瘻癰者邪寒氣極也熱盛則風搏併經絡風主動故四肢瘻癰而不寧也。風濕

被火而瘍癰。言熱氣之劇盛也。傷寒至于發瘍癰。病勢已過矣。
內經曰。太陽終者。戴眼反折瘍癰。絕汗乃出。大如貫珠。著身不
流。是見其瘍癰爲已過之疾也。瘍癰之症雖劇。若能以祛風
滌熱之劑。折其大勢。則亦有生者。若妄灼灸。或與發表之藥必
死。經曰。一逆尚引日。再逆促命期。

鰲按此乃風熱甚之病。宜祛風散熱爲主。然或有一二可生
耳。非謂其必生也。

不仁

綱仲景曰。脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍
靜乍亂。此爲命絕也。

目張雲岐曰。不仁謂不柔和。痛痒不知。任其屈伸。炙刺亦不知。
是謂不仁也。由邪氣壅盛。正氣爲邪氣所閉。伏鬱而不發。血氣

虛少不能通行故也。內經曰：榮氣虛則不仁。針經曰：衛氣不行則爲不仁。經曰：營衛不能相將。三焦無所仰。身體痺不仁卽此知。營衛血氣虛少不能通行爲不仁明矣。又謂諸乘寒者則爲厥。鬱冒不仁言此厥者是正氣爲寒氣所乘而爲厥氣非四肢逆冷之厥也。何也？鬱冒爲昏冒不仁爲不知痛痒。是爲尸厥。經曰：少陰脉不至。腎氣微少精血奔氣促逼上入胸膈。宗氣反聚血結心下。陽氣退下。熱歸陰股與陰相動令身不仁。此爲尸厥其乘寒之厥。鬱冒不仁者卽此可知矣。昔越人入虢診太子爲尸厥以鬱冒不仁爲可治刺之而得痊寔神醫也。若如本條命絕雖越人其能救之耶。

陶華曰：瘻則急而縮。癰則緩而伸。熱則生風。風主乎動。故筋脉相引而伸縮傷寒至此死症也能去風滌熱治之幸有生者治

法與癰病畧同。不仁謂不柔和。諸虛乘寒爲鬱冒。不仁。血氣虛弱。不能周流一身。于是正氣爲邪氣所伏。故肢體頑麻。不仁。厥如死屍。用麻桂合半湯。不愈。補中益氣湯入姜汁。

李中梓曰。瘓癰者。或縮或伸。動而不定。汗出時蓋覆不周。腰背手足搐搦。牛蒡根湯。脉浮數有風熱。防風通聖散。血不養筋。大秦艽湯。



南京中医药大学
南京中医药大学图书馆版权所有

發黃

沈金鰲輯

綱仲景曰。病發于陽。而反下之。熱入。因作結胸。但頭汗出。餘處無汗。至頸而還。小便不利。身必發黃也。傷寒瘀熱在裡。身必發黃。麻黃連翹赤小豆湯主之。

目朱肱曰。頭汗出而身發黃者。茵陳蒿湯十分。五苓散五分。拌和。每服一錢水下。日三服。

張雲岐曰。寒氣侵人。人卽發熱以拒之。是爲發陽。助陽散寒。一汗而寒熱解矣。不汗而反下。故熱內陷。而成結胸炎上。而但頭有汗。且小便不利。致濕熱內蒸。黃色外見也。解表清火利水。麻黃連翹小豆湯一劑而三善備。且以見太陽發熱之治。與陽明廻別也。

綱仲景曰。太陽病。身黃。脈沉結。少腹硬。小便不利者。爲無血也。小

便自利。其人如狂者。血結症也。抵當湯主之。

目朱震亨曰寒熱在裡不散。熱畜于脾胃。腠理不開。瘀熱與宿穀相薄。鬱蒸不消化。故發黃。發黃與瘀血外症及脈俱相似。但小便不利爲發黃。小便自利爲瘀血。要之發黃之人。心脾蘊積。發熱引飲。脉必浮滑而緊數。若瘀血症卽如狂。大便必鞭。此異耳。

婁全善曰此畜血在下焦而發黃者也。

柯琴曰太陽病發黃與狂有氣血之分。小便不利而發黃者。病在氣分。麻黃連喬赤小豆症也。小便自利而如狂。病在血分。抵當湯症也。

續仲景曰太陽病中風以火劫發汗。邪風被火熱。血氣流溢。失其常度。兩陽相熏灼身體。則枯燥。但頭汗出。齊頸而還。其身發黃。

目朱肱曰病人服湯得小便利如皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不利小便非其治也麻黃連喬赤小豆湯梔子柏皮湯可選用之

陶華曰內經云濕熱相交民多病癰發黃是也謂單陽而無陰也太陰脾土爲濕熱所蒸色見于外曰發黃濕勝則如熏黃而晦熱勝則如橘黃而明傷寒至于發黃熱勢已極且如畜血大抵相類設或寸口無脉鼻出冷氣與夫形如烟熏搖頭直視環口黧黑舉體發黃是皆真臟氣絕也

仲景曰太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊惓陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘