



此  
藥物學講義卷一

太倉景芳芳編述

編者的卷頭語

藥物學者所以研究藥物之性質及其形態為何而製為何  
使用以備處方之需誠為醫學者之基礎學也蓋醫之用  
藥猶將之用兵將其兵其以攻擊醫其藥其以治病將不善  
用兵則是之以喪師辱國醫不善用藥則是可殺人為麻必也將  
知孫吳師不妄出醫若虜扁藥剗功應所以然者其非知考  
回顧吾國二三十年來之事件其適合于實用者有幾大抵前人  
之思想太拘泥而守舊且往往過神其說于是無而不實使

药学

一 中國醫學院

初學者苦步所從入門之徑故吾道日趨沉默方今中西醫戰  
之世若徒守舊章仍故步自封或互相詆謗不鑒古學而蔑  
昭光大之恐為天演淘汰矣幸吾力求簡明採取前賢之合乎  
理論者使一覽瞭然絕其疑義惟深愧學淺薄陋不克登  
峯造極還希諸同學共勉之



北京中医药大学图书馆版权所有  
1951

第一類

清熱降火药

知母

又名連母

地

生河南山谷間今瀕河亦有之

形

莖高尺餘叶細而長叢生根形狀類參年青

根多皱纹有鬚外部為黃褐色內部呈茶褐色

生葉青花形蕊藍花八月結實根可入藥

苦寒微帶辛甘

味

肥者良鹽水炒用

性

選

主

治

足益氣

誠為可入胃

功

用  
量

清肺涼肝泻火  
錢半至三錢

處

方

配石膏葛根山豆根甘草艮花竹叶治汗出壮热  
口渴心煩之陽明經病。配芩苓白朮甘草川朴  
桑葉胡枝柳治一切瘧疾。配芩柏芩蓮山梔生地  
淮山澤瀉丹皮治陰虛火盛配桑葉菊花山梔  
龍胆牡丹皮澤瀉葛荷芩芩治肝火赤眼配葛  
甲、秦艽骨皮紫苑歸身紫胡青蒿治陰虛骨  
蒸配玉竹麥門冬玄參西洋參治肺燥乾渴。

禁

忌

陽氣虧者勿用

據張石顧曰知母況降入足少陰氣分及陽明乎

降炒升提。易知退散。草炒  
入胃能呈。猪膏注肺而止嗽。  
用蜜使降。苏性而下降。本寒。

去燥性而和平。氣叶炒潤相生。  
与蜜能甘緩。益元土。炒藉土氣。  
以補中。甘即水浸。味毒和平。  
取陳者。劣性微。厥宣鮮者。  
竟不味苦而功效速也。

足太陰能清。相火有餘理。消渴煩熱。仲景白虎湯。菝葜。杏仁。湯皆用之。下則固腎。燔而滋陰。上則清肺。熱而除煩。但外感表證未除。尼之脾胃虛熱。若誤服。令人作渴。故虛損大忌。近世誤為

游陰上。利勞癆。神丹因而矢枉者多矣。李延言治邪氣肢體浮腫。是指濕熱水氣而言。故

下文云。下水補不足。乃溫熱相火有餘燔灼精氣之候。故用此清熱養陰。邪熱去則正氣復矣。黃坤素曰。知母清金泄熱。止渴除煩傷寒。

## 金代肺

專

即陽氣

火  
土  
脾  
土

肺胃寒熱  
清降藥可用  
熱中消渴用之尤宜

白虎湯金匱酸枣仁湯桂枝芍药知母湯並  
用之以其清金而泄火潤燥而降煩也知母苦寒  
之性专清心肺而除煩躁仲景用之以泄上焦之  
熱也惟其敗脾胃而泄大腸火衰土溫大使不实  
者忌之後世庸工以此通治內傷諸病滋水漶  
火悞人性命至今未絕余攷知母之功用無非  
生津以止渴止則煩除謂其能補水故可退  
熱虛勞骨蒸者固猶謂其傷敗脾胃者亦  
非不知用知母必具之證為口渴心煩也

梔子

出處

用以清熱

色赤入心肝二經  
主寒

形態

處之有之。產野地者皮薄而圓。產于園圃者則大而長。宜染色及吊傷用之。

為植物中之灌木類。木高七八尺。葉為李。厚而深綠。春榮夏茂。凌冬不凋。五月開小花。大約

圓面中有黃蕊。甚芳香。交秋結實。如杏子。生青

熟黃中有仁赤色。

仁 滑腸力勝

性味

苦寒

煑用或用仁或用衣。古法生用。

衣 清上焦熱

選用

(李經)五內邪氣。胃中熱氣。面赤。酒皶鼻。一切



南京中医药大学图书馆版权所有

桑菊饮

桑叶 菊花 连翘  
甘草 桔梗

生地 熟地

用量

錢半至三錢

瘡瘍(別錄)療目赤痛。胸心大小腸大熱。心煩渴。  
(潔古)治心煩燠懶。不得眠。時珍治吐衄。血。  
下血。血淋。損傷瘀血。及傷寒。勞復熱。  
清熱潤火之通劑。

需用根莖

處方

人

錢半至三錢

風溫是病名

配黃蓮。蓮子。清心火。配黃芩。清肺火。配紫胡  
丹皮。清肝火。配防風。石羔。清脾火。配知母。潤腎  
火。配苦桔梗。連翹。散風。治風溫。配魚腥川芎。散鬱

禁

尾

中寒。世勿用。



南京中医药大学图书馆版权所有

瘧症 因風寒而臥

汗吐下為治癒之大法

移仲景梔子加減七方梔子柏皮並梔子大黃

及茵陳蒿湯、大黃硝石湯、治瘧症及酒疸。

外治汗吐下後虛煩，而熱未清，並虛症猶可

分根據李經所云五內邪氣者，五藏之內而

胃為五藏六府之長，居於土，為萬物所歸

邪入於裡，世所復傳，故下文接曰胃中熱氣

此仲景所以取為陽明表裡未解之主藥也

惟所云汗吐下之後，讀書者續當活看，並非三

法並用之後，蓋言或汗後肌表雖解，而裡熱

未除，或吐後痰膈雖清，而虛陽內擾，或下後

裡滯去而表邪未清配豉以解肌表配  
生姜以止呕配甘草以緩中乾姜以分治寒  
熱配枳實以和胃豉可去而梔子不可去  
其功用反加減之精義不從可明瞭耶且梔  
子均療生用張隱菴謂生用能起水陰之  
氣上浮復導火以下行若炒黑則但從上而  
下不能起水陰以上濱故有交濟水火調和  
心腎之功而後人妄言梔子生用則吐炒用則  
不吐且以梔子貳為吐利昧甚其見解誠亦  
壓倒諸家並非仲景所以治虛煩不得眠之

白雲山房  
卷之三  
三十六

理中桂附透麻而其餘玉陳修國徐灵胎則謂以豉引其吐此又誤解公蒂散中用豉之義服後偶或有吐者遂以豉為吐劑也後人諸方之用梔子者黃連附毒三黄石羔防風通聖散涼膈散龍胆泻肝湯苦症治金多異而清熱固火之用則一以考四字足以尽其功用惟古人之于梔子說有歧者謹古則謂經清上行丹溪又謂屈曲下行此則指利小便而言肺為水之上源上源清而下流自潔三焦為水道膀胱為世都之官

氣化能出上行則清其肺下行則潔其流。  
實一川貫之也。至用以治血症古人早已言。  
其流轉血寒則凝反為敗血而丹溪亦云。  
治血不為單行單止亦不為純用寒涼。蓋  
治寒火之血順氣為先氣行則血自歸經治  
寒火之血養正為先氣壯則自然攝血。如仲  
景側柏湯用乾姜艾叶共煮。土湯用附子。溫  
經湯用吳萸桂枝其義深長思也。梔子功  
用殊廣故陳方用之頗多。為梔子豉湯梔  
子生熟豉湯梔子甘升豉湯梔子干姜豉



热厥

四肢厥逆身赤面白直虚烦躁  
不省人事方用桂枝附子汤治效

陽根手足枯寒而根实梔子豉湯梔子柏皮湯梔子大黄豉湯梔子金花湯以上諸方出于金匱傷寒者多僅以一二言觀之則梔子之功用已可見一般矣又有單方曾已試驗奏效并錄于下梔子姜汁炒佐干姜炒黑治熱厥心痛名一笑散又梔子研末鸡子清

散梔湯火傷又梔子研末热酒服治臨產下利又梔子燒灰吹鼻止衄血或用整個黑山梔塞鼻亦可

石决明 (又名千里光 九孔螺)

海中山崖

產地

獨角徑云目存  
肝氣

形態

介類軟體動物長五六寸形如小蚌而扁壳卵圓中央略高背面有吸水孔九排壳外褐色其壳之外面粗慥密生繩狀突起肉有光采可作食器

青盲

目無視而視物脛

性味

鹹平微寒

九孔者佳

(別錄)目障翳痛

病目不晴而起者宜多

選用

主治

善目病多主膽火膚毛精上注於肺但正則無

量

平肝明目

三錢至五七錢

用

近世用

量



南京中医药大学图书馆版权所有

處 方

配薄荷叶。冬桑叶。甘草。甘菊。桔梗。豆衣。治肝風  
頭痛。配川連。青葙子。谷精珠。胆汁。木贼。牡蠣。赤  
芍。黃芩。治肝火目痛。配枸杞子。地黃。赤白芍。治

素火目痛

忌

久服令人寒中。非其性。寒乃消之過。當耳。

按石決明味鹹軟堅入肝腎二經為磨翳消障之良

藥。又治風熱入肝煩擾不寐。遊魂無定。即珍珠

母丸。與龍齒同用。散肝經之積熱也。又能潛陽。

故能建功於肝。肝開竅於目。所以用於明目通淋者。清肝家之溫火也。以肝主疏泄。邪熱去而淋

眼痛  
心所生者必累  
日光  
目也。以瞳膜  
眼目紅赤而不  
禁  
諸方因病時作  
時止

自愈矣舊注或以為紫貝或以為鯪魚甲  
據紫貝即今之研螺殊非此類鯪魚乃一連着  
石一尾無対七孔大者為手掌明耀五色內亦  
含珠其形勢決明相近也決明壳大如手小者  
如三兩指大背側有一行小孔為穿成者生于石  
崖之上海人因水乘其不意即易得之否則繫  
繩難脫也或以為紫貝或以為鯪魚甲皆性惟  
鯪魚甲實是一類二種也又名曰千里光以其明  
目之功而名也九孔螺者以其形態而名即明  
目驗方曰千里光茺蔚花甘草子治羞目怕日