

228792




卷一四九四九	卷一四九四八	卷一四九四七
婦字	婦字	婦字

永樂大典



四六一



永樂大典卷之一萬四千九百四十七 六暮

婦

婦人證治二十三

婦人耳聾癰腫

論

巢元方病源耳聾風冷傷於腎腎氣通於耳勞傷腎氣風冷客之邪與正氣相搏使經氣不通故耳聾也耳聾風腫候耳聾風腫者風邪搏於腎氣故也腎氣通於耳邪搏其經血氣壅滯不得宣發故結腫也耳後附骨癰候附骨癰是風寒搏血脉入深近附於骨也十二經之筋脉有絡耳後完骨者虛則風寒客之寒氣折血血否滯不通深附於骨而成癰也其狀無頭但腫痛

婦人眼赤

論

巢元方病源眼皆赤者風冷客於腎間與血氣相搏而淚液乘之挾熱者則今皆赤類用六藥清思散加減藥證集婦人赤赤眼疾先以導水丸

下訖次以涼膈散加防己草龍膽煎服或四物內加之尤妙
婦人喉痛

論

巢元方病源喉痛者風熱毒客於其間故也十二經脉有循頰喉者五臟
在內而經脉循於外臟氣虛則經絡受邪邪氣搏於臟氣則生熱熱乘其
脉熱搏咽故令喉痛也咽中如炙肉腐候咽中如炙肉腐者此是胃
腸痰結與氣相搏遂上咽喉之間結聚狀如炙肉之腐也

方

張仲景金匱方論半夏厚朴湯方婦人咽中如有炙肉孫思邈千金要方
治胃滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下

半夏一升

厚朴三兩

茯苓四兩

生薑五兩

乾蘇葉二兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服千金方無蘇

葉名半夏湯

洪氏經驗方救急散治急喉閉產前產後有此疾皆可服之

白僵蠶半兩去絲刺星砂甘草生一錢重

右二味各取未秤和勻每服一錢上以生薑汁調藥令稠灌下便急以溫茶清銜下

婦人吐血

論

巢元方病源治婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也口舌出血候口舌出血者心脾傷損故也脾氣通於口心氣通於舌而心主血脈血榮於臟腑通於經絡若勞損臟腑傷動經脈隨其所傷之經虛者血則妄行然口舌出血心脾二臟之經傷也治驗陳自明大全方僕嘗治一人吐血診其脈肝部弦氣口濡此因怒極而得之遂用蘇合香丸和雞蘇丸服即効養生必用方云凡吐血須煎乾薑甘草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服生地黃竹茹藕汁去生使速手嘗治一女人年一十九歲月水不行遂妄行而嘔血諸藥無効察其形容人肥脈不大不小僕投以四生丸即安又嘗治一男子因飽低頭負重吐血諸藥無効亦投四生丸及青餅子即安更不發僕觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃傷

汁然亦不可狎泥此說如陽乘於陰血得熱則流散經水渾溢宜服涼藥以解之大黃犀角生地黃生艾藕汁豈能無効如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰宜服溫藥以暖之乾薑肉桂豈能無功學者更宜思之陳伯華云先公紹興初遊福清靈石寺主僧留飯食將竟侍者赴堂齋罷來侍立見卓子上不穩急磨折板之舉首即嘔血蓋食飽物破肺也明年再到寺因問去年嘔血者無恙否其主僧荅云得四生丸服之遂愈自得此方屢救人有効類用方藥楊仁齋直指方血遇熱則宣洩故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒陰陽不相為守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是兩外證必有虛冷之狀法當溫中使血自歸於經絡可用理中湯如南木香或局方七氣湯方見諸氣類加川芎或甘草乾薑湯其効甚著又有飲食傷胃或胃虛不能傳化其氣逆上亦令吐衄木香理中湯甘草乾薑湯通用出血諸證每以胃藥收功用木香理中湯或參苓白朮散二分枳殼散一分方見諸氣類和米湯乘熱調下或真方四君子湯夫和小烏沉湯米湯調下已上用薑棗畧煎亦得右藥不惟養胃蓋以調氣輩與之並行若夫桂枝枳殼湯方見諸氣類和二陳湯方見諸氣類薑棗同煎入蘇合香丸少許佐之又調氣之上藥也

孫思邈千金要方桂枝湯治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹

熟地黃各二兩 人參

白芍藥

桂心各一兩

右為散每服四錢水一大盞煎七分去滓不以時候

太平聖惠方雞蘇散方治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉一兩

黃耆半兩

羚羊角屑

半兩

阿膠一兩

刺薊一兩

茜根一兩

生乾地黃一兩

麥門冬三分

甘草半兩

黃芩三分

當歸三分

伏龍肝一分

甘草半兩

微炙

右件藥搗麝羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹茹一分煎至六分去滓不計時候服

生地黃煎方治婦人勞熱至甚吐血不止心神煩躁少思飲食

生地黃汁一升

生藕汁三合

青蒿汁三合

生薑二兩

取汁

蜜四兩

酥一兩

柴胡一兩

黃芩一兩

知母一兩

雞蘇葉一兩

黃芩一兩

川升麻一兩

桑根白皮一兩

剉

本草綱目卷之四十四

鹿角膠 二兩 搗碎 炒合 黃糖 杏仁 一兩 湯浸去皮 炙 雙仁 雙沙 酥 黃

右件藥搗細羅為散 與前藥汁同於銀器中攪合勻 慢火煎成膏狀

覽合中 每服不計時候 以清粥飲調下 半匙

生乾地黃散方治婦人心熱壅悶吐血

生乾地黃 一兩半 麥門冬 一兩半 心薤 三合

甘草 半兩 炙微赤剉 白茅根 二兩 剉 藍葉 一兩

右件藥搗篩為散 每服四錢 以水一中盞 入生薑半分 豆豉一百粒

煎至六分 去滓 不計時候 溫服

刺刺散方治婦人頭疼壯熱心中煩悶吐血宜服

刺刺 二兩 雞蘇葉 二兩 赤芍藥 一兩 麥門冬 二兩 去心

赤茯苓 一兩 石膏 三兩 黃芩 一兩 葛根 一兩 剉

甘草 一兩 炙微剉 生乾地黃 二兩

右件藥搗羅為散 每服四錢 以水一中盞 入生薑半分 青竹茹一

分 煎至六分 去滓 不計時候 溫服

麥門冬散方治婦人心中壅毒吐血煩悶

麥門冬 二兩 去心 生乾地黃 二兩 薤葉 一兩半

犀角屑一兩 黃芩一兩 川升麻一兩 白茅根二兩半剉
藍葉一兩 甘草一兩炙微赤剉

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入香豉一百粒。淡竹茹一分。生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

雞蘇散。治婦人虛損。氣逆吐血不止。

雞蘇葉一兩 當歸半兩 赤芍藥半兩 黃芩一兩

伏龍肝二兩 阿膠二兩搗碎。炒令黃燥

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候

溫服。

阿膠散。治婦人吐血。心神煩熱。

阿膠三分搗碎。炒令黃燥 當歸三分 犀角屑三分

雞蘇葉三分 羚羊角屑三分 桂心三分 麥門冬三分去心

生乾地黄二兩 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入淡竹茹一分。生薑半

分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

紫參散。治婦人卒吐血。不定。胃心悶痛。

紫參一兩 鹿角膠一兩 搗研炒金黃燥 青竹茹一兩
羚羊角屑一兩炒金黃燥 生乾地黄二兩

右件藥搗細羅為散。不計時候。以新汲水磨生薑調下二錢。
五神湯治婦人熱毒上衝吐血不止

生藕汁三合 生地黄汁三合 白蜜一合 刺薊汁三合
生薑汁半合

右件藥相和煎三兩沸。放溫。不計時候。取一小盞。調下炒麩麋一錢。
治婦人吐血。百治不差。宜服此方。陳自明大全方云。千金翼卷十。十差。
神驗。不傳方。詳此藥性。治熱毒吐血。有驗。地黄汁用半升。生大黃末一方寸匕。

生地黄汁一大盞 川大黃半兩剉碎。微炒。搗末
右件藥煎地黄汁三兩沸。下大黃末調和令勻。分為三服。

又方

龍骨半兩 當歸三分剉微炒 生乾地黄一兩

右件藥搗細羅為散。不計時候。以生地黄汁調下二錢。
又方

青竹茹一兩 生地黃二兩切 羚羊角屑半兩

右件藥以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分為三服

又方

桂心一兩 阿膠半兩情伴妙分黃燥 生乾地黃半兩

右件藥搗細羅為散每服一錢煎竹茹湯調下不計時候溫服

又方 取伏龍肝細研每服以新汲水調下二錢頻服効

又方 取白茅根新者長五六寸一握剉以水一大盞煎至七分去滓分

溫二服

陳自明大全良方治吐血

桂心末

右水調方寸匕日夜可二十服

桑脾湯治虛勞吐血衄血下白汗出方出養生方

甘草 白芍藥 黃耆各一兩 熟地黃二兩

右為末每服四錢水酒各一椀已上煎至七分去滓取六分清汁溫

服食前

四生丸療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生栝葉

生地黃

右等分剉研凡如雞子大每服一丸水三錢煎至一錢去滓溫服無時

犀角地黃湯治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥三分

生地黃半斤

牡丹皮去木一兩

犀角屑二兩如無并麻川者代

右咬咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩二兩青餅子治咯血

青黛

杏仁各一兩華佗方以杜鵑粉炒杏仁去皮尖杜

鵑不用

右一處同研成膏熔黃蠟和作三十餅子每服一餅子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同粥飲下無時候

乾薑甘草湯治陰乘於陽心肺經寒而嘔血

甘草

乾薑各半兩

右咬咀水煮頓服局方理中湯亦妙方見和劑楊仁齋直指方地黃煎治肺損吐血嗽血

生地黃四兩取汁

鹿角膠一兩搗碎炒黃

石為末拌和。每服三錢。童子小便一盞煖熱。入薑汁少許調下。無鹿

膠則以透明阿膠炒酥代用

人參湯治吐血咯血

新羅人參慢火煎服

又方

人參

川芎

茯苓

半夏製各三分

甘草炒一分

右剉每服三錢薑五片煎服

半夏丸治吐血下血崩中帶下喘急痰喘中滿虛腫亦消宿癥百病通用

圓白半夏剉淨洗補以生薑汁調和飛白麴作軟餅包煑半夏使

大灰赤色黃去麴取半夏為末

右末米糊圓菜豆大日乾每三四十丸溫熱水下

豆蘇湯治上焦有熱咯血痰血煩悶燥渴

黑豆三合

紫蘇葉莖二條烏梅兩箇

右水大碗同煎臨熟入薑汁三大匙食後旋服

薏苡湯治肺癰吐膿血

薏苡仁二合 黑豆百粒

烏梅一箇

右水二盞煎一盞入透明阿膠生蒲黃各二錢再煎沸食後服

蘿蔔飲治諸熱吐血衄血

生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立効如無生蘿蔔只用蘿蔔子一分微炒紫蘇莖葉半分剉散用煎亦効

血餘散治吐血衄血

頭髮燒存性

右研細每服二錢米湯調下衄者更以少許吹入鼻

蒜連丸治諸血妄行

黃連日乾為末獨頭蒜一顆煨熟取肉研細

右入米醋此子搗和為丸梧子大日乾每三四十丸陳米飲下

黑散主諸竅出血並主之

隔年蓮蓬 敗棕箇

頭髮並燒存性子分

右為末每服二錢煎南木香湯調下或只用棕箇燒灰米湯調下亦可
咯血方

天門冬生心 青黛 琥珀 各四錢 生蒲黃 川薑黃 油髮灰 各一錢

右末煉蜜丸梧子大每五十丸入松陽柿中濕紙包煨香候冷桑白皮煎湯臨卧嚼下柿能戀肺咯血屬肺嘔血屬脾

九竅出血方

荆芥酒煎通口脈

又方暴驚風九竅血其脉虛者

靈砂百粒分三次人參煎湯下此藥不可錯認血得熱則宜流妄

同涼藥誤天

治口舌出血槐花日乾為末傳之

劉守真云機氣宜保命集生地黃散諸見血無寒吐血下血吐血溺血皆屬于熱但血家證宜服

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

黃芩

右各等分同剉每服一兩水二盞煎至一盞去粗溫服脉微身冷惡

風每一兩加桂半錢吐血者多有此證
濟生拔粹方雞蘇散治虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉

黃芩各一兩

當歸半兩

赤芍藥半兩

阿膠二兩

伏龍肝二兩

刺薊

主地黃

黃耆各一兩

右為麤末每服四錢薑三片竹茹彈子大水同煎

韓養和理霞聖切方綿煎散治婦人胎前產後吐血血運發虛熱小便不通臍腹痛

藟麥

石膏乳文者

赤石脂各等分

右為細末每服五錢水一中盞綿裏同煎服

阮霖經驗良方治婦人吐血

陳槐花

二兩炒百草霜半兩

右為細末每服茅蔗根煎酒調下亦治血崩

何森衛生至寶茯苓補心湯治婦人吐血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩

右拌和勻每服五錢生薑五片水煎

乾地黃丸。治吐血。下血。妄行。血虛。月候。結。

熟乾地黃

白芍藥

人參

當歸

芎藭

阿膠

犀角

右為細末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前米湯下。

此散。方調脾散。治吐血。上行。經血。行時。反上行。肺經有病。熱沖然。但要順經調肺氣。紅花散。子善能痊。凡婦人吐血。有三。一經不行。反上行。便傷氣也。二傷沖。三肺經受熱。隨上沖。故使吐血。

三稜

義術

麥芽

胡椒

縮砂

川芎

茴香

甘草

青皮

陳皮

通經丸

右為末。米飲調下。

當歸

桂

青皮

大黃

乾薑

川烏

桃仁

義術

乾漆

右十味。每味各同。椒微炒。故地上出汗為末。一半用醋熬成膏。後入。

一半更入雞子清同為丸。陰乾醋湯下三十丸。

婦人臂痛

論

類用方藥。世自問。大。金。要。方。論。曰。夫。婦。人。臂。痛。筋。脉。攣。急。不。得。屈。伸。過。寒。則。劇。由。肝。虛。為。風。寒。邪。氣。流。於。血。脉。客。於。經。絡。搏。於。筋。筋。不。榮。則。乾。急。而。痛。其。脉。緊。細。宜。服。栝。子。仁。丸。舒。經。湯。若。臂。痛。不。能。舉。或。左。或。右。時。復。轉。移。一。臂。由。中。脫。伏。疾。脾。氣。滯。而。不。行。上。與。氣。相。搏。四。肢。皆。屬。於。脾。脾。氣。滯。而。氣。不。下。上。攻。於。臂。故。痛。其。脉。沉。細。宜。服。苓。丸。控。涎。丹。

方

栝子仁丸

栝子仁

乾地黃各二兩

茯苓

枳實去穢炒

覆盆子炒

北五味

附子炮

石斛去根切酒蒸炒

鹿茸酥炙

酸棗仁炒

桂心

沉香

黃耆各一兩。蜜水炙。一方等分。

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。空心酒下。三十丸。

舒經湯治臂痛。又名五痺湯。亦治腰下疾。