

銀杏散 治陰濕瘡瘙癢徹骨不可忍者

雄黃 乾白果粉 朝腦 生礦子灰等分

右為末用乾燒酒調敷

婦人陰瘡 此論其出章強

此種議論

雖引經旨

不言病機

緣婦人陰

多偏多濕

若有抑鬱

則心肝胃

五臟之火動

筋而起發

臨產後

陰瘡運氣皆屬於寒經曰太陽之勝陰中乃瘍隱曲不利治以苦熱 仲景云少陰脉滑而數者陰中生瘡少陰脉長陰中必挺出

夫陰器屬足厥陰肝經任脉之會素問云督脉者其絡循陰器合纂間是屬督脉也至於足太陽外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水內屬

通調水道

下歸膀胱

乃膀胱乘

氣化而出降

器非手太陰

所司也

小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主水則

又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾

氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又屬手

太陰也素問又為前陰者宗筋之所聚太陰陽明

之所合又屬脾與胃也癰瘍生於其間須細心求

而責之不可端主一厥陰經而惟清肝導濕之為事斯無悞矣

陰挺

陰中挺出一條如蛇頭

由足太陰脾虛或產后遇怒或經

風所致初宜清熱疎風次朝服補中益氣湯倍升

麻晚服龍膽瀉肝湯外兼敷洗

陰葦

肥邊脾痛中突起葦丁雞冠

由肝鬱脾虛所致宜補中益氣

湯歸脾湯俱加清皮枝子

陰腫

忽然腫而作痛名蚌疽

由勞傷血分所致宜四物湯加丹

皮澤瀉花粉柴胡或秦艽湯

陰蝕

陰器外生疔瘡内生小虫作痒難忍又名慝

瘡由胃虛積鬱所致宜四物湯加

石菖蒲龍膽草

黃連木

通 若寒熱與虛勞相似者虫入臟也宜逍遙散

吞蘆薈丸早晚各一服外兼薰洗次以銀杏散塞

入陰中殺虫止痒

若寡居患此隱忍不言必待

攻刺疼痛口乾發熱形削食少者失合症也不治

陰脫

開而不閉也痒痛出水由憂思太過所致宜

陰蝕
名陰蝕

逍遙散歸脾湯俱加柴胡枝子白芍丹皮由產後

得者補中益氣湯加五味子白芍醋炒俱用荆芥

枳殼訶子文蛤大劑煎湯薰洗

陰癰子宮脫出也俗名癰葫蘆由氣血虛者用補中益氣湯

去柴胡倍升麻加益母草外以革薢子肉貼頂心

再用枳殼半斤煎湯薰洗由努力負重所致者

灸臍下四寸五分七壯立効由思慾不遂肝氣

鬱結必先小便時堵塞因而努力久之隨努而下

也令穩婆扶正葫蘆令患婦仰臥以枕墊腰吹噓

藥收之收入卽緊閉陰器隨以布帛將兩腿縛之

又陰門腫

癰如患癰

在右陰施

婦人陰癰

其候生于

陰中狀如茄

子行時如

即入肉其

物有孔其

水常出性

內腫痛水

不通

志用硫黃

海蠟肖

五倍子

五倍子 瓦床子 吳茱萸 五倍子 瓦床子 吳茱萸

良角一兩 玄參一斤

乾粉甘 玄參一斤

玄參一斤 大消色 睡時納入

陰內

服法 每服一錢

帽皮子 牡蠣當歸

黃芩 五兩

即小便亦須夾之內服大補升提之藥可以暫愈

若寡居者須令進步除根

如孕婦生處子宮脫出者可同

陰瘡主治方

秦艽湯

治陰戶腫痛小便澀滯甚者便如馬溺二

腿拘攣

秦艽

六錢

石菖蒲

三錢

當歸

三錢

葱頭

五個

水二鍾煎一鍾食前服

外用艾葉

一兩

防風

六錢

大戟

五錢

水煎薰洗

牛膝湯

陰內尿血腫痛名血結症也

牛膝

五兩

黃酒

二斤

煎半飭作三次服

大戟

卷之二

婦人前陰下

函三堂藏板

○ 桃仁散

陰腫作庠

桃仁炒 爲末每服二錢黃酒調服仍搗爛敷之

○ 濕痒湯

洗陰蝕作痒

性燥用皂李

鶴虱一兩

狼毒

苦參

歸尾

鷓鴣菜各五錢

葳靈仙

蛇床子

各五錢

半斤用酒煮干

用河水十碗煎熟加猪膽汁三三個先薰後洗

性多痛鹽言

一加乾漆

又方川椒

一兩

吳茱萸

一兩

蛇床

炒熟用酒煮干

子五錢

藜蘆

五錢

陳茶葉

一撮

食鹽

兩

水煎

薰洗

○ 文蛤湯

洗陰尸腫痛

文蛤

小麥

皮硝

白礬

各兩

葱白

十根

水煎薰洗

銀杏散

陰痒生瘡

陰癢

黃丹枯凡

杏仁

去皮尖

輕粉

水礬

各製

雄黃

等分

扁蓄

蒿草

為末每用一錢棗肉二個和丸絲綿包裹線扎

硫磺

蛇連

石手擦

之九不干

留頭在外先用前湯痒湯洗畢次入戶內如小

海加

藥手擦

便取出便訖再入一日一換四五個自愈一

加枯礬

減半

用猪肝

一片

或雞腿一隻煮滾取

出搽藥于上插入戶內冷則易之

三灰散

陰疳

外科大成

卷之二

婦人前陰下

函三堂藏板

惡瘡 生手陰戶瘡痛 尋常臭穢不已

鹿角灰 一錢 雞內金灰 一錢 紅戎灰 七分

徑索 芭蕉葉 五片 出田調搗 出用忍冬 詳慈母 養身少宜

黃連 一錢 兒茶 七分 珍珠 五分 輕粉 五分

冰片 五分 麝香 三分 共為末 一抺即愈 一用硫黃 一錢 輕粉 五分

藥味 刻方 冰片 三分 麝香 二分 為末 預用黃連 二兩 水二

碗煎 一碗去渣再煎至一酒鍾調前藥 搗陰內

陰蝕薰方

雄黃 一錢 硫黃 五分 桃仁 五個 本蠶子肉 一個

艾葉 五錢 一加礞硃 一錢 紙捲作條安灰盆

內點着入馬桶內患者坐于上燻之其虫立死

陰瘡應用方

補中益氣湯 見首卷

龍膽瀉肝湯

蘆薈丸 俱見疳瘡門

歸脾湯

逍遙散 俱見癰瘰門

囊癰

夫囊癰者 陰囊紅熱腫痛也

由肝腎陰虛濕熱下注所致治

以補陰為主清熱滲濕之藥佐之

如初起腫痛

小便澀滯者清肝滲濕湯或送六味地黃丸因寒

中未經發散者用紺珠丹汗之次用滋陰清濕等

藥燉腫便閉者服神授衛生散已成者托裏消毒

產後陰

翻胃

身重

蓋後

以再入

宜洗即

散去枯梗加澤瀉川山甲外用如意金黃散葱湯和蜜調敷堅硬無膿紫色作爛欲外腐也蟬酥錠爲未摻之膏蓋服滋陰藥俟腐脫搽紅黑二膏

如餘腫俱消惟一處不消欲作膿也托裏消毒散倍用皂角刺透之膿熱作脹針之以免過潰其囊法以油頭繩扎住腎子開海底穴膿出自盡服十全大補湯加牛膝丹皮膿出而仍腫痛者熱未解也托裏消毒散加膽草枝子柴胡餘腫俱退只一條不消者肝虛也六味地黃丸去茯苓加五味子兼補中益氣湯加茯苓口乾便數者腎虛也六味

地黃丸因膀胱酒毒所乘者六味地黃丸料加車
前子牛膝內熱瞋熱肝虛也四物湯加參朮體倦
食少者脾虛也補中益氣湯膿水清稀者氣血虛
也十全大補湯久而不斂者大補湯加麥冬五味
子外兼豆豉餅灸之罌丸懸露者杉木灰托之紫
蘇葉包之或瑩珠膏代之內外得法旬日可瘥若
攻其毒則陰道愈虛投淡滲之藥則真陰愈損雖
少壯者多成痼疾況虛弱者乎更誤作疝治投以
熱藥必難收斂以至膿清脉大者不治

囊癰與疝氣相類但癰則陰囊紅腫熱痛內熱口乾

小便赤澁若疝則小腹痛牽引腎子少熱多寒好
飲熱湯爲異耳 若水疝雖腫而光雖痛有時不
紅不熱按之軟而卽起爲異耳宜以針引去水氣
則安內服本門之藥不作

忽然囊紅發熱陰子一大一小狀若傷寒其發迅速
者卵子瘟也宜灸肩尖穴七壯或九壯卽愈患左
灸右患右灸左取穴法立棍一條伸手扶棍以手
與肩平爲則則肩上有窩窩卽穴也

囊內羣丸上忽然突出一點堅硬如筋頭疼痛異常
身發寒熱者暗疔也 治見疔門

因患痔漏久而串及於囊者腎囊漏也治見漏門

囊癰主治方

清肝滲濕湯 治囊癰發熱腫痛小水不利者

川芎

當歸

白芍

生地

柴胡

膽草炒

枝子

花粉

黃芩

各一錢

澤瀉

木通

甘草

各五分

用水二鍾煎一鍾食前服

囊癰應用方

六味地黃丸

紺珠丹

神授衛生散

托裏消毒散

如意金黃散

十全大補湯

補中益氣湯

瑩珠膏

俱見首卷

蟬酥條

即蟬酥丸見疔門

腎囊風

腎囊風者陰囊作痒甚則疙瘡頑麻破流脂水由肝經風濕所致宜龍膽瀉肝湯柴胡勝濕湯蒜豉丸服之蛇床子湯薰洗之

龍膽瀉肝湯

治囊風濕痒及陰腫淋瀝等症

膽草

用柴胡拌炒

黃連

用吳茱萸拌炒

餘如常法

見疔門

蒜豉丸

治陰汗濕痒

淡豆豉爲末煨大蒜搗和爲丸桐子大硃砂爲衣
每服三十九空心用紅棗燈心湯送下

蛇床子湯 囊風疙瘡作痒搔之作痛

蛇床子

葦靈仙

歸尾

苦參

各五錢

水煎薰洗一加白礬

一用茄科煎洗

一用

溫醋洗

一用姜湯洗

狼毒膏

治癰症并一切痒瘡

狼毒

檳榔

硫黃

文蛤

川椒

枯礬

蛇床子

大楓子

各三錢

爲末用香油一大盞煎滾入皮硝三錢再煎滾

下公猪膽汁一個和勻調前藥擦患處

腎臟風瘡

腎臟風瘡卽腎囊風也以其久之則有耳鳴目痒鼻赤齒浮手又白色等症及上攻下注遍體生瘡宜

三因四生散

戴院使云前症因精氣不調襲風

所致

白附子

白蒺藜

炒去刺

黃芪

蜜炙

羌活

等分

爲末每服二錢鹽酒送下或用猪腰子剖開摻

藥加鹽煨熟食之

婦人血風瘡亦驗

青莧膏

治前症并婦人臍下連二陰生瘡狀如馬

刀痛出黃汁食減身浮二便澀滯由中下二焦風

熱所致若熱氣不出當作內痔腸癰

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗之稍乾再換消腫止痛退熱立驗內再服入症散尤佳

肩部

經絡 肩之上廉屬手足少陽經前廉屬手陽明經後廉屬手太陽經

肩疽 生于肩 腫赤引背靈樞為疣癰甚連腦脇治宜汗

之須汗出至足無害四五日內逆熨之一灸會

宗穴三七壯甚者灸肩真穴七壯

肩癰 生肩外垂骨兩接骨處 恐膿深徹骨慮傷筋脉拘攣宜緩