

内部资料
注意保存

广东省

南雄地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

南 雄 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1970.4	25° 08'	114° 19'	124.8	125.3	南雄县全安公社连塘大队贵村“郊外”	1961—1967.1	2、8、14、20	守
1970.5—1970.12	25° 08'	114° 19'	133.8	134.1	南雄县“城郊”	1967.2	2、8、14、20	不守
						1967.3—1969	8、14、20	不守
						1970	2、8、14、20	守

二、统 计 说 明

- 1.本站从1954年9月开始有纪录,1954.9—1960年历年资料未列出,除9—11、19—20、25、27项外,均已参加累年统计。
- 2.某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的,则在该月(旬)数值外加()号。
- 3.全月未出现该天气现象,风向频率不足0.5%时,则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或微量降水,则在该栏内记“0.0”。
- 4.降雪日数有一年(年度)或以上未出现,但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时,则累年平均初、终期按出现年数统计,且在右上角加注“*”号。但累年初、终间日数仍按实际观测年数(包括未出现的年份在内)统计。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米,即统计为降水日,若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数,不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选,但计入降水量内。
- 6.定时最大风速挑自24次观测记录。
- 7.风、天气现象、如为每天3次观测记录,各月最小相对湿度挑自4次定时的,均在年份或数值的右上角加注“*”号,以示区别。风的要素,1967年1—2月份的4次观测改为3次参加该年统计。
- 8.天气日数:
 - (1)大风日:凡一日中有大风出现,极大风速 ≥ 17.0 米/秒,风力达到或超过8级,即统计为大风日。
 - (2)雾日:凡一日中有雾出现,水平能见度在1000米(或3级)以下,即统计为雾日。
 - (3)雷暴日:凡一日中有雷暴或远雷暴出现,即统计为雷暴日。
 - (4)本站从1954.9—1970年未出现沙暴现象。

南 雄 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度 (%)	14
13. 历年各月最小相对湿度 (%)	15
14. 历年各月降水量 (毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23
21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速 (米/秒)	27
25. 历年各月定时最大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	31—32
28. 历年各月最多风向及其频率	33
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	34
30. 历年各月雹日数	35
31. 历年各月雾日数	36
32. 历年各月雷暴日数及其初、终期	37
33. 历年各月降雪日数及其初、终期	38
34. 历年各月霜日数及其初、终期	39

南雄

历年各月本站平均气压 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1009.3	1004.3	1003.0	997.9	993.7	990.6	987.6	989.2	992.0	100.7	1005.0	1006.1	998.3
1962	1008.8	1005.7	1002.7	998.7	993.8	990.5	988.1	991.9	994.7	1001.0	1005.6	1006.7	999.0
1963	1008.9	1008.2	1002.0	998.9	993.3	990.8	989.9	991.6	993.3	1002.9	1004.2	1007.5	999.3
1964	1007.0	1010.4	1003.7	998.2	994.6	990.7	992.0	989.3	995.1	1000.1	1005.7	1008.5	999.6
1965	1006.5	1003.6	1003.6	998.0	994.4	991.2	990.2	992.6	996.0	1002.0	1005.4	1008.7	999.4
1966	1007.4	1004.2	999.3	997.3	995.3	992.3	991.3	991.0	996.0	1001.8	1004.8	1006.7	999.0
1967	1011.1	1008.5	1002.1	999.7	992.8	989.3	989.2	989.7	996.2	1002.2	1006.3	1011.3	999.9
1968	1006.5	1009.6	1001.1	1001.3	993.8	992.3	989.2	989.9	995.2	1002.9	1005.8	1003.7	999.3
1969	1005.0	1006.9	1003.4	999.9	993.4	992.0	990.4	992.2	994.4	1001.3	1007.7	1009.8	999.7
1970	1009.4	1005.4	1004.1	1001.4	993.6	992.3	989.2	989.8	992.7	1000.8	1005.3	1006.1	999.2
1961—70年合计	10079.9	10066.8	10025.0	9991.3	9938.7	9912.0	9897.1	9907.2	9945.6	10015.7	10055.8	10075.1	9992.7
10年平均	1008.0	1006.7	1002.5	999.1	993.9	991.2	989.7	990.7	994.6	1001.6	1005.6	1007.5	999.3
1955—70年合计	16134.4	16098.5	16037.2	15980.7	15906.4	15858.7	15841.0	15849.2	15912.8	16028.4	16092.0	16119.6	15988.5
16年平均	1008.4	1006.2	1002.3	998.8	994.2	991.2	990.1	990.6	994.6	1001.8	1005.8	1007.5	999.3

南雄

历年各月平均气温 (摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.5	10.0	14.8	20.2	24.7	27.4	28.5	27.5	25.4	22.1	17.6	12.0	19.9
1962	7.5	12.4	13.9	18.8	23.8	25.7	29.3	28.9	26.4	21.3	14.8	11.0	19.5
1963	6.9	10.3	15.7	20.3	26.9	26.3	28.3	29.1	27.4	20.7	17.0	10.8	20.0
1964	9.9	7.2	15.2	22.0	24.8	25.5	28.7	28.0	26.5	22.5	15.3	10.4	19.7
1965	10.9	13.7	14.1	19.2	23.6	25.6	28.0	28.0	25.4	20.9	17.5	10.0	19.7
1966	11.1	12.9	16.9	20.2	24.1	25.1	28.1	28.6	24.4	22.1	16.4	10.8	20.1
1967	7.7	8.5	15.7	19.4	26.2	27.6	29.0	28.0	24.5	20.4	16.8	7.8	19.3
1968	10.2	6.4	15.7	19.9	24.3	25.3	28.7	28.1	26.5	20.1	17.9	15.8	19.9
1969	9.6	6.8	14.2	20.1	25.4	25.7	29.4	28.3	26.9	21.0	14.0	9.9	19.3
1970	7.2	12.8	10.7	18.4	24.5	26.5	28.6	27.9	25.8	20.9	15.4	11.6	19.2
1961—70年合计	89.5	101.0	146.9	198.5	248.3	260.7	286.6	282.4	259.2	212.0	162.7	110.1	196.6
10年平均	9.0	10.1	14.7	19.9	24.8	26.1	28.7	28.2	25.9	21.2	16.3	11.0	19.7
1955—70年合计	138.8	163.2	240.6	321.5	387.7	418.7	456.5	449.9	414.8	334.3	253.7	177.0	313.2
16年平均	8.7	10.2	15.0	20.1	24.2	26.2	28.5	28.1	25.9	20.9	15.9	11.1	19.6

南 雄

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年份 \ 月份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	24.8 28	20.0 28	28.4 20	28.7 30	33.8 17	37.2 22	36.5 1、23	36.8 23	34.8 27	32.4 19	29.4 10	25.3 18	37.2 22/6
1962	极 值 日 期	24.0 14	29.1 11	28.8 16	30.9 28	33.4 28	34.2 2	38.2 30	36.5 1、24	35.6 24	33.5 9、11	25.5 15	25.5 14	38.2 30/7
1963	极 值 日 期	23.5 20	22.1 6	27.5 4	32.4 30	33.9 26、31	34.6 25	36.4 17	37.0 14	38.0 2	33.6 3	30.6 6	24.7 7	38.0 2/9
1964	极 值 日 期	24.0 10、11	24.7 8	28.1 17	33.0 22	34.3 25	35.3 30	36.2 21	37.4 7	35.5 4	33.7 3	24.6 3	24.1 9	37.4 7/8
1965	极 值 日 期	27.6 31	27.1 13	27.7 19	29.7 27	32.1 18	33.1 9	36.6 13	35.4 31	36.1 3	32.1 3	30.0 7	24.8 22	36.6 13/7
1966	极 值 日 期	27.8 12	27.9 21	30.5 5	32.8 23、26	34.6 13	34.3 26	36.3 20	38.4 16	37.2 2	35.3 8	30.3 13	22.4 11	38.4 16/8
1967	极 值 日 期	23.7 27	26.0 22	29.7 29	32.2 10	33.8 29	36.7 29	38.4 17	37.3 29	35.7 3	34.0 13	27.2 28	19.2 19	38.4 17/7
1968	极 值 日 期	23.9 6	21.2 28	28.2 21	31.1 23	33.6 12	34.2 28	37.5 29	35.5 19	34.6 10、19	32.9 8	29.6 26	29.8 4	37.5 29/7
1969	极 值 日 期	27.7 27	24.8 12	28.5 25	34.2 10	33.8 30	34.5 25	37.9 27	36.5 2	37.1 22	29.9 13、16	28.0 13、14	23.2 24	37.9 27/7
1970	极 值 日 期	23.9 2	26.5 25	27.6 29	30.4 16	33.1 5	34.5 17	37.8 31	38.2 1	34.2 19	32.2 25	29.0 13	23.0 4	38.2 1/8
1961—70	极 值 日 年 份	27.8 12 1966	29.1 11 1962	30.5 5 1966	34.2 10 1969	34.6 13 1966	37.2 22 1961	38.4 17 1967	38.4 16 1966	38.0 2 1963	35.3 8 1966	30.6 6 1963	29.8 4 1968	38.4 16/8、17/7 66、67
1954.9—70	极 值 日 年 份	27.8 12 1966	29.3 28 1955	32.0 9 1960	34.2 10 1969	34.6 13 1966	37.2 22 1961	38.4 17 1967	38.4 16 1966	38.0 2 1963	35.3 8 1966	31.5 12 1958	29.8 4 1968	38.4 16/8、17/7 66、67

南雄

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	-2.8 17	-2.1 2	7.0 10	12.8 9、28	11.7 5	19.4 5	23.5 9、27	22.0 17	17.3 16	10.4 27	5.3 25	2.7 8、31	-2.8 17/1
1962	极 值 日 期	-2.1 27	-0.2 16	2.8 3	8.3 3	16.4 20	20.5 11	23.0 1	23.0 3	20.4 7	9.6 28	0.6 30	-0.4 3	-2.1 27/1
1963	极 值 日 期	-4.5 15	1.9 1	4.5 1、14	6.6 9	20.3 2	19.6 16	22.7 24	22.9 2	18.8 25	8.5 20、21	5.8 28	0.0 28	-4.5 15/1
1964	极 值 日 期	0.7 30	0.4 27	6.4 26	11.5 7	17.6 1	14.5 5	22.6 23	22.0 27	19.8 25	16.9 18	3.6 26	-1.1 19	-1.1 19/12
1965	极 值 日 期	0.4 1	4.4 6	3.0 7	11.2 6	12.9 3	18.7 5	23.1 24	20.2 23	15.9 18	8.9 19	4.3 27	-1.5 31	-1.5 31/12
1966	极 值 日 期	-1.9 1	0.2 23	5.2 9	9.4 5	14.1 4	18.5 4	22.1 16	18.9 21	12.8 25、27	10.9 29	2.4 22	-0.5 28	-1.9 1/1
1967	极 值 日 期	-5.1 17	-1.3 15	2.4 6	10.6 5	19.8 10	15.9 10	22.3 22	22.9 31	15.3 15	9.0 28	5.1 30	-2.9 30	-5.1 17/1
1968	极 值 日 期	-0.6 1	-0.4 11	1.0 3	10.5 28	16.0 8	19.6 5	23.0 10	21.3 3	17.0 23	8.5 21	5.9 10	0.3 23	-0.6 1/1
1969	极 值 日 期	-0.9 31	-2.0 5	2.1 14	4.7 6	17.4 29	18.0 19	24.3 12	22.8 13、14	18.5 13	10.6 11	1.7 26、27	-1.5 4、10	-2.0 5/2
1970	极 值 日 期	-2.5 20	0.4 1	4.5 14	9.1 14	16.4 16、20	19.8 14	21.9 30	22.0 27	13.6 30	9.9 31	5.4 16	3.7 14	-2.5 20/1
1961—70	极 值 日 年 份	-5.1 17 1967	-2.1 2 1961	1.0 3 1968	4.7 6 1969	11.7 5 1961	14.5 5 1964	21.9 30 1970	18.9 21 1966	12.8 25、27 1966	8.5 3天 63、68	0.6 30 1962	-2.9 30 1967	-5.1 17/1 1967
1954.9—70	极 值 日 年 份	-6.2 12 1955	-3.2 11 1957	1.0 3 1968	4.7 6 1969	11.7 5 1961	14.5 5 1964	21.9 30 1970	18.9 21 1966	12.8 25、27 1966	6.0 31 1958	-0.8 26 1956	-2.9 30 1967	-6.2 12/1 1955

南雄

历 年 各 月 逐 旬

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	8.3	5.7	11.2	9.6	9.3	11.6	13.4	17.0	14.0	19.7	19.6	21.2	23.4	25.6	25.1	24.3	28.2	29.7
1962	6.8	9.3	6.4	12.8	11.1	13.4	13.2	16.4	12.4	16.3	17.4	22.6	22.0	22.9	26.2	25.6	25.6	26.1
1963	6.1	6.6	7.9	9.0	10.1	12.2	17.9	10.6	18.2	18.1	22.0	20.8	26.1	26.3	28.2	27.4	23.9	27.7
1964	12.5	11.3	6.3	10.1	7.5	3.8	13.2	18.0	14.6	19.0	23.6	23.3	23.0	25.4	26.1	24.3	24.9	27.2
1965	8.3	9.5	14.5	12.1	18.4	9.9	9.8	16.4	16.0	17.4	19.0	21.2	21.8	24.1	24.9	25.9	25.1	25.6
1966	10.7	14.3	8.4	15.6	12.7	9.8	17.3	17.8	15.8	18.1	18.2	24.4	22.7	24.2	25.3	23.7	24.6	26.9
1967	4.8	5.2	12.5	8.2	7.2	10.6	11.4	18.0	17.4	17.9	18.2	22.1	26.5	25.2	27.0	25.8	28.0	29.1
1968	9.5	11.3	9.8	3.5	6.6	9.5	12.9	19.3	14.8	20.3	18.7	20.6	24.5	24.6	23.8	24.8	25.1	26.1
1969	6.9	8.1	13.4	3.3	12.5	4.2	8.9	14.3	18.9	15.8	21.6	22.9	25.7	25.3	25.2	24.9	25.1	27.0
1970	7.4	5.5	8.4	11.7	12.6	14.2	9.0	9.0	13.9	17.6	17.1	20.5	25.1	23.0	25.3	25.8	27.1	26.6
1961—70年 合计	81.3	86.8	98.8	95.9	108.0	99.2	127.0	156.8	156.0	180.2	195.4	219.6	240.8	246.6	257.1	252.5	257.6	272.0
10年平均	8.1	8.7	9.9	9.6	10.8	9.9	12.7	15.7	15.6	18.0	19.5	22.0	24.1	24.7	25.7	25.3	25.8	27.2
1955—70年 合计	127.3	136.5	151.2	159.7	163.9	167.2	210.3	250.0	260.1	295.6	313.9	354.7	383.7	382.0	397.5	407.0	414.2	435.3
16年平均	8.0	8.5	9.5	10.0	10.2	10.5	13.1	15.6	16.3	18.5	19.6	22.2	24.0	23.9	24.8	25.4	25.9	27.2

平均气温 (摄氏度)

南雄

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
28.4	28.6	28.5	27.2	27.5	27.8	25.3	24.8	26.1	23.6	22.8	20.1	19.6	19.1	14.1	11.4	14.6	10.1	1961
27.9	29.5	30.3	29.2	28.4	29.3	25.2	27.0	27.2	24.7	21.3	18.1	16.3	18.6	9.4	9.0	12.7	11.3	1962
28.2	28.3	28.3	28.7	29.1	29.4	29.2	27.0	25.9	23.6	19.6	18.9	20.1	16.5	14.5	12.0	10.6	9.9	1963
27.6	30.1	28.3	28.5	27.7	27.8	28.5	26.5	24.7	24.1	23.2	20.5	18.0	14.1	13.8	11.6	8.6	10.9	1964
28.1	28.2	27.7	27.9	28.2	28.0	27.4	23.6	25.2	24.2	19.6	19.1	20.3	18.4	13.9	12.0	9.2	8.8	1965
27.8	28.3	28.1	29.3	29.3	27.4	26.3	24.5	22.4	24.8	21.5	20.3	17.6	17.9	13.7	11.1	13.4	8.0	1966
28.4	29.9	28.9	28.4	27.2	28.4	27.5	23.0	22.8	20.1	20.9	20.3	18.3	15.3	16.9	7.6	8.4	7.5	1967
27.0	28.7	30.2	27.3	28.9	28.1	27.9	27.7	23.9	22.9	19.0	18.6	17.7	17.5	18.6	20.4	14.0	13.3	1968
29.1	29.3	29.7	28.8	27.4	28.8	28.0	26.3	26.4	19.8	21.8	21.5	16.5	14.7	10.9	9.0	9.7	11.0	1969
29.0	28.3	28.5	28.2	28.0	27.5	26.2	26.7	24.7	21.7	22.3	19.1	16.8	15.9	13.3	12.0	12.7	10.2	1970
281.5	289.2	288.5	283.5	281.7	282.5	271.5	257.1	249.3	229.5	212.0	196.5	181.2	168.0	139.1	116.1	113.9	101.0	1961—70年 合计
28.2	28.9	28.9	28.4	28.2	28.3	27.2	25.7	24.9	23.0	21.2	19.7	18.1	16.8	13.9	11.6	11.4	10.1	10年平均
451.6	459.2	458.8	452.0	450.7	448.1	434.2	414.1	397.0	361.8	336.3	307.9	286.9	261.5	213.3	183.3	184.7	164.3	1955—70年 合计
28.2	28.7	28.7	28.3	28.2	28.0	27.1	25.9	24.8	22.6	21.0	19.2	17.9	16.3	13.3	11.5	11.5	10.3	16年平均

南雄

历年各月逐旬日最高

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	4	9	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	6	6	5
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	11	8	2	9
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	7	6	5	3	8
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	8	4	7
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	5	4	7	1	2	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	5	10	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	6	2	4	4	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	5	7	5	4	7
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	8	6	8	9
1961—70年 合计	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	22	41	48	70	54	52	78
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.6	2.2	4.1	4.8	7.0	5.4	5.2	7.8
1955—70年 合计	0	0	0	0	0	0	4	0	1	8	13	41	63	62	89	85	89	130
16年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.8	2.6	3.9	3.9	5.6	5.3	5.6	8.1

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

南雄

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	10	9	8	10	4	3	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	111
9	10	11	10	10	11	4	9	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	122
10	10	11	10	10	11	10	8	9	5	1	0	1	0	0	0	0	0	144
8	10	11	9	10	11	10	7	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	129
10	8	10	9	10	11	7	5	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0	110
8	9	11	10	10	11	7	7	4	9	2	2	1	1	0	0	0	0	125
8	10	11	9	7	9	10	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	126
8	10	11	10	10	9	9	9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	116
10	10	11	10	8	10	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
10	9	11	10	10	10	6	9	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	121
91	96	108	96	93	103	77	69	58	31	18	5	3	1	0	0	0	0	1226
9.1	9.6	10.8	9.6	9.3	10.3	7.7	6.9	5.8	3.1	1.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	122.6
149	155	170	154	148	161	131	115	82	52	29	7	4	4	0	0	0	0	1946
9.3	9.7	10.6	9.6	9.3	10.1	8.2	7.2	5.1	3.3	1.8	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	121.6

南 雄

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 \ 月 旬	六			七			八			九			十			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	3	9	3	2	4	1	1	4	0	0	0	0	0	0	27
1962	0	0	0	1	6	10	5	2	8	0	1	1	0	0	0	34
1963	0	0	0	0	3	1	3	4	8	5	1	0	0	0	0	25
1964	0	0	1	2	7	5	1	0	1	3	1	0	0	0	0	21
1965	0	0	0	0	2	3	0	1	2	4	0	0	0	0	0	12
1966	0	0	0	0	3	4	7	8	5	2	0	0	1	0	0	30
1967	0	1	2	0	6	9	4	0	5	1	0	0	0	0	0	28
1968	0	0	0	1	1	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	16
1969	0	0	0	0	2	6	3	0	0	4	2	5	0	0	0	22
1970	0	0	0	5	1	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	17
1961—70年合计	0	4	12	12	33	57	28	22	33	19	5	6	1	0	0	232
10年平均	0.0	0.4	1.2	1.2	3.3	5.7	2.8	2.2	3.3	1.9	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	23.2
1955—70年合计	0	4	12	21	50	87	39	34	39	25	9	8	1	0	0	329
16年平均	0.0	0.3	0.8	1.3	3.1	5.4	2.4	2.1	2.4	1.6	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	20.6

南 雄

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 度	月 旬	十一			十二			一			二			三			全	初	终	初 、 终
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	年	日	日	间 日 数
1960—61		0	0	0	0	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	9	20/12	3 / 2	46
1961—62		0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	1	0	0	0	0	9	2 / 1	16 / 2	46
1962—63		0	0	0	4	0	0	4	5	6	0	0	0	0	0	0	19	2 / 12	31 / 1	61
1963—64		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28 / 12	28 / 12	1
1964—65		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19 / 12	20 / 12	2
1965—66		0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17 / 12	2 / 1	17
1966—67		0	0	0	0	0	2	2	6	0	2	1	0	0	0	0	13	27 / 12	15 / 2	51
1967—68		0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7	11 / 12	21 / 2	73
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	6	31 / 1	8 / 2	9
1969—70		0	0	0	3	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	10	4 / 12	21 / 1	49
1970—71		0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	5	6 / 1	3 / 2	29
1960—70年合计		0	0	0	7	9	5	16	21	12	12	3	1	0	0	0	86			384
11年平均		0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.5	1.5	1.9	1.1	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	7.8	24 / 12	26 / 1	34.9
1954—70年合计		0	0	2	8	12	5	26	37	20	14	6	2	0	0	0	132			603
17年平均		0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	0.3	1.5	2.2	1.2	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	7.8	25 / 12	28 / 1	35.5

南 雄

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.1	9.9	14.1	19.8	24.4	29.3	30.7	30.1	27.5	19.4	16.1	11.5	20.1
1962	7.0	10.2	12.7	18.1	25.2	29.2	30.8	29.3	27.4	19.3	13.8	9.7	19.4
1963	5.4	9.5	14.5	19.4	27.1	27.6	29.5	29.7	28.5	18.1	16.2	10.5	19.7
1964	10.7	8.9	14.0	21.7	25.2	28.0	29.4	30.1	26.5	21.7	11.1	8.4	19.6
1965	9.1	12.5	12.8	19.3	23.5	27.2	29.7	28.4	23.7	20.1	16.5	10.2	19.4
1966	10.7	12.0	15.7	20.4	22.6	27.9	30.1	27.6	19.2	19.1	13.1	10.2	19.1
1967	8.0	9.7	14.8	19.2	27.5	27.8	30.5	30.3	24.3	16.6	14.9	7.5	19.3
1968	8.5	7.5	14.5	17.9	24.6	28.2	29.4	30.4	25.6	17.8	15.3	14.5	19.5
1969	10.9	8.7	14.0	19.3	26.4	27.6	29.9	29.8	25.8	19.2	11.7	8.2	19.3
1970	8.1	12.0	11.5	17.5	25.1	28.1	28.7	29.5	27.8	18.5	12.3	10.9	19.2
1961—70年合计	86.5	100.9	138.6	192.6	251.6	280.9	298.7	295.2	256.3	189.8	141.0	101.6	194.6
10年平均	8.7	10.1	13.9	19.3	25.2	28.1	29.9	29.5	25.6	19.0	14.1	10.2	19.5

南雄

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

月份 年份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 日	值 期	16.4 24	16.9 5	24.2 20	26.4 25	31.3 26	36.0 30	34.4 3天	36.3 15	33.4 26	29.1 1	25.8 19	22.3 18	36.3 15/8
1962	极 日	值 期	16.3 14	19.0 10	23.4 20	26.4 21	33.7 27	34.3 3	36.1 20	34.9 12	32.9 16	30.8 9	23.2 1	18.4 14	36.1 20/7
1963	极 日	值 期	12.3 4	14.7 17	22.0 26	27.4 29	33.8 31	33.8 21	35.4 16	34.6 14	34.9 4	29.3 3	24.2 5	17.7 7	35.4 16/7
1964	极 日	值 期	21.8 12	19.7 8	22.0 31	28.0 20	34.5 19	34.6 1	34.4 1	34.2 6	35.0 3	29.1 1、2	20.6 1	13.6 9	35.0 3/9
1965	极 日	值 期	16.2 31	19.7 20	22.4 23	27.3 23	32.1 8	32.3 10、30	34.4 27	33.7 7	32.5 4	30.4 2	25.9 6	21.4 22	34.4 27/7
1966	极 日	值 期	20.6 13	22.4 22	24.6 17、22	30.2 24	33.5 12	34.7 26	34.9 24	33.4 12	31.8 1	28.2 13	27.4 13	15.8 12	34.9 24/7
1967	极 日	值 期	20.8 28	21.1 22	24.8 28	28.8 30	33.3 28	34.9 28	38.9 18	35.1 27	34.4 2	29.6 12	24.6 9	11.9 5	38.9 18/7
1968	极 日	值 期	16.2 6	15.4 28	22.4 21	25.0 16	29.6 23	34.0 27	35.5 2	36.1 28	33.6 18	30.6 8	23.0 2、3	20.5 5、9	36.1 28/8
1969	极 日	值 期	23.2 20	19.7 13	25.7 28	27.5 24	33.8 20	34.9 30	34.5 2	33.8 9	34.4 6	28.0 23	24.2 14	15.7 7	34.9 30/6
1970	极 日	值 期	13.1 2	21.2 25	22.6 28、30	26.5 10	31.9 29、30	34.5 8	33.4 13	33.7 20	34.2 7	27.8 23	20.7 14	16.2 22	34.5 8/6
1961—70	极 日 年	值 期 份	23.2 20 1969	22.4 22 1966	25.7 28 1969	30.2 24 1966	34.5 19 1964	36.0 30 1961	38.9 18 1967	36.3 15 1961	35.0 3 1964	30.8 9 1962	27.4 13 1966	22.3 18 1961	38.9 18/7 1967

南雄

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值 日期	3.2 14	4.2 1、2	8.2 27	10.1 9	7.0 4	21.9 4	25.6 18	25.0 25	17.2 17	11.5 10	8.6 25	5.6 29	3.2 14/1
1962	极值 日期	3.2 27	4.7 1	6.2 26	7.7 3	17.3 5	23.1 10	26.7 20	23.4 31	18.2 6	9.3 15	5.7 29、30	5.1 5	3.2 27/1
1963	极值 日期	2.6 7、10	4.5 4	7.3 13	7.5 9	20.8 2	21.6 9	24.7 26	26.0 8	20.2 25	8.5 18	8.9 27	6.2 28	2.6 7、10/1
1964	极值 日期	5.7 19	5.2 26	8.0 25	12.4 7	16.1 12	15.9 4	25.1 12	26.2 9	16.5 30	15.6 18	5.3 12	3.3 18	3.3 18/12
1965	极值 日期	3.2 12	5.1 2	7.0 7	12.0 13	13.9 3	18.7 6	25.0 13	20.1 21	13.2 17	9.4 18	7.1 30	3.0 18	3.0 18/12
1966	极值 日期	5.6 1	3.5 23	6.8 19	11.0 5	12.7 3	21.1 6	26.0 22、29	17.8 20	8.3 24	9.5 29	3.7 30	2.5 2	2.5 2/12
1967	极值 日期	1.9 16	5.4 12	3.9 5	10.4 4	22.6 9	17.5 10	26.1 25	25.9 17	15.9 15	9.2 18	5.3 30	3.2 30	1.9 16/1
1968	极值 日期	2.4 15	3.8 20	6.3 3	10.4 12	14.6 1	20.5 4	20.2 27	22.2 31	14.4 29	6.5 24	6.6 10	5.4 22	2.4 15/1
1969	极值 日期	4.5 31	3.9 5	7.0 13	5.8 5	14.0 27	19.5 5	22.6 27	25.3 14、15	16.7 14	7.4 9	4.6 26	2.9 3	2.9 3/12
1970	极值 日期	3.5 5、6	6.5 1	7.4 16	7.8 4	14.8 16	18.0 14	17.2 31	22.8 1	9.4 30	6.0 30	5.8 16	4.5 14	3.5 5、6/1
1961—70	极值 年份	1.9 16 1967	3.5 23 1966	3.9 5 1967	5.8 5 1969	7.0 4 1961	15.9 4 1964	17.2 31 1970	17.8 20 1966	8.3 24 1966	6.0 30 1970	3.7 30 1966	2.5 2 1966	1.9 16/1 1967