

御纂醫宗金鑑卷十五

訂正仲景全書傷寒論註

辨可汗病脈證篇

夫以爲疾病至急倉卒尋求按要者難得故重集諸
可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又
時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

註

夫以疾病至急倉卒尋求治法難得其要者
汗吐下也故重集汗吐下諸可與不可與之
法比之三陰三陽篇中則易見也又時有不



御纂醫宗金鑑卷十五

訂正傷寒論註目錄

辨可汗病衄證篇

辨不可汗病衄證篇

辨可吐病衄證篇

辨不可吐病衄證篇

辨可下病衄證篇

辨不可下病衄證篇



御纂醫宗金鑑卷十五

訂正仲景全書傷寒論註

辨可汗病脈證篇

夫以爲疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

註

夫以疾病至急倉卒尋求治法難得其要者汗吐下也故重集汗吐下諸可與不可與之法比之三陰三陽篇中則易見也又時有不



止是三陰三陽篇中者亦出在諸可與不可與中也

大法春夏宜發汗

註

春夏陽氣舒暢故宜發汗醫治常道此大法也

集註

程應旂曰春夏宜發汗者發汗有助宣陽氣

之功等於春夏發生長育之義今人多以麻桂二湯作春夏之禁藥其輕於畔經者由其未明天道也



凡發汗欲令手足俱周時出以繫繫然一時間許亦佳不可令如水淋漓若病不解當重發汗汗多者必亡陽陽虛不得重發汗也

註

凡發汗令手足俱周時出是欲汗緩出周遍則邪氣悉去正氣不傷也以繫繫然不得令如水淋漓爲度不欲汗急出過多也若急出過多則邪氣不盡正氣反傷矣倘若病不解當重發汗但前汗已多更汗必亡其陽陽虛卽病不解故不敢再發其汗也



集註

成無已曰汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也陽虛爲無津液故不可重發汗

方有執曰此丁寧發汗之節度也

張錫駒曰汗乃津液汗多則亡津液何以又謂亡陽也經云上焦開發腠理薰膚充身澤毛若霧露之溉蓋汗雖津液必藉陽氣之薰蒸宣發而後出故汗多亡津液而陽亦隨之俱亡也



凡服湯發汗中病即止不必盡劑也

註

服湯發汗汗出病解便可止再服不必定

盡劑

集註

張應旄曰中病即止亦麻黃桂枝互舉之詞

示樽節於中字所以嚴不中之禁也

凡云可發汗無湯者丸散亦可要用汗出為解

然不如湯隨證良驗

註

凡云可發汗無湯者一時倉卒無湯以丸散

代之亦可要不過以汗出為解耳然丸散乃



定劑不如湯可隨證而進其驗甚準故曰良也

集註程應旂曰丸散僅可從權隨證則不如湯

夫病脈浮大問病者言但便鞭耳設利者爲大逆鞭爲實汗出而解何以故脈浮當以汗解

註

脈浮大屬表未解雖有便鞭裏實亦不可利

下何以故因脈浮也當先解其外表解熱除內外和諧而大便自通矣設用利藥是爲大逆也



集註 成無已曰結胸雖急脈浮大尤不可下下之

卽死況此便鞭乎論中有云本發汗而復下之此爲逆若先發汗治不爲逆此之謂也

辨不可汗病脈證篇

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血脈而且寒陽微發汗躁不得眠

註

浮而無力濡脈也沉而無力弱脈也浮中沉



俱無力似有似無微脈也滯而不流利濇脈也巔謂浮也上謂寸也下謂尺也脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下關脈浮濡沉弱寸脈微尺脈濇陽虛則寸脈微血少則尺脈濇此陽虛血少不可汗之脈也陽虛當汗出惡寒血少當心煩發熱此陽虛血少不可汗之證也若誤認爲太陽中風而發其汗必致陰陽相失而兩亡則反煩躁不眠厥而且寒矣



脈濡而弱、弱反在關、濡反在巔、弦反在上、微反在下、弦爲陽、運微爲陰、寒上實下虛、意欲得溫、微弦爲虛、不可發汗、發汗則寒慄、不能自還。

註

此謂關脈浮濡沉弱、寸脈弦尺脈微也。弦爲少陽熱邪之診、微爲少陰寒邪之診。故曰上實下虛也。然微弦同見、虛實未審、惟察其人意欲得溫、則非惡寒在表、而是畏寒在裏也。故不可發汗。若誤發其汗、則陰愈盛而生寒慄、陽愈衰而不能自還矣。



諸脈得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩其形相像根本異源

註

凡諸病得數動脈者有餘診也可發汗若按之微弱者是外假實而內真虛也不可發汗若誤發其汗傷其津液則腹中乾大便難胃燥而煩其形似胃實熱結之陽明究其根本實由發虛家汗致成津枯虛燥之陽明也故曰其形相像根本異源也

集程知曰動數爲熱微弱爲虛發汗動津液則

便難腹乾胃燥而煩此與陽明裏熱之證雖
曰其形相似而根本則有虛實之不同也
張志聰曰數動陽脈也微弱陰脈也諸脈
動數微弱者猶言左右三部或得動數之脈
而按之微弱者皆不可發汗發汗則津液內
竭故大便難水氣外洩故腹中乾火熱上蒸
故胃燥而煩其形相像者汗後而燥證相同
也根本異源者動數之脈屬乎陽微弱之脈
屬乎陰有陰有陽有虛有實也



厥脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前

註

可發汗之脈必陰陽俱緊今厥而脈緊乃

陰之緊非太陽之緊也若發其汗則傷少陰

之氣聲亂咽嘶舌萎聲不得前之證作矣

集註

成無已曰厥而脈緊則少陰傷寒也法當溫

裏而反發汗則損少陰之氣其脈不能入肺

中循喉嚨挾舌本故聲亂咽嘶舌萎聲微言

語不得高也



魏荔彤曰此段就厥證論脈知陽虛禁汗因明諸逆發汗之貽悞也厥者凡厥有冷厥熱厥虵厥寒熱相勝之厥但見緊脈無論何病皆在陰若發汗反攻其陽則氣散血竭夫舌根於腎聲出於肺聲亂咽嘶肺氣欲絕也舌萎卽萎不爲用也聲不得前本氣不振也皆由於發汗散亡其腎肺二臟真氣也

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲卽吐水動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋

惕肉潤動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在
心端動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩
骨節苦痛目暈惡寒食則反吐穀不得前

註

動氣者築築然氣跳動也臍之上下左右四
藏之位也四藏之氣不安其位故動也緣素
爲客邪所據本藏之氣已失其守尙賴中州
胃氣爲主卽有表邪不可發汗恐胃中之氣
液兩傷本藏失養則所不勝之邪因而同病
也動氣在右肺氣不治心不恒德若誤汗之



則心氣愈熱血脈沸騰故衄而渴苦煩也肺
失治節不能通調水道故飲卽吐水也動氣
在左肝氣不治肺不恒德若誤汗之則肝
失升故頭眩也若汗出不止津液失養筋肉
故惕瞤也動氣在上心氣不治腎不恒德若
誤汗之則心氣虛故腎氣上衝正在心端也
動氣在下腎氣不治脾不恒德若誤汗之腎
水虛竭故骨痛惡寒無汗心煩目暈也脾土
過燥不守常化故食則反吐穀不得近也