

華園醫學六種

省中醫藥學會藏

編號 11-102 $\frac{3}{12}$



增輯傷寒類方目錄

卷四

雜方十二
方廿二

六經脈證

傷寒附法



赤石脂禹餘糧湯歌

赤石餘糧各一觔。下焦下利此湯欣。理中不應宜斯法。爐底填來得所聞。張令韶曰。石性墜下。故以治下焦之利。非僅固瀉也。下焦濟泌別汁。而滲入膀胱。故利不止者。又當利其小便。以分別其水穀焉。夫心下痞屬上中二焦。此復言不下焦不和。而亦能成痞也。○柯韻伯曰。甘姜參朮。可以補中宮元氣之虛。而不足以固下焦脂膏之脫。此利在下焦。故不得以理中之劑收功矣。然大腸之不

雜法方類十二

赤石脂禹餘糧湯

一

發汗。必恍惚。心亂。小便已。陰疼。與禹餘糧丸。疑卽此爲丸。

赤石脂 禹餘糧 各一斤 右二

味。以水六升。煮取二升。去滓。

分溫三服。方二石同煎。中絕少。

傷寒服湯藥。下利不止。心下

痞鞭。服瀉心湯已。復以他藥

論中重有汗家重

固。仍責在胃。關門之不閉。仍責在脾。二石皆土之精。氣所結實。胃而瀉腸。急以治下焦之標者。實以培中宮之本也。要知此證。土虛而火不虛。故不宜於姜附。若溼甚而虛不甚。復利不止者。故又當利小便也。○赤石脂氣味甘平無毒。主治黃疸洩痢。腸澼膿血。陰蝕下血。赤白邪氣。癰腫疽痔。惡瘡。頭瘍。疥癩。久服補髓益氣。肥健不飢。輕身延年。五色石脂各隨五色補五藏。○禹餘糧氣味甘寒無毒。主治欬逆寒熱煩滿下痢。赤白血閉。癥瘕。大熱煉餌服之。輕身延年。

下之。利不止。再誤。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦也。此利在下焦。下藥太過。則赤石脂禹餘糧湯主之。以瀉復利不止。當利其小便。分其清濁。則便自堅。

炙甘草湯歌

結代脈須四兩甘。棗枚三十桂姜三。半升麻麥一觔地。二兩參膠酒水涵。按周禹載云。本條不言外證。寒熱已罷可知。不言內證。二便自調可知。第以病久正氣大虧。無陽以宣其氣。更無陰以養其心。此脈結代。心動悸。所由來也。方中參地黃阿膠麥冬大棗麻仁。皆柔潤之品。以養陰。必得桂枝生姜之辛。以行陽氣。而結代之脈乃復。尤重在炙甘草一味。主持胃氣。以資脈之本原。佐以清酒。使其捷行於脈道也。其煮

炙甘草湯 二

又名復脈湯。

甘草

炙四兩

生薑

三兩

人參

二兩

生地黃

一斤

桂枝

三兩

麥門

冬

半斤

阿膠

二兩

麻仁

半斤

大棗

三十枚

右九味

以清酒七

升水

八升

先煮

八味

取三升

去渣

內膠

烱消盡

溫服

一升

日三服

法用酒七升。水八升。只取三升者。以煎良久。方得爐底變化之功。步步是法。要之。卽第言結代者。用此方以復之。非謂脈脫者。以此方救之也。學者切不可泥其方名。致誤危證。推之。孫真人製生脈散。亦因其命名太誇。庸醫相沿。貽害豈淺鮮哉。○按此證必緣發汗過多。所致。汗爲心液。心液傷。則血虛。不能養心。故心動悸。心液傷。則血不能榮脈。故脈結代。取地黃阿膠等。爲有形之品。補有形之血。另立法門。○地黃氣味甘寒。無毒。主傷中。逐血痺。填骨髓。長飢肉。作湯除

傷寒脈結代。脈來緩而時一

來動而中止。不能自還。因而復動曰代。幾動一息亦曰代。而

皆氣血兩虛而經隧不通。陰陽不交之故。心動悸。

心主脈。脈之止息。炙甘草湯

主之。此治傷寒邪盡之後。氣

人書云。陰盛則結。陽盛則促。

寒熱積聚。除痺療折。跌絕筋。久服輕身不老。生者尤良。

甘草乾薑湯歌

心煩腳急理須明。攻表誤行厥便成。二兩炮姜甘草四。熱因寒用奏功宏。按誤服桂枝湯而厥。其為熱厥無疑。何以又用甘草乾姜乎。而不知此方以甘草為主。取大甘以化姜桂之辛。熱乾姜為佐。妙在炮黑變辛為苦。合甘草又能守中以復陽也。論中乾姜俱生用。而唯此一方用炮。須當切記。或問亡陽由於辛熱。今乾姜雖經炮。帶些苦味。

甘草乾薑湯 三

甘草

四兩炙

乾薑

二兩炮

右二味

以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。



畢竟熱性尚存其義何居
答曰此所謂感以同氣則
易入也子能知以大辛回
陽主姜附而佐以膽尿之
妙便知以大甘復陽主甘
草而佐以乾姜之神也推
之殭蠶因風而死取之以
治中風驢為火畜大動風
火以伏流之阿水造膠遂
能降火而熄風皆古聖人
探造化之微也仲景又以
此湯治肺痿更為神妙後
賢取治吐血蓋學古而大
有所得也

芍藥甘草湯歌

芍甘四兩各相均兩腳拘
攣病在筋陽旦誤投熱氣

芍藥甘草湯四

芍藥 四兩
甘草 四兩
右二味



藥。苦。甘。相。濟。卽。時。伸。按。芍。藥。味。苦。甘。草。味。甘。苦。甘。合。用。有。人。參。之。氣。味。所。以。大。補。陰。血。血。得。補。則。筋。有。所。養。而。舒。安。有。拘。攣。之。患。哉。時。醫。不。知。此。理。謂。爲。戊。己。湯。以。治。腹。痛。有。時。生。熟。並。用。且。云。中。和。之。劑。可。治。百。病。凡。病。人。素。溘。與。中。虛。者。服。之。無。不。增。劇。誠。可。痛。恨。

以水三升。煮取一升五合。去

滓。分溫再服。

傷寒脈浮。自汗出。小便數。心

煩。微惡寒。以上俱似。腳攣急。

裏虛之象。只此一症。決非桂枝症矣。凡辨症。必於獨異處。

着眼。反與桂枝湯欲攻其表。此

誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁

吐逆者。有陽越之象。作甘草乾姜

湯與之。以復其陽。若厥愈足。

溫者更作芍藥甘草湯與之。

其腳卽伸。

此湯乃純陰之劑。以復其陰也。陰陽。

兩和而若胃氣不和。讖語者。

留邪在。少與調胃承氣湯。若

重發汗。復加燒鍼者。四逆湯

主之。

詳見四逆湯條下。

問曰。證象陽旦。

活人書云。桂枝湯加黃芩。

曰陽旦。成無已云。按法治之。卽桂枝湯別名。

而增劇。厥逆。咽中乾。兩脰拘

急而譫語。以上言按法用方而病不應手其故

安在。師言夜半手足當溫。兩腳

當伸。後如師言。何以知之。答

曰。寸口脈浮而大。浮則爲風。

大則爲虛。風則生微熱。虛則

兩脰攣。病證象桂枝。因加附

子參其間。附桂枝湯。猶桂令汗

出。附子溫經亡陽故也。兩厥逆

拘急。卽亡。厥逆咽中乾煩躁。陽之兆。

陽明內結。陽越在上。識語煩亂更

飲甘草乾姜湯。通納。夜半陽

氣還兩足當熱。脛尚微拘急。

重與芍藥甘草湯。陽復而陰又虛。以此

養陰。爾乃腳伸。以承氣湯微

澹則止其讖語。以滌陽明所結之餘邪。

故知病可愈。病證象桂枝以下歷敘治效。

以明用藥之次第當如此。蓋病證既多斷無一方能治之。

理必先分證而施方。而其先後之序又不可亂。其方有前

後截然相反者亦不得以錯雜為嫌。隨機應變神妙無方。

而又規矩不亂。故天下無不可愈之疾。後人欲以一方治

諸症。又無一味中病之藥。嗚呼難哉。

茵陳蒿湯歌

茵陳蒿湯五

二兩大黃十四梔。茵陳六兩。早煎宜。身黃尿短腹微滿。解自前陰法最奇。○柯韻伯曰。太陽陽明俱有發黃證。俱頭汗出而身無汗。則熱不得外越。小便不利。則熱不得下利。故瘀熱在裏而發黃。然裏有不同。肌肉是太陽之裏。當汗而發之。故用麻黃連軹赤小豆湯。心胸是太陽之裏。陽明之表。當寒以勝之。故用梔子蘗皮湯。乃清火法。腸胃是陽明之裏。當瀉之。於內故立本方。是逐穢法。茵陳稟北方之色。經冬不凋。傲霜凌雪。偏受大寒之氣。故能除熱邪留結。率梔子以

茵陳蒿 六兩 梔子 十四 大黃

二兩 右三味 以水一斗 先煮

茵陳 減六升 茵陳爲內二味

煮取三升 去滓分溫三服 小

便當利 尿如皂角汁狀 色正

赤 一宿腹減 病從小便去也

先煮茵陳 則大黃從陽明病

發熱汗出者 此爲熱越 不能

通水源。大黃以調胃實。令一身內外瘀熱悉從小便而出。腹滿自減。腸胃無傷。乃合引而竭之之法。此陽明利水之聖劑也。又按仲景治陽明渴飲有三法。太陽篇之五苓散。微發汗以散水氣者。不與焉。若大渴煩躁。小便自利者。白虎湯加參。清火而生津。脈浮發熱。小便不利者。豬苓湯滋陰以利水。若小便不利而發黃。腹滿者。茵陳湯以泄熱。令黃從小便出。病情治法。胸有成竹矣。竊思仲景利小便。必用氣化之品。通大便。必用承氣之品。以小便由於氣化也。茲小便不

發黃也。但頭汗出者。身無汗。

劑頸而還。小便不利。渴欲飲

水者。此為瘀熱在裏。身必發

黃。茵陳湯主之。本草茵陳主熱結黃疸。

傷寒七八日。身黃如橘子色。

小便不利。腹微滿者。陽明茵陳湯主之。

陳湯主之。

利不用二苓者何。本論云陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利小便故也須知陽明汗出多而渴者不可用則汗不出而渴者津液先虛更不可用明矣此主以推陳致新之茵陳佐以屈曲下行之梔子不用枳朴以承氣與芒硝之峻利則大黃但能潤腸泄熱緩緩而行故必一宿而腹始減黃從小便去而不由大腸去仲景立法之奇匪彝所思耳

茵陳蒿氣味苦平微寒無毒主治風溼寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐



北京中醫藥大學圖書館版權所有

老面白悅長年。白兔食之仙。

麻黃連軀赤小豆湯歌

黃病姜翹二兩麻一升赤豆梓皮誇棗須十二能通竅四十杏仁二草嘉按梔子藥皮湯治溼熱已發於外止有身黃發熱而無內瘀之證此治瘀熱在裏迫其溼氣外蒸而為黃也麻黃能通洩陽氣於至陰之下以發之加連翹梓皮之苦寒以清火赤豆利水以導溼杏仁利肺氣而達諸藥之氣於皮毛姜棗調營衛以行諸藥之氣於肌腠甘草奠安太陰俾病氣合

麻黃連軀赤小豆湯 六

麻黃

二兩去節

連軀

二兩

赤小豆

十四

一升

生梓白皮

一升

杏仁

十四

枚

甘草

二兩

生姜

二兩

大棗

十二枚

右八味以潦一斗

無根之水

先煮麻黃再沸去上沫內諸

藥煮取三升去滓分溫三服

半日服盡

連軀即連翹根氣味相近今人不採

卷四

八

