



名醫彙粹

三省居曹



古今名醫彙粹卷之六目錄

病能集四

諸失血

張三錫八則
喻嘉言一則

滑栢仁一則
繆仲醇一則

薛立齋二則
戴元禮二則

趙羽皇一則
柯韻伯一則

心諸痛

張三錫一則
朱丹溪一則

原病式一則
李東垣一則

聲瘖論

張景岳

狂癲證

治法綱

諸積聚

準純一則
方約之一則

朱丹溪一則
治法綱一則

子和一則

諸疝

張三錫九則

諸痛

李士材七則
張景岳五則

方約之一則
王節齋二則

朱丹溪二則

喻嘉言一則

腰脇痛

治法綱二則
張景岳一則

何栢齋一則
朱丹溪一則

頭痛眩暈

士材一則
丹溪三則

立齋一則
三錫一則

海藏一則
院使二則

節齋一則
景岳一則

二便

士材二則
丹溪一則

養葵二則
立齋三則

小便

節齋一則
元使一則

約之一則
景岳二則

羽皇一則

諸夫血

諸三

漢書集四



古今名醫彙粹卷之六

新安羅美東逸父選輯

古虞席世臣郢客氏詳校

諸血證

張三錫曰。營血之行。各有常道。爲火所迫。則錯亂沸騰。而諸失血之證作矣。有如火急湯沸。勢不可遏。丹溪之論曰。口鼻出血。皆是陽盛陰虛。有升無降。血隨氣上。越出上竅。法當補陰抑陽。氣降則血歸經矣。是論血症三昧語。蓋陽明之脈絡鼻是。經火盛迫血妄行。從鼻出者曰衄。從口湧出者曰吐。初起脈洪大。宜



北京中醫藥大學圖書館版權所有

犀角地黄湯。犀角性升散。能散一切有餘之火。乃陽
明經藥。故曰如無犀角。以升麻代之。今人不知。泥於
或益桑。考極。肝

犀角。地黃湯。犀角性升散。能散一切有餘之火。乃陽
明經藥。故曰如無犀角。以升麻代之。今人不知。泥於
犀角解乎心熱一句。不分虛實。與四物同用。若是實
火。固為得宜。陰虛者。寧免飛揚之禍。吐血。心口脹滿。口中血腥氣。用韭汁。童便。薑汁。鬱金
同飲。其血自清。勢盛脈大。吐用十灰散。遏之。次用
花蕊石散。消之。後用清血藥。鬱金丹。皮赤芍之類。加
降火。有因怒而得者。宜平肝降火。炒梔子。青皮。芩連
柴胡。一切上焦血症。用五生飲。大獲奇驗。用生韭藕
荷葉。亦可。京墨。側柏。生地。各取汁一杯。對童便。其生

脾胃氣壯不瀉能食者皆當以大黃醋製和生地并

及桃仁泥牡丹皮之屬引入血分使血下行轉逆為

順也最妙法不知此而徒事涼藥脾胃反傷今人治

此無一生者此也諸失血後倦怠昏憤面失血懶於

言動濃煎人參湯所謂血脫補氣也最妙先惡心血

雜痰出嘔多至升許者爲嘔血有怒而得者有過飲

得者鬱悒人久之氣血凝滯中焦運化失常亦作嘔

痰帶血出宜分治之若肝脈旺兩手弦數宜平肝降

火連梔青皮香附柴胡甘草歸芍或用赤茯苓心湯

平肝降火
以連 欒
青皮 香附
桑白 枳殼
白朮 蘇子
赤芍 海溫

越鞠丸

獲亨 愈氣 胃 脾 子
非 如 在 氣 極 如 此 也
砂 以 其

脈 細 數 多 或 勞 宜
只 知 少 多 為
天 冬 麥 冬 為
生 地 丹 皮 竹 瀝
童 便 薑 汁

是實者瀉其子也若右寸脈洪滑或數解酒毒降火
和中二陳加芩連梔丹皮若沈結或洪數宜舒鬱越
鞠丸去蒼朮加丹皮赤芍歸尾主之加韭汁亦妙
脾統血肺主氣勞神多言脾肺致傷血妄行忌涼劑
必用補中益氣湯加減遇勞即發心肺受傷其血必
散補中益氣加麥冬五味山藥熟地茯神遠志佳
瘀血熱壅于肺者易治損於肺者難治瘦人有此脈
細數多成勞宜二母二冬紫苑花粉生地丹皮竹瀝
童便薑汁選用一方服藥血不止是肺上有竅也用
白芨末豬肺煮熟蘸食日三四次妙不可言昔人為

白芨下咽至血竅則竅爲填而血止詳見本草綱目

一法取末於粥中吃妙勞傷肺經欬嗽有血雞蘇散
最妙功在阿膠炒蒲黃勞嗽服阿膠不止無藥用矣
欬血非靜養絕慾不可與治諸病皆然此尤當慎者
欬血胸中痛腥臭異常肺脈數而虛是肺痿諸失血
過多體倦少食及血不止扶正氣爲急人參黃芪五
味子芍藥麥冬甘草歸身加鬱金亦可

唾血平時津唾中有血一屬腎虛有熱一屬上焦實
火有餘則瀉加減涼膈加牡丹皮藕節之類不足則
補滋腎坎離酒炒黃蘗肉桂一分許瀉腎火或加二

涼膈散

朴硝生軍梔子

連翹黃芩甘草

薄荷竹葉生薑

冬二母

咯血不嗽而欬出血也咯同於痰氣鬱于喉嚨之平
滯不得出咯而乃出求其所屬咯唾同出于腎也咯
血爲病最重以肺手太陰之經氣多血少又肺爲清
肅之臟爲火所燥迫血上行以爲咯血逆之甚矣上
氣見血下聞病音謂喘而見血且欬嗽也爲難治初
起用童便青黛以瀉手足少陽三焦膽經之相火而
薑汁爲佐用地黃牛膝輩以補陰安其血如喉中咯
出小血塊或牛膝膏地黃膏尤妙上焦一切血症稍
止卽服六味丸最不可緩有血症者終身不可脫

滑伯仁曰失血家須用下劑破血蓋施之於妄蓄之
初亡血虛家不可下蓋戒於亡失之後
朱丹溪曰凡血症既久古人多以胃藥收功
喻嘉言曰血證有新久微甚本無不由於火然火有
陰陽不同治法因之迥遠今有暴病嘔血數盃經曰
暴病非陽則其爲火也卽非陽火甚明陽火者五行
之火天地閒經常可久之物何暴之有惟夫龍雷之
火潛伏陰中方其未動不知其爲火也及其一發暴
不可禦以故載陰血而上溢蓋龍雷之性必陰雲四
合然後遂其升騰之勢若天青日朗則退藏不動矣



故凡用涼血清火之藥者皆以水制火之常法施之於陰火未有不轉助其虐者大法惟宜溫補而溫補之微細曲折要在講明有素經曰少陰之脈營舌本又曰咯血者屬腎明乎陰火發于陰中其血咯之成塊而出不比咳嗽勞症痰中帶血爲陽火也此義惟張長沙傷寒症中垂戒一款云誤發少陰汗動其經血者下竭上厥爲難治後人于下竭上厥之理總之弗省不知下竭者陰血竭于下也上厥者陰氣逆於上也故陰火動而陰氣不得不上奔陰氣上奔而陰血不得不從上溢陰血上溢則下竭矣血既上溢其

隨血之氣散於胸中不能復返本位則上厥矣陰氣
上逆不過至頸而止不能越高巔清陽之位是以喉
閒窒塞心沖耳鳴胸膈不舒也然陰氣久居於上勢
必龍雷之火應之於下血不盡竭不止也氣不盡厥
不止也仲景斷爲難治其以是乎吾將闢其局則以
健脾中之陽氣爲第一義健脾之陽有三善一者脾
中之陽氣旺如青天日朗而龍雷潛伏也一者脾中
之陽氣旺而胸中窒塞之陰氣如太空不畱纖翳也
一者脾中之陽氣旺而飲食運化精微復生其下竭
之血也況乎地氣必先蒸土爲濕然後上升爲雲若

土燥而不濕地氣於中隔絕矣天氣不常清乎今方
書皆治陽火之法至龍雷之火徒有其名而無其治
反妄引久嗽成癆痰中帶血之陽症不敢用健脾增
嗽爲例不思咯血之嗽不過氣逆上厥氣下則不嗽
矣古方治龍雷之火用桂附然施於暴血之症可暫
不可常蓋已虧之血恐不能制其悍而未動之血恐
不可滋之擾況此症以勞房憂恐傷精傷腎又肝惟
疏泄是以少陰之氣當藏不藏而少陰之血無端溢
出與仲景所謂誤發少陰汗動其血者無少異矣究
而論治龍雷之火全以收藏爲主以秋冬則龍雷潛

伏也故治法惟以崇土爲先土厚則陰濁不升而血
患自息矣

繆仲醇曰吐血有三要宜降氣不宜降火氣有餘卽
是火氣降則火降血隨氣行無溢出上竅之患矣降
火必用寒涼之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血
血愈不能歸經矣今之療吐血者大患有二一則專
用寒涼往往傷脾作泄以致不救一則專用人參肺
熱傷肺欬逆愈甚亦有用參而愈者此是氣虛喘嗽
不由陰火致然宜以白芍炙草制肝枇杷葉麥冬薄
荷橘紅貝母清肺苡仁山藥養脾番降香蘇子下氣

青蒿鱉甲銀柴胡丹皮地骨皮補陰清熱酸棗仁茯
神養心山萸枸杞子牛膝補腎此累試輒驗之方然
陰無驟補之法非多服不效宜行血不宜止血血不
循經絡者氣逆上壅也血得熱則行得寒則凝故降
氣行血則血循經絡矣若血凝必發熱及胸脇痛病
日沈痼耳宜補肝不宜伐肝經曰五臟者藏精氣而
不瀉者也肝主藏血吐者肝失其職也養肝則肝氣
平而血有所歸伐之則肝不能藏血血愈不止矣

薛立齋曰血症多屬形病俱虛治者當求其屬而主
之若鬱熱傷肺而衄者用黃芪益氣湯肺氣虛熱不

能攝血而衄者用四君加芎歸五味鬱結傷脾而欬
吐血者用歸脾湯胃經有熱而欬吐血者用犀角地
黃湯胃氣弱而欬吐血者用四君子加川芎當歸升
麻腎經虛熱陰火內動而咯吐血者用六味丸補中
益氣湯怒動肝火而見血者用逍遙散雖曰血得熱
而錯經妄行亦有衛氣虛不能統攝營血而爲妄行
者不可不察臨症審諸

又曰勞嗽見血亦有勞傷元氣內火妄動而傷肺者
亦有勞傷腎水陰火上炎而傷肺者有因過服天冬
生地寒藥損傷脾胃不能生肺氣而不愈者有因誤

用黃蘗知母之類損傷陽氣不能生陰精而不愈者
凡此脾肺虧損而腎水不足以致虛火上炎眞臟爲
患也須用補中益氣湯補脾上而生肺金用六味
滋腎水而生陰精否則不救

戴元禮曰牙宣有二證有風壅牙宣有腎虛牙宣風
壅者消風散擦仍服腎虛者以腎主骨牙者骨之餘
虛而上炎故宜服涼劑而愈甚者此屬腎下虛上盛
宜鹽湯下安腎丸閒黑錫丹仍用薑鹽炒香附黑色
爲抹揩擦妙
鼻衄鼻通于腦血上溢于腦所以從鼻而出有頭風

