

婦人

小兒

痘疹

景岳全書

卷之三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

景岳全書卷之六十一長集

婦人規古方

命稽 張介賓 曾御舊

西園 黃廷瑞 吳氏訂

婦人

安胎飲

治妊娠五七個月用數服可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草

紫蘇

炙黃芩 各一錢

古用薑水煎服一方有砂仁



南京中醫藥大學圖書館版權所有

安胎散二

治妊娠卒然腰痛下血

熟地

艾葉

白芍

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草

地榆 各一錢

右加薑棗水煎服

泰山磐石散三

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血絀

或脾肝素虛倦怠少食盛看墮胎之患此方平和兼養脾胃

氣血實有熱者后黃芩少用砂仁寬胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒忿事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮

東皇曰婦人凡懷胎三三個月慣要墮落名曰小產此由



北京中醫藥大學圖書館版權所有

弱氣血兩虛在胎火多血分受熱以致然也醫家大謂安胎
多用艾附砂仁熱補元增禍患而速其墮免殊不知血氣清
和無火煎燥則胎自安而回氣虛則提不住血熱則益安行
欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快
脾氣多用亦耗真氣況香燥之性氣血兩傷求以安胎適又
損胎而反墮也今惟泰山磐石散千金保孕丸二方能養化
工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子
共知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩 各一錢

白芍藥

熟地 各八分



白米二錢

炙甘草

砂仁 各五分 糯米一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

地黃當歸湯

一名內補丸○治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟地二兩

當歸一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗爲

和丸桐子大每服百餘丸溫酒或一湯下○許學士曰大率

妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最忌陰陽雜亂致生他病惟

枳殼湯所以抑陽助陰所以助陰耳然枳殼湯其味多寒

粘單服恐致胎二腹痛更以內補丸助之則陽不致強陰不

致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

方良當歸湯

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參各二三錢阿膠炒

甘草炒各一

連根葱白一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

方良阿膠散六或頓小或因黃藥胎動不安或脇痛腹痛上金

阿膠

艾葉

當歸

熟地

可芎

白芍

黃芪

炙甘草等分

右每服四錢薑棗水煎

方良膠艾湯

治妊娠頓小胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或



去血腹痛●又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠炒一兩艾葉數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散治胎動腹痛

阿膠炒

白茯苓 白朮炒 川芎

當歸 陳皮各一錢 甘草炒三分

石薑朮水煎服

黃芩湯治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合 黃芩炒 川芎各二兩

右末前分三服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

良鉤藤湯十一

治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

鉤藤鉤

當歸

茯神

桑寄生

人參

各一錢

苦梗

一錢半

右水煎服○如身煩熱加石膏

良白朮散十一

治妊娠傷寒內熱等證

白朮

黃芩

炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良三味白朮湯十二

治壬辰內熱心痛

白朮

四錢

赤芍藥

三錢

黃芩

炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉



南京中醫藥大學圖書館版權所有

良方四味白米湯

治妊婦胃虛惡阻吐水甚至十

餘日禁

白米

炒一錢

人參五分

甘草炒

丁香

各二分

右薑水煎服

全生白朮散

十四

治妊婦面目虛浮四肢腫如水氣

名曰

白朮

一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓

各半兩

右為末每服二錢米飲下○如未應任以人參甘草

探胎飲

十五

婦人經水不來三月疑似周此驗之

川芎

不拘多少為末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

乃血瘀也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯十六 治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈

當歸

白芍藥炒

白朮炒

茯苓

澤瀉各一錢 川芎二錢

右水煎服

益母地黃湯十七

治妊娠跌墜腹痛下血

生地

益母草各二錢 當歸

黃芪炒各二錢

右薑水煎服

良獨聖散十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒 勿令焦黑取仁為末



南京中醫藥大學圖書館藏

右用熱酒調服四五分或一錢○此物有安胎導滯易產之
功實妊婦之要藥也

煇安胎寄生湯十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹疼痛

桑寄生

白朮

茯苓 各五分 甘草 一錢

右水煎服

二黃散二十

治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩燥

作渴或脇肋脹痛等證

生地

熟地

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散二一

治漏胎下血



條芩

白朮

砂仁

阿膠各等分

右為細末每服二錢文湯調下○一方有芍藥無阿膠○

此方若改為湯砂仁用當減半

根續斷湯二二

治妊娠下血尿血

當歸

生地黃

各二兩

續斷

赤芍藥各半斤

為末每服二錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯二三

治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治

枳殼炒

黃芩

各二兩

白朮

炒一兩

右為末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用

補中益氣湯加五味○若因脾胃虛弱宜用前湯倍加升麻



柴胡○若因埔熱內熱宜用逍遙散

滑胎松殼散二四

此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產要

日不下南山道人進此方

粉草炒一兩 商州松殼 麩炒二兩

右爲末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之

○溫降居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

和殼散二五 方在案陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯二六 治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不

利或胎死腹中皆效



當歸

芍藥

各一錢 白朮一錢

茯苓

一錢半

橘紅 五分

鯉魚

一尾 不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臍白水煮熟去魚用汁鍾半入藥加生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯

治妊娠心驚肚怯煩悶不安名曰子煩

有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃芩

各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘇飲

治妊娠失調胎氣不安上病作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘇葉

當歸各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾

氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜

用四君芎歸

安樂散

治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋甚妙

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

等分



右水煎服○一方人參細辛加倍為末每服二錢麥冬湯調

服○若因肺經移熱宜用黃芩清肺飲○若因膏梁痺味宜

用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤

洗淨香附炒

陳皮

甘草

烏藥等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘇三葉水煎食前日

進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下

陷須用補中益氣湯

羚羊角散三一

治妊娠虛風頸項強直筋脈攣急語言塞滯



痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角鎊 川獨活 藜仁 五加皮

蕙苡仁炒 防風 當歸 川芎

茯神 杏仁各五分 炙甘草 木香各五分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱就怒火所致須用切

人參橘皮湯三二 治妊娠脾胃虛弱氣瀰急阻嘔吐痰水

食少進益胃和中○一名參橘散

人參 陳皮 麥門冬 白朮名一錢

厚朴製 白茯苓各等 炙甘草三分

右加淡竹茹一埋薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳

