

柯韻伯

傷寒附翼

上



第

古吳葉天士批評

本二善

傷寒附翼

姑蘇原板



傷寒附翼卷之上

慈谿 柯琴 韻伯編

崑山 馬中驥
驥北較

太陽方總論

太陽主表故立方以發表爲主而發表中更兼治裏故種種不同麻黃湯於發表中_扶呼氣桂枝湯於發表中滋陰乾葛湯於發表中生津大古龍湯與麻杏甘膏湯麻翹赤豆湯於發表中清火小青龍湯與五芩散於發表中利水清火中復有輕重利小中各有淺深也若白虎



之清火，十棗之利水，又解表。復之證治其陷胸瀉心紙。
當調胃四逆真武等劑，又隨症救逆之法矣。夫抵太陽
之表，不離桂枝麻黃二湯加減，以心爲太陽之裏也。今
將諸方詳論，表章仲景治法，令後人放胆用之，則麻黃
湯治傷寒而不治中風，桂枝湯治中風而不治傷寒等
說，其可少息乎。

桂枝湯

桂枝

芍藥

甘草

生姜

大棗

此爲仲景羣方之魁，乃滋陰和陽、調和營衛、解肌發汗之總方也。凡頭痛發熱、惡風、惡寒、其脈浮而弱、汗自出者，不拘何經，不論中風傷寒、雜病，咸得用此發汗。若表汗妄下而表不解者，仍當用此解肌。如所言頭痛發熱、惡寒、惡風、鼻鳴、乾嘔等病，但見一症，卽是不必悉具，惟以脈弱自汗爲主耳。桂枝赤色通心溫經，能扶陽散寒，甘能益氣生血，辛能解散外邪，內輔君主發心液而爲汗，故麻黃、乾葛、青龍輩，凡發汗、禦寒者，咸用之。惟桂枝湯不可用，麻黃、麻黃湯不可無桂枝也。本方皆辛甘發

散唯芍藥微苦微寒能益陰微血內和營氣先輩之無
汗不得用桂枝湯者以芍藥能止汗也芍藥之功本在
止煩煩止汗亦止故反煩更煩與心悸而煩者感賴之
若倍加芍藥卽建中之劑非復發汗之劑矣是方也用
桂枝發汗卽用芍藥止汗生姜之辛佐桂以解肌大棗
之甘佐芍以和裏桂芍之相須姜棗之相得陰陽表裏
並行而不悖是剛柔相濟以為和也甘草甘平有安內
攘外之功用以調和氣血者卽以調和表裏且以調和
諸藥矣而精義尤在啜稀熱粥以助藥力蓋穀氣內充
外泄勿復入熱粥以繼藥之後則餘邪勿復留複方之
邪

妙用又如此故曰之發汗用不至於亡陽用之止汗自
不至於貽患今人凡遇發熱不論虛實悉忌穀味利桂
枝方者俱削此法是豈知仲景之心法乎要知此方專
治表虛但能解肌以發營中之汗不能開皮毛之痏以
出衛分之邪故汗不出者是麻黃症脈浮緊者是麻黃
脉卽不得與桂枝湯矣然初起無汗當用麻黃發汗如
汗後復煩卽脈浮數者不得再與麻黃而更用桂枝如
汗後不解與下後脉仍浮氣上冲或下利止而身痛不
休者皆當用此解外蓋此時表雖不解腠理已疏邪不
在皮毛而在肌肉故脉證雖同麻黃而主治當屬桂枝

也粗工妄謂桂枝湯專治中風一證卽定後人耳目而所稱中風者又與此方不合故置之不用愚常以此湯治自汗盜汗虛瘧虛痢隨手而愈因知仲景方可通治百病與後人分門證類使無下于處者可同年而語明



麻黃湯

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

定喘
作狀

治風寒在表。頭痛項強。發熱身痛。腰痛。骨節煩疼。惡風惡寒。無汗。胸滿而喘。其脉浮緊浮數者。此爲開表逐邪。發汗之峻劑也。古人用藥用法象之義。麻黃中空外直。宛如毛竅骨節。故能去骨節之風寒。從毛竅而出。爲衛分發散風寒之品。桂枝之條縱橫。宛如經脈系統。能入心化液。通經絡而出汗。爲營分散解風寒之品。杏仁爲心果。溫能助心散寒。苦能清肺下氣。爲上焦逐邪定喘之品。甘草甘平。外拒風寒。內和氣血。爲中宮安內攘外之品。此湯入胃。行氣於玄府。輸精於皮毛。斯毛脉合精。

而滌滌汗出。在表之邪。其盡去而不留。痛止喘平。其解也。不煩啜粥而藉汗於穀也。其不用薑棗者。以生薑之性。橫散解肌。礙麻黃之上升。大棗之性滯泥於膈。礙杏仁之速降。此欲急於直達。稍緩則不迅。橫散則不峻矣。若脉浮弱。汗自出者。或尺脉微遲者。是桂枝所主。非此方所宜。蓋此乃純陽之劑。過於發散。如單刀直入之將。投之恰當。一戰成功。不當則不戢而召禍。故用之發表。可一而不可再。如汗後不解。便當以桂枝湯代之。若汗出不透邪。氣留連於皮毛骨肉之間。必有麻桂合半。與桂枝二麻黃一之妙用。若陽盛於內而無汗者。又有

麻黃杏仁石膏連翹赤小豆等劑。此皆仲景心法也。治冷風哮，與風寒溼三氣成癰等證，用此輒效。非傷一證可拘也。○按麻桂二方治傷寒中風者，遇當用而不敢用。註疏傷寒家於不當用者妄言其當用，如太陽動血證宜桂枝湯句，語意在當須發汗下。麻黃主之句，在當發其汗下二句，皆於結句補出，是倒序法也。仲景於論證時細明其所以然，未及於方故耳。夫桂枝乃行血之品，仲景用桂枝發汗，不是用桂枝止衄，是用在未衄時，非用在已衄後。且奪血者無汗，此理甚明。麻黃乃上升之品，夫既云衄乃解，又云自衄者愈，若復用升提

之藥。衄流不止可必矣。且衄家不可發汗。此禁甚明。又如小青龍主之句。詣意在服湯已上。豈有寒去欲解反用燥熱之劑。重亡津液。令渴不解乎。且云。服藥已服湯已者。是何藥何湯耶。觀仲景於所服藥不合法者。必明斥之。如所云。服瀉心湯。復以他藥下之。利不止。又云。知醫以他藥下之。非其治也。粗工不知倒序等法。又瀉於風寒二字。而曰是雖熱甚。邪由在經。以麻黃治衄。是發散經中邪氣耳。請問邪氣寒乎。熱乎。若寒邪則血凝不流。焉得有衄。若熱邪則清降不遑。而敢升發耶。且云。點滴不成流者。必用服藥。若成流不止。將何法以善其。

後乎。此悞天下蒼生之最盛者。余因表而出之。



南京中医药大学图书馆版权所有

卷十



十一
社

葛根湯

葛根
姜棗

麻黃
桂枝

白芍

甘草

沿頭項強痛。背亦強牽引。凡然脈浮無汗惡寒。兼風寒在表而自利者。此開表逐邪之輕劑也。其證身不疼。腰不痛。骨節不痛。是骨不受寒矣。頭項強痛。下連背。牽引不寧。是筋傷於風矣。不喘。不煩燥。不乾呞。是無內症。無汗而惡風。病只在表。若表病而兼下利。是表實裏虛矣。比麻黃青龍之劑較輕。然凡凡更甚於頸強。而無汗不失爲表實。脉浮不緊數。是中於鼓動之陽風。故以桂枝湯爲主。而加麻葛以攻其表實也。葛根味甘氣涼。能起陰氣而生津液。滋筋脈而舒其牽引。故以爲君。

麻黃生葛能開玄府腠理之閉塞祛風而出汗故以
臣寒熱俱輕故少佐桂芍同甘棗以和裏此於麻桂一
方之間衡其輕重而爲調和表裏之劑也故用之以
表實而外邪自解不必治裏虛而下利自瘳與大青龍
治表裏俱實者異矣要知葛根秉性輕清賦體厚重輕
可去實重可鎮動厚可固裏一物而三美備然惟表實
裏虛者宜之胃家實者非所宜也故仲景於陽明經中
不用葛根東垣用藥分經不列於太陽而列於陽明易
老云未入陽明者不可服皆未知此義喻氏謂仲景不
用於陽明恐亡津液與本草生津之說左亦謂能開肌



肉。又與仲景治汙出惡風。桂枝湯中加葛根者。左矣。察
桂枝葛根俱是解肌和裏之劑。故有汙無汙下利不利。
皆可用。與麻黃專於治表者不同。麻黃葛根俱有沫。
沫者濁氣也。故仲景皆以水煮去其沫。而後入諸藥。此
取其清揚發腠理之義。○桂枝湯啜稀粥者。因無麻黃
之開。而有芍藥之斂。恐邪有不盡。故假穀氣以逐之。此
汙生於穀也。