

犀角升麻湯 治風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角 鎊貳錢

升麻

防風

羌活

川芎

白芷

各伍分

黃芩

甘草

各壹錢

白附子

肆分

右每服三五錢水煎

梔子仁湯

治時毒腫痛大便秘結

鬱金

枳殼

淨炒

升麻

山梔仁

牛蒡子

研碎炒

大黃

炒各等分

右為細末每服二三錢蜜水調服

葛根牛蒡子湯

治時毒腫痛消毒解熱

葛根

管仲

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半生半炒研碎各等分

右每服三五錢水煎

流注

薛

小兒流注乃氣流而滯血注而凝元氣不足

之證也或因閃跌墮傷或因肝火氣逆或因六淫內
侵或因脾虛食積或因稟賦所致結於四肢節髀患
於胸腹腰臀或結塊或漫腫或作痛悉用葱熨之法
須固元氣為主閃跌者和血定痛九肝火者九味蘆
薈丸食積者四味肥兒丸藥能對證未成自消已成
自潰若膿成不潰者元氣虛也先補而針之庶使毒

氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出而反痛者氣血
虛也用八珍湯作嘔少食者胃氣虛也用四君子湯
欲嘔不食或腹作脹者脾氣虛也用六君子湯口噤
搖搦者氣血虛極而變症也十全大補湯內熱晡熱
陰血虛也四物參芪白朮表熱惡寒陽氣虛也十全
大補湯熱來復去或晝見夜伏晝伏夜發者虛熱也
當大補元氣若色赤腫起而膿稠者尚可治不赤硬
而膿清或脉洪大寒熱發渴及不受補者皆不可治
健脾滲濕飲 治瘡瘍初起焮腫作痛或濕毒下注
或環跳穴痛

人參

白朮

蒼朮

防已

酒拌

黃蘗

炒

川芎

陳皮

當歸

茯苓

各伍分

木瓜

不犯鐵器

柴胡稍

甘艸

各叁分

右薑水煎服如三五劑不退加桂少許酒煎亦可

小便澀加牛膝身痛加羌活

和血定痛丸

一名黑丸子

治流注膝風或閃跌瘀血肢

節腫痛服之自消若潰而發熱與補藥兼服自効

百草霜

伍兩

赤小豆

半斤

川烏

炮壹兩 伍錢

白欬

捌兩

白芨

南星

炮各貳兩

芍藥

當歸

牛膝

骨碎補

肆兩

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸白湯下

神効蔥熨法治流注結核或骨癰鶴膝等證先用隔蒜灸若餘腫尚存用此熨之以助氣行血散其壅滯功效甚速又治跌撲損傷止痛散血消腫之良法也其法用蔥細切搗爛炒熱頻熨患處冷則易之如鶴膝風兼服大防風湯而愈

隔蒜灸法治流注及癰疽鶴膝風等證每日灸三三十壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而

散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法有回生之
功其法用大蒜去皮切三文錢厚安患處用艾壯
於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成卽消已成者亦
殺其毒如瘡大用蒜杵爛攤患處將艾鋪上燒之
蒜敗再易如不痛或作膿或不起發及瘡屬陰證
者尤當多灸凡瘡不痛不作膿不起發者皆氣血
虛也多主不治惟患在頭面者不宜多灸論中嬰
兒灸法見疔瘡

如聖餅 治流注及一切瘡瘍不能消散或潰而不

乳香

沒藥

木香

血竭

當歸

各等分

麝香

減半

右為末用酒糊和餅二箇乘熱熨之毒瘡加蟾酥

當歸補血湯

治流注及潰瘍肌熱面赤煩渴脉洪

大而虛重按全無此血虛證也誤服白虎湯必死

方見
虛熱

益氣養榮湯

治流注氣血虛弱不能消散或四肢

頸項患腫不問堅軟赤白或痛或不痛日晡發熱

或潰而不斂

方見後

十全大補湯

治諸瘡血氣虛弱不能消散潰腐收

歛或寒熱汗出口眼歪斜肌瘦少食或日晡發熱

自汗盜汗或朝寒暮熱瘡口不歛等證

方見自汗

大經

薛手指頭生瘡俗名天蛇毒然五指各有經

絡拇指屬手太陰肺經食指屬手陽明大腸經中指

屬手厥陰心包絡經無名指屬手少陽三焦經小指

屬手少陰心經亦有患於足者足趺屬肝膽胃三經

大指屬肝脾二經次指屬膽經小指屬膀胱經各當

隨經而治其致患之由或因胃中積熱所發或因乳

母膏粱厚味所致或因濕熱下流或因風毒外中大

率多由所稟足三陰之經虛故邪得以入之也其初

患腫痛者先用仙方活命飲次用托裏消毒散元氣
下陷重墜作痛久而不潰者用補中益氣湯若服敗
毒散及敷寒涼之劑則瘡口變黑或努肉突出或指
皆黑大抵手足爲氣血難到之處手屬於胃足屬於
脾不可損其真氣丹溪以醫居僻位尚言氣血罕到
況肢末乎故寒涼尅伐之藥所宜深戒者也

天泡瘡

薛天泡瘡狀如水泡屬肺胃二經風熱若發

熱熅痛邪在表也用人參敗毒散發熱咳嗽邪在肺
也用加味瀉白散熱渴便秘邪在內也用加味清涼
飲此肌膚之證當去毒水以金黃散或黃檗蚯蚓敷

之當歸膏亦善既安不必服藥若因攻伐過度元氣
虛而變生別證者當參各門治之

柴芍參苓散 治肝膽經分患天泡等瘡或熱毒瘰
癧之類

柴胡

芍藥

人參

白朮

茯苓

陳皮

當歸

牡丹皮

山梔

甘草

各參分

右每服二錢水煎服

加味解毒飲

治天泡瘡發熱作痛

玄參

連翹

升麻

芍藥

當歸

羌活

生地黄

牛蒡子

炒各三錢

茯苓

甘草

各貳錢

金銀花

漏蘆

各五錢

右每服一二錢水煎服或為末蜜丸亦可

金黃散 治天泡瘡消毒止痛

滑石

甘草

右各另為末和勻傳患處如泡挑去水傳之加黃

檠尤好

楊梅瘡

薛楊梅瘡乃天行時毒亦有傳染而患之或

稟賦所得者受證在肝故多起於下部治失其宜多

致蝕傷眼目腐敗腎莖拳攣肢節初起之時上體多

者先用荆防敗毒散下體多者先用龍膽瀉肝湯大便秘者用大連翹飲後用換肌消毒散若蝕傷眼目兼用九味蘆薈丸六味地黄丸肢節拳攣兼用蠲痺解毒湯若因脾胃虧損而不能愈者先用異功散後用換肌消毒散若用輕粉之藥多致敗證也 按楊梅瘡起於近代多姪夫御不潔之婦傳染而致者其在小兒得之乳抱傳染者輕得之父母遺體者重治法與大人同更當求之專科薛氏治法未可盡遵用也

換肌消毒散

一名革

治楊梅瘡不拘初患日久並効

土茯苓

自車前

當歸

白芷

甘草

皂角刺

薏苡仁

白蘚皮

木瓜

不犯鐵器
各等分

右水煎食前拜空心服

又方 治大人之劑如用前方未應或兒長大宜用

此方

土茯苓

伍錢

當歸

白芷

皂角刺

炒

薏苡仁

各壹錢

白蘚皮

木瓜

不犯鐵器

木通

金銀花

各柒分

甘草

連翹

防風

各伍分

茯苓

藥

各壹錢

黃芪

炒貳錢

川芎

生地黄

各捌分

右作二三劑水煎出幼者作一劑煎分兩三次服

王爛瘡

聖惠云夫小兒腑臟有熱熱薰皮膚外為濕

氣所乘則變生瘡其熱偏盛者其瘡發勢亦盛初生

麻子須臾王大汁潰爛如湯火所傷灼故名王爛

王爛瘡一身盡如麻子有膿汁乍作痒或

壯熱

赤芍藥

甘草

各叁分

黃芩

黃連

去鬚

黃檗

微炙

右為末蜜水調塗日三兩上差

治小兒王爛瘡及惡瘡

秫米

竹篠

右燒灰細研以田中禾下水調塗之立効

治小兒王爛瘡初患一日肉色變二日鮑漿出或四

畔時赤漸長若鮑漿匝身即不可治其狀如湯火

燒宜速用黃連散

黃連末

胡粉

各壹兩

右研勻以生油調塗之

治小兒王爛瘡初起齔漿似火燒瘡宜用此方 又
桃仁湯浸去皮研細以面脂和塗 又以艾燒灰傳
乾卽用生油塗 又十字街土并釜下土研傳之
又燒牛糞灰傳 又酒煎吳茱萸汁塗 又酥和赤
地末傳

浸淫瘡

治小兒身體發瘡初出甚小後有膿汁浸淫

不已漸大名浸淫瘡若先從四肢起漸向頭面者難
治也

鯽魚

壹尾長
三寸者

豆豉

壹合

右杵如膏塗之又療馬鞍瘡

又方苦瓠蛇蛻燒 露蜂房微炙 梁上塵 爲

末油調塗 又方伏龍肝參分 亂髮參分 爲末猪脂

和塗 又方取雞冠血塗 雞冠血和黄連末塗

煎鯽魚膏塗 生切鯽魚片和鹽貼患處 燒胡燕

窠水和塗之

紅絲瘡有一種紅絲瘡雖非丹疹其毒實同多生於

兩手中指節上男左女右則尤甚也其狀但一水泡

清澄光瑩如小雞頭大其底下濺濺然數十小針孔

不痒不痛都無妨礙泡邊當有一絲脉如紅絲隱隱

在皮裏其行甚速循臂而上過肘則危至心卽死有