

午
9<5

發表

開透

清涼

攻裡
和解

重訂廣溫熱論

一寒庄士

署
因園

辛涼解表
苦寒清裡
甘寒救液

驗方妙用

樊開周同何廉臣實驗法

溫熱病首用辛涼以解表。次用苦寒以清裏。終用甘寒以救液。此治溫熱本症初中末之三法也。然有兼症夾症復症遺症及婦人小兒種種之不同。不得不多備方法以施治。庶免醫家道少之患。茲特分列八法詳言以發明之。

一 發表法

發表

透解

皮肉肌腠

開鬱閉宣氣

凡能發汗、發瘡、發疹、發斑、五發丹、發痧、發瘧、發痘等方皆謂之發表法。溫熱病首貴透解其伏邪而伏邪初發必有著落方著落在皮肉肌腠時非發表則邪無出路故發表法爲治溫熱病之一大法也。其大要不專在乎發汗而在乎開其鬱閉宣其氣血鬱閉在表。

發表法

解。汗。在。表。裏。

芳。淡。生。津。潤。燥。

苦。辛。和。解。

血。凝。絡。瘀。

陰。虛。生。津。潤。燥。

陽。亢。微。水。清。熱。

宣。氣。機。停。滯。通。

發汗

辛涼芳淡以發之鬱閉在半表半裏苦辛和解以發之陽亢者飲水以濟其液陰虛者生津以潤其燥氣滯者宣其氣機血凝者通其絡瘀庶幾有痞者則發痞有疹斑者則發疹斑有瘧者則發瘧有痘者則發痘必察其表無一毫阻滯始爲發表法之完善此溫熱病發表之法大不同於風寒也謹述發表驗方臚舉於左

(甲) 溫熱發汗雖宜辛涼開達而初起欲其發越必須注重辛散佐以輕清庶免涼遏之弊方伏邪傳變出表時輕者亦可得表藥而汗散重者雖大劑麻葛羌防亦無汗但須清其絡熱宣其氣機以治溫熱或開其濕鬱達其膜原以治濕溫必待伏邪盡發表裏全徹然後或戰汗或狂汗而解亦有不用表藥而自汗

麻葛羌防

重表利

清絡熱宣氣

機

自汗。渴熱。帶
蒸而出。此邪活。
非正活。

淋漓。邪終不解者。蓋自汗緣裏熱鬱蒸而出。乃邪汗。非正汗也。
仍宜開達其伏邪。爲要風溫風熱。如邵氏熱鬱湯。(邵步青四
時病機方) 梔豉芩葛湯。(陸久芝不謝方) 之類。濕溫濕熱。如
連樸飲。(孟英霍亂論方) 新定達原飲。(樊開周先師驗方) 之
類。隨症酌用可也。至其發汗諸方。辛涼輕劑。如葛根加葛根湯。
(王叔外臺方) 葛根葱白湯。(和劑局方) 劉氏桔梗湯。(河間
六書方) 加味桔梗湯。(樊先師驗方) 之類。辛涼重劑。如麻杏
石甘湯。(仲景傷寒論方) 千金清肺湯。千金萎蕤湯。(孫思邈
千金方) 葛根橘皮湯。(外臺方) 知母解肌湯。知母乾葛湯。(
朱肱活人書方) 荷杏石甘湯。(葉天士醫案方) 加減三黃石

膏湯。（顧松園醫鏡方）增損三黃石膏湯。（楊玉衡寒溫條辨
方）蔥豉白虎湯。（趙晴初醫案方）之類。此皆辛以散風涼以
泄熱爲治。溫熱內發。風寒外搏之要方。其間有風寒搏束過甚
而溫熱伏邪不能外達者。則蔥豉加葛根麻黃湯。（外臺方）蘇
羌飲。（劉草窗廣嗣全書方）之類亦可暫用。以疏散亦有風寒
遏伏太甚而濕熱伏邪不克外潰者。則藿香正氣散。（和劑局
方）九味羌活湯。（張潔古方）之類。正可暫用以開達。初不必
嫌其辛溫化燥也。其芳淡輕劑如蔥豉湯調天水散。（河間六
書方）茵陳五苓散。（金匱要略方）藿樸夏苓湯。（石芾補醫
原方）藿樸二陳湯。（樊師驗方）之類。芳淡重劑如六神通解

散。(局方)茵陳胃苓湯。(萬密齋幼科發揮方)加味五苓散。加味二陳湯。(石氏醫原方)之類。此皆芳香辟穀辛淡化濕爲治。濕溫濕熱濕重。挾穢之初。方若濕開熱透。熱重於濕者。則宜苦辛開泄。治在上中二焦。不在發表之例。外此又有不求汗而有汗解者。四如裏熱閉甚。用三黃瀉心湯。(長沙傷寒論方)許氏大黃湯。(外臺方)大柴胡合大承氣湯。(河間六書方)之類。以疎通其裏結。一不已而再。再不已而三。直待裏邪逐盡。表裏通徹。多有戰汗而解者。此其一。又如裏熱燥甚。病者思得涼水。久而不得。忽得痛飲。飲盡落枕而汗大出。即解者。此其二。又如平素氣虛。屢用汗藥而不得汗。後加人參於解表藥中。如參蘇飲。

發癆

汗症

人參敗毒散(局方)之類。覆杯即汗者此其三。又如陰虛及腎、血液枯之人。用純表藥全然無汗。後用潤燥生津藥於輕解方中。如七味煎白湯(外臺方)加減萎蕤湯(一名加減煎豉湯)。張氏醫通方之類。而汗出如水者。此其四。謹摘諸汗症列左。發熱。惡寒。無汗。頭項痛。背痛。肩背痛。腰痛。

膝脛痛。周身肢節痛。

(乙)溫熱發癆。每見於夏秋濕溫伏暑之症。春冬風溫兼濕症。亦間有之。初由濕鬱皮腠汗出不徹之故。白如水晶色者多。但當輕宣肺氣開泄。如五葉蘆根湯(薛生白濕熱條辨方)最穩而靈。若久延而傷及氣液。白如枯骨樣者多凶。急用甘潤藥。

發癆

瘡症

以滋氣液。如麥門冬湯。（金匱要略方）清燥救肺湯。（喻嘉言新方）之類。挽回萬一。切忌苦燥溫升。耗氣液而速其斃。謹摘發瘡症如左。

色白點細。形如肌粟。摸之觸手而微癢。抓破微有水狀如水晶珠而明潤者吉。熱勢壯則外見。熱勢緩則隱伏。出無定期。甚至連發三五次。若乾白如枯骨色者大凶。脉必微弱。或細數。神倦氣怯。黏汗自出。

（丙）溫熱發疹。紅點高起與瘡癰一類。係孫絡中血熱之病。惟瘡多發於小兒。痧疹不拘男婦大小皆有。每見於春夏之間。發於風溫風熱者十之七八。溫毒暑熱者十之二三。然亦必夾癰帶

疹。疹雖宜見而不宜多。見身熱二三日而發者輕。四五日而發者重。癰疹雜出者尤重。治雖宜疎風散熱爲先。亦當辨其風與熱孰輕孰重。風重而熱鬱者辛散佐以清透防風解毒湯。（晉三古方選註方）最當熱重而風輕者清透佐以辛散加減銀翹散（石氏醫原方）加減普濟消毒飲（鞠通溫病條辨方）二方爲妙。若溫毒夾癰帶疹色赤如丹甚或紫紅胃經血熱上蒸心包也急宜繆氏竹葉石膏湯（古方選註方）甚則犀角大青湯（邵步青溫病論方）肅清胃熱涼透血絡使癰疹發透則溫毒自解。若因循失治則血熱之毒逆傳心包肝絡而變神昏瘲厥之危證矣。此時急救之法惟有用拔萃犀角地黃湯（溫毒

發疹症

論方) 或犀連承氣湯。(呂震傷寒尋源方) 涼血攻毒急下存陰而已。謹摘發疹證列左。

瑣碎小粒。高出於膚。怕風咳嗽。咽阻喉痛。胸悶心煩。
或氣喘。壯熱無汗。以上風溫發疹之候。

舌絳如朱。夾癥帶疹。疹色紫紅。或深紅。緊束有根。
環口燥裂。大渴引飲。心神煩躁。便秘溺濁。以上溫毒
發疹之候。

(丁) 溫熱發疹。或布於胸腹。或現於四肢。平而成片。與丹一類。發於溫毒病最多。其次大熱病亦恆見之。係經絡血熱之毒竄入肌表而外越。經血熱則色紅。熱毒重則色深紅。熱毒尤重則色。

嬌紅艷如胭脂統名紅斑絡血熱則色紫名曰紫斑絡血熱而
毒瘀則色黑名曰黑癥甚則色青如藍名曰藍斑更有雲頭隱
隱伏而不現於皮膚者曰伏斑內發於腸胃咽喉之間肌膚間
不得而見者曰內斑至若隱隱而微胸腹略見數點而色淡紅
者曰陰斑甚或淡紅似白者曰白斑統名虛斑多發於濕熱大
病後涼瀉太過經脈血涸元氣虛寒之候故凡見斑首要辨明
其形色如斑一出鬚浮洒於皮面起發稀朗紅如硃點紙黑如
墨塗膚此毒之鬚活外現者雖紫黑成片可生若形乾而滯或
枯而晦稠密成片緊束有根如履透針如矢貫的此毒之有根
銬結者縱不紫黑青亦死凡斑皆胃家血熱色紅而鮮潤者順

色紫而晦滯者凶。紫黑藍而枯晦者死。以其胃爛也。故紅斑九生一死。紫斑五死五生。黑斑九死一生。若雜藍斑黑爛者必死。治法紅斑主涼血透熱輕劑如五味解毒飲加紫草連翹。（周澹然溫證指歸方）犀地桑丹湯（吳坤安感症寶筏方）之類。

重劑如加味犀羚白虎湯（樊師驗方）加減犀羚二鮮湯（廉臣驗方）之類。紫斑主涼血解毒如犀角大青湯（邵氏溫毒病論方）小劑清溫敗毒飲（余師愚疫症一得方）增損雙解散（楊玉衡寒溫條辨方）之類。黑斑藍斑主涼血攻毒如拔萃犀角地黃湯加金汁元明粉（溫毒病論方）十全苦寒救補湯。（梁玉瑜舌鑑辨症方）加味涼膈散增損三黃石膏湯加錦紋。

(寒溫條辨方)之類。伏斑、內斑主宣氣涼血解毒透癥。如元參升麻合黑膏。(王肯堂證治類方)犀角大青湯加紫草皂角刺甚則清溫敗毒飲加紫草升麻紫雪之類。陰斑白斑主溫補血氣。如復脈湯。(長沙傷寒論方)人參養榮湯。(證治類方)之類甚則主扶陽。緩血如參附養榮湯。(吳又可溫疫論方)歸芪建中湯。(葉氏醫案方)之類。總之凡見發斑不可專以癍治須察脈之浮沉病之虛實而分別用藥可也。謹摘發斑症如左。

面紅目赤 汗出津津 口燥大渴 热盛胸悶 發癰純紅
深紅胭脂紅不等 若辰口焦燥 舌紫或黃 胸膈煩悶
嘔惡不納 热壯神昏 便秘溺赤 髍體紫癰者重 若神

昏譫語。或不語如尸厥。口開吹氣。臭穢噴人。或咯血。
鼻衄。足冷耳聾。舌苔焦黑起瓣。或見黑暈。偏體黑癰。
或藍癰如翠者死。

以上溫毒及大熱病。發汗不出。或雖汗不解。發癰輕重之候。
表無大熱。脈似沉緩。神識不清。或鄭聲作笑。舌甚灰
黑。或黃苔而中心黑暈。以上伏癰之候。

口燥目赤。手足指冷。煩躁氣急。不欲見火。惡聞人聲。
耳熱面赤。或寒噤噴嚏。昏不知人。譫語帶笑。六脈似
躁非躁。舌紫苔黃。或黃膩帶灰。以上內癰之候。
癰點隱隱而微。色現淡紅。甚或㿠白。手足逆冷。似寐

癰瘍

非寐 神識乍清乍昧 舌胎淡紅或紫 舌形胖嫩圓大

或舌胎白滑 或黑胎胖滑 以上虛癰之候

發丹

脫向熱壯必有
丹癰癰瘍
問解疹瘻
汗透更退

(戊) 溫熱發丹。多見於小兒。俗名赤遊丹是也。與紅癰一類。丹與癰皆出於膚平而成片。皆裏熱。血毒之症。治法惟大劑涼血解毒。乃克勝。任參用發癰諸方可也。至辨法。凡有丹、癰、癰、疹者。脫必悶。四者之齊與不齊。以脫悶之解與未解爲辨。且熱必壯。四者之解與不解。以汗出之透與未透爲辨。

發瘍

(己) 溫熱發瘍。由於風溫者。則爲時瘍。亦名風瘍。俗稱紅斑瘍。病雖傳染而症輕。由於溫毒者。則爲疫瘍。亦名喉瘍。俗稱爛喉瘍。病多傳染而症重。風瘍初起。必須疎達。如荆防敗毒散。(雷少

逸時病論方）連翹敗毒散二方（傷寒指掌方）均加青松針一兩煎湯代水投無不效。卽或宜兼清散總以散字爲重。防風解毒湯加青松針最效。切忌驟用寒涼喉痧初起自須輕散解毒。如加減普濟消毒飲（溫病條辨方）代賑普濟散（鞠通醫案方）二方最當迨表分之痧毒發透內蘊之伏火方張勢輕者清化如陳氏清肺飲奪命飲犀羚二鮮湯（陳繼宣疫痧草方）三方酌用。勢重者寒瀉如陳氏四虎飲（疫痧草方）拔萃犀角地黃湯加金汁元明粉（溫毒病論方）二方酌用方能瀉火泄熱。熱一盡而病自愈。若仍執辛散之方則火得風而愈熾炎勢燎原殺人最暴謹摘發痧症列左。

頭痛怕風。身熱惡寒。痧現無汗。一身筋骨大痛。咽阻。

喉痛而不腐。胸痞心煩。舌苔白膩。以上風痧之候。

始惡寒。後但壯熱煩渴。痧密肌紅宛如錦紋。咽喉疼痛。

或但痛不腫不紅。甚則白腐喉爛。胸痞嘔阻不能食。挾

濕則舌苔滑膩。或渴甚而苔仍白滑。或黃滑而膩。或黃

燥。內陷則舌赤。或鮮絳。神昏譫語。灼熱無汗。痧隱

成片。或厥或瘓。口穢噴人。音啞氣急。鼻煽呃逆者凶。

以上皆喉痧初中末之候。

(庚)溫熱發瘻。與痧一類。吳地曰瘻子。浙江曰瘻子。恆發於小兒。年長亦間有之。由風溫而發者。則爲常瘻。宜散風解熱。爲先。加