

濟陰綱目

卷九

卷十

九

傷食

中惡

傷寒

中風

風

癰癰

子瘡

欬嗽

喘急

瘡疾

泄瀉

痢疾

大便不通

小便不通

子淋

遺尿

尿血

眼目

妊病下胎

防胎自墮

胎墮後為半產

胎不長

鬼胎

十論臨產理法

臨月束胎方

難產催生

治交骨不開

胎死腹中

濟世綱目卷之九

關中

武之望叔卿父輯著

武林

張文嘉仲嘉父訂正

西陵

汪淇愴漪子箋釋

天都

查望于周父叅閱

胎前門下

傷食

大全曰經云飲食自倍。腸胃乃傷。又云陰之所生。本在五味。陰之
五宮。傷在五味。若姪子飲食不節。生冷毒物。恣性食噉。致傷脾胃。
故娠傷食最難得藥。惟木香丸白朮散二方最穩捷。

薛氏曰東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑。多食而不傷。蓋
胃主司納脾主消化五臟之本也。然食倍而傷者乃脾氣虛而不
化也。若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣。當審其所因而調治。

之若飲食停滯或肚腹佳痛用平胃散腹滿泄瀉用六君子湯若脾氣下陷用補中益氣湯凡噯覺藥氣且戒藥餌節飲食經云損其脾者調其飲食適其寒溫大凡脾胃虛弱飲食難化以白朮陳皮爲末等分陳麴糊丸常服最善枳朮丸但可暫用枳實峻厲能耗真氣治者慎之

一妊婦因停食服枳朮丸胸腹不利飲食益少更服消導竟胸之劑其胎下墜余謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊平胃散治妊娠飲食停滯或肚腹作痛

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

薑製

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

右劉加生薑三片棗一枚水煎服

嘔吐惡心加枳殼砂仁

吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分

六君子湯治脾胃虛弱飲食難化或腹泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮

各一錢

右剉加生薑三片棗一枚水煎服

停滯肉食加山楂

停滯麪食倍加麥蘖

停滯糯米食用白酒麴一味

停滯米飲倍加穀蘖

魚腥所傷倍加陳皮

傷辛熱之物加黃連

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應
用四神丸。

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉。

木香 二錢 三稜 人參 白茯苓 各三錢

三稜犯胎忌與人參並用或無妨亦須看人強弱

右為末麪糊丸如棗豆大每服三四十九熟水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一兩 人參 白芷 炒 各七錢半

佐紫蘇白芷調和胃氣妙

川芎 訶子皮 青皮 各半兩 甘草 錢半

右每服二錢加生薑三片水煎服

俗謂絞腸痧即此

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而為精神之主若血氣

溫行惡氣

不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之。妊娠病此亦致損胎也。
薛氏曰：前證當調補正氣爲善。用金銀藤一味煎湯飲之。
當歸散 治妊娠中惡心腹病痛。

當歸

丁香

川芎

各三兩

青橘皮

吳茱萸

半兩去梗湯泡三次炒黑

右爲細末溫酒調下一錢無時

又方

生乾地黄

一兩

枳殼

木香

各七錢半

右爲細末每服一錢酒調下

又方

苦梗

一兩細剉畧炒

生薑

半兩

水煎服之

散滯湯

治觸惡冒氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮

三錢

黃芩

芍藥

各二錢

歸尾

一錢

川芎 一錢

木香 五分

甘草 炙少許

右分二貼水三盞先煮芎根兩大片至二盞去芎根入前藥同煎至一盞熱服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按磨或吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水嚥之吐出即安

一方用竈心土爲末每二錢井水調服白湯亦可

傷寒

吳氏曰凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎爲主凡藥中有犯胎者則不可用也如藿香正氣散十味芎蘇散參蘇飲小柴胡湯

此真中惡也
煮艾方極妙

之類有半夏能犯胎。如用須去之。若痰多嘔逆必用之以半夏麴則可。如無沸湯泡七次去皮。臍生薑自然汁拌晒乾乃可用也。凡川烏附子天雄側子肉桂乾薑大黃芒硝芫花甘遂大戟蜀漆水蛭蠱蟲桃仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之藥。凡用必須斟酌仔細詳之。大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩白朮二味能安胎也。或與此二味煎湯與之。或爲細末白湯調下二三錢亦佳。如妊婦素稟弱者藥中四物湯佐之不可缺也。且如用小柴胡去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也。其効如神。餘皆倣此用之則妙矣。

萬密齋云。妊娠傷寒專以清熱安胎爲主。或汗或下各宜隨其五臟表裏所見脈證主治勿犯胎氣。故在表發汗以香蘇散爲主。半

汗下和三法
固成法也而

主以香薷黃
龍三黃散
三方則發前
人所未發矣
妙甚

兄服安胎雖
是大頭腦然
表証重者須
斟酌

表半裏則和解之以黃龍湯為主。在裏則下之以三黃解毒湯爲主。此吾家傳之秘活人甚多。如古方六合湯雖分治詳明猶不及此切當。古方六合湯自表虛四物湯至四物大黃湯共計十五方詳見第一卷調經門四物湯加減條下。
白朮散 治傷寒熱病先以此安胎。但覺頭痛發熱便可服二三服。卽瘥若四肢厥逆陰證也不可用。

白朮

黃芩

各等分新瓦上炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服。

安胎阿膠散 治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥間服。

阿膠

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

各等分

右爲末每服一錢用糯米飲調下日三服。

香蘇散 凡妊婦傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之。

香附炒黑

紫蘇各二錢

陳皮一錢

甘草五分

右剉加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢名芎芷香蘇散

假令得肝脈其外證善慄面青善怒其三部脈俱浮而弦惡寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽受病也

假令得心脈其外證面赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裏和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脈面黃善噦善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加白朮防己各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏善悲不樂欲哭其尺寸脈俱浮

而瀆惡寒裏和本方加黃芪防風各一錢謂肺主燥是大腸受病也。

假令得腎脉其外證面黑善恐其尺寸脉俱浮而濡惡寒裏和

本方加附子炮一錢謂腎主寒是膀胱經受病也。附子犯胎禁

也可。用吳茱萸溫之

附子雖云犯胎然仲景附子湯亦治胎寒但須真寒方可酌用

羌活湯 河澗云解利傷寒不問何經所受雖不能盡解亦無壞

證尤益妊婦。

羌活 二錢 白朮 一錢半 防風 川芎

白芷 黃芩 甘草 炙各一錢 細辛 三分

右剉水煎服無時。如無汗去白朮用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯 妊婦傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲

黃龍湯即小
柴胡或半夏
爲少陽經藥
而此自重在
和解故主之
其加減法更
妙

小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡二錢

黃芩一錢

人參

甘草

各一錢

右加薑棗水煎服

如寒熱往來無汗口乾加葛根二錢去棗入葱白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢去棗加葱白三根

如發熱有汗口渴加白朮括蘂根各一錢半

如脈浮大有力大熱大渴本方人參白虎湯去薑棗

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢去棗

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各一錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利爲度

三黃解毒湯

姪娠傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼惡寒之

證止煩躁發熱大渴小便赤大便秘或利下赤水六脈沉實此
症邪在裏也宜此方主之

黃芩

黃連

黃蘗

山梔

大黃

各等分

右剉水煎服更隨五臟脈證加減

假令得肝脈其內證煩滿消渴溲便難尺寸脈沉弦有力是肝
經本臟受病也本方加當歸一錢半甘草五分倍山梔

假令得心脈其內證煩躁心痛掌中熱而噦尺寸脈沉數有力
是心經本臟受病也本方加麥門冬一錢竹茹一團倍黃連

假令得脾脈其內證腹脹滿譫妄其脈沉緩有力是脾經本臟
受病也本方加枳實炒厚朴薑汁炒各一錢半倍大黃

既寒逆矣又
主三黃雖加
乾姜恐終未
愛酌之

傷風自汗如
頭疼邪盛者
此方用當歸
的

桂能降胎宜
人服用

假令得肺脈其內證喘咳腦滿尺寸脈沉濇有力是肺經本職

受病也。本方加葶藶炒一錢桔梗五分倍黃蓮

假令得腎脈泄如下重足脛寒而逆尺寸脈沉而石是腎經本

臟受病也。加乾薑炮五分熟地黃一錢半倍黃檗

黃芪解肌湯 治妊娠傷風自汗
人參 黃芪 當歸 川芎 甘草 芍藥

炙各半兩

六錢

右咬咀每服八錢水煎服。加蒼朮生地黃亦可。

桂枝芍藥當歸湯 治婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜此

方。

桂枝 芍藥 當歸

各一兩

右剉細每服一兩水煎服

裏虛者自

芍藥湯 治婦人妊娠傷寒自利腹中痛。食飲不下。脈沉者。太陰病也。宜此方。

芍藥

白朮

茯苓

甘草 各一兩

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯 治妊婦傷寒發汗後汗漏不止。胎氣損者。

當歸身

黃耆 炙

生地黄

黃芩

白芷

阿膠珠

炙甘草 各等分

右用浮小麥一撮煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服。

加味黃芩湯 治妊婦傷寒下後協熱而利不止。胎氣損者。

黃芩 二錢

白芍藥

白朮

白茯苓

炙甘草

阿膠 各一錢

此竹葉石膏湯
麥法也以
阿膠生地易
知母石膏沙
甚

右用水一盞煎一盞後入阿膠再煎八分服

加味竹葉湯

妊婦汗下後熱不除者虛也此方主之

人參

麥門冬

炙甘草

阿膠

生地黄

各一錢

右加竹葉十二片粳米一合煎服

黃龍四物湯

治妊婦傷寒產後發熱者宜此方

柴胡

二錢

黃芩

半錢

人參

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黄

各一錢

右剉水煎服○若因於食者本方加枳實

加減四物湯

治妊婦傷寒熱極發斑狀如錦紋者

當歸

白芍藥

生地黄

黃芩

各等分

右剉每服八錢水煎服

梔子大青湯

治妊婦傷寒發斑變爲黑色。

升麻

黃芩

梔子

各二兩

大青

杏仁

各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎服

一方

治妊娠傷寒發斑忽黑水便如血胎欲落

梔子

升麻

各四兩

青焦

二兩

生地黄

一十七兩

石膏

八兩

葱白

切一升

黃芩

三兩

右用水煎分三服忌熱物○又以井中泥塗心下乾則易

護胎法

治傷寒熱病護胎

用白藥子不拘多少爲末以雞蛋清調攤於紙上如碗大貼

臍下胎存處乾則以濕水潤之

護胎法

治孕婦一切有熱內外諸證

護胎法妙