

唐千金類方

上海千項堂書局發行
嚴如經署



備急千金要方卷第八

傷寒上

後學三水黃恩榮幹南編述

三男

中醫藥學專門畢業
東南醫科大學學士

悌君校對

學生

廣州中醫藥實驗
學館專門畢業

陳景山

覆校

傷寒例第一

辟溫第二

治療霧氣附

傷寒膏第三

發汗散第四

發汗湯第五

發汗丸第六

宜吐第七

宜下第八

發汗吐下後第九

傷寒例第一

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月運行各別終其晷度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人生天地之



間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千
餘謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天
行溫疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補
天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知
撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方
則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治之皆云日滿自瘥以致枉者天
下大半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可
令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採羣經以為上下兩卷廣設備擬
好養生者可得詳焉

小品論傷寒即病與不即病之傳變及尋常時行之各異

小品曰古今相傳稱傷寒為難治之疾時行溫疫是毒病之氣而論治者不判傷寒
與時行溫疫為異氣耳傷寒與時行溫疫同為異氣非尋常感冒具有深識云傷寒是雅士之辭天行溫疫是
田舍間號耳不說病之異同也考之衆經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述
其要經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冽此四時正氣之序也冬時嚴寒
萬類深藏君子周密則不傷於寒或觸冒之者乃為傷寒耳其傷於四時之氣皆能
為病而以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒

毒藏于肌骨中至春變為溫病至夏變為暑病暑病熱極重于溫也是以辛苦之人春夏多溫病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行寒暖不時偶感之氣也凡時行大溫此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此則時行之氣也傷寒之病逐日深淺以施方治括盡仲景六經傳變要旨今世人得傷寒或始不早治或治不主病或日數久淹困乃告師師苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息因逐日傳變制方

乃有效耳

華佗論傷寒病汗吐下所宜

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火炙之即愈若不解者二日在膚可依法針服解肌散詳下發汗散第四發汗汗出即愈若不解至三日在肌復一發汗即愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆丸微吐之則愈若病因藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尚未醒醒者復一法鍼之五日在腹六日入胃乃可下也若熱毒在外未入于胃而先下之者其熱乘虛入胃即爛胃也然熱入胃要須下去之不可留于胃中也亦有未經誤下而胃若實熱為病三死一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者外熱微而內熱盛赤斑出此候五死一生劇者黑斑出此候十死一生但論人有強弱病有難易得效相倍也得病雖無甚大熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人

相主當者勿以火迫之但以猪苓散即五苓散一立方寸七服之當逼與新汲水一升若二升強飲之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也當更以餘藥吐之其吐去水皆令相主不爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散強與吐解之者其死殆速耳但當審其或挾痰或挾飲及有宿食亦可先以去毒物及法針之尤佳惟飲膈實裏熱實而者皆難治此三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出

春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒時宜服神丹丸見下發汗九第六亦可摩膏火炙若春末及夏月始秋此熱月不宜火炙及重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散見下發汗第四雪煎見下發汗第五亦善若無丸散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發汗至再三發汗不解當與湯寶者轉下之如大柴胡中其脉朝夕駢者為澼實也朝平夕駢者非澼也轉下湯為可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也

華佗論虛煩病汗非宜

諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯見下後第九若嘔者與橘皮湯一劑不愈可重與也此法

數用。甚有效驗。傷寒後虛煩亦宜服此湯。

王叔和論傷寒病汗吐下所宜

王叔和曰。夫傷寒病者。起自風寒。入于腠理。與精氣分爭。營衛否隔。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。腰背強重。此邪氣在表。發汗則愈。三日以上。氣浮在上部。填塞胸心。故頭痛。胸中滿。當吐之。則愈。五日以上。氣沈結在臟。故腹脹身重。骨節煩疼。當下之。則愈。明當消息病之狀候。不可亂投湯藥。虛其胃氣也。經言脉微不可吐。虛細不可下。又夏月不可下也。此醫之大禁也。脉有沈浮轉能變化。或人得病數日。方以告醫。雖云初覺視病已積日在身。原屬內傷其疹癥結成非復發。汗解肌所除。當診其脉。隨時形勢。救解求免。也不可苟以次第為固。失其機要。乃致禍矣。此傷寒次第。病三日以內發汗者。謂當風解衣。夜卧失覆。寒溫所中。並時有疾疫賊風之氣而相染易。為惡邪所中也。至于人自飲食生冷過多。腹臟不消轉動。稍難頭痛身溫。其脉實大者。便可吐下之。不可發汗也。

王叔和論虛人病汗下非宜

夫陽盛陰虛。外臺作表和裏病汗之則死。下之則愈。陽虛陰盛。外臺作裏和表病下之則死。汗之則愈。夫如是。則神丹汗法有神丹丸下法取效安可誤發。甘遂甘遂丸有甘遂下法取效何可以妄攻虛盛之治。外臺作裏之治相背千里。吉凶之機。應若影響。然則桂枝下咽。陽盛則斂。外臺作表和則斂承氣入胃。陰

盛以亡。外臺作裏平以亡若此陰陽虛實之交錯。其候至微。發汗吐下之相反。其禍至速而醫術淺狹。不知不識。病者殞沒。自謂其分。至令冤魂塞於冥路。夭死盈於曠野。仁愛鑒諸。能不傷楚。

陳稟邱述張苗傷寒病蒸汗法

陳稟邱云。或問得病。連服湯藥。發汗。汗不出如之何。答曰。醫經云。連發汗。汗不出者死。病也。吾思之。可蒸之。如蒸中風法。熱濕之氣于外迎之。不得不汗出也。後以問張苗。苗云。曾有人作事。疲極。汗出。卧單簾中。冷得病。但苦寒倦。諸醫與丸散湯。四日之內。凡八過發汗。汗不出。苗令燒地布桃葉蒸之。即得大汗。于被中就粉傅身。使極燥乃起。便愈。後數以此發汗。汗皆出也。人性自有難汗者。非惟病使其然也。蒸之。則無不汗出也。諸病發熱惡寒。脉浮洪者。便宜發汗。溫粉粉之。勿令遇風。當發汗。而其人適失血。及大下利。則不可大汗也。數方與桂枝湯。使體潤。熱汗出。連日當自解也。論曰。凡人有少苦。似不如平常。即須早道。若隱忍不治。冀望自瘥。須臾之間。以成固疾。小兒女子。益以滋甚。若時氣不和。當自戒勒。若小有不和。即須療治。尋其邪由。及在腠理。以時早治。鮮不愈者。患人忍之。數日乃說。邪氣入臟。則難可制止。雖和緩亦無能為也。癰疽。丁腫。喉痺。客忤。尤為其急。此自養生之要也。凡作湯藥。不可避晨夜。時日吉凶。覺病須臾。即宜便治。不等早晚。則易愈矣。服藥當如方法。若縱意違師。不

須治之也。

謂汗

而當不消也。

凡傷寒多從風寒得之。始表中風寒入裏則不消矣。未有溫覆汗而當不消也。
凡得時氣病五六日而渴欲飲水。飲不能多。不當與也。所以爾者。腹中熱尚少。不能
消之。水停心下。便更為人作病矣。若至七八日。大渴欲飲水者。猶當依證而與之。與之勿
令極意也。言能飲一斗者。與五升。若飲而腹滿。小便澀。若喘若噦。不可與之。忽然大
汗出者。欲自愈也。人得病能飲水。欲愈也。

凡溫病可針刺五十九穴。又身之穴六百五十有五。其三十六穴。灸之有害。七十九

穴刺之為災。

論曰。夫尋方學之要。以救速為貴。是以養生之家。常須預合成熟藥。以備倉卒之急。
今具之如左。

幹南按。經言熱病者。皆傷寒之類。千金論謂傷寒與時行溫疫同為毒病異氣。
與內經合。此編首列辟溫。如屠蘇酒。雄黃丸。辟邪殺鬼。陰陽毒諸湯。清瘟解毒。
見證施治。原不斤斤于發汗一法。而于傷寒初入未化熱。應發汗者。第載仲景

桂枝麻黃大青龍三方。此即後人誤據風傷衛。桂枝湯。寒傷營。麻黃湯。三方鼎峙之臆說。餘解肌

升麻湯。之麻黃石膏。解肌湯之葛根黃芩。葛根龍膽湯之麻黃桂枝龍膽大青
石膏黃芩。七物黃連湯之葛根黃連黃芩。三七湯之麻黃。寒水石枯樓根乾

地黃大黃芒消。或汗或下。皆傷寒既入。已化熱之治法。亦與仲景之柴胡葛根
竹葉石膏。瀉心承氣相出入。經言人之傷于寒也。則為病熱。熱雖盛不死。其直
少太兩感于寒者必死。以其不化熱也。初感即病。逐日淺深。與不即病。毒藏于肌
骨之中。至春變溫。至夏變暑。皆漸漸化熱也。及其化熱變證錯雜。并其循經現
證之外候。亦亡之。故徐洄溪傷寒類方。深發明其所以然之故。不論從何經來。
從何經去。見證施治。與仲景之意無不吻合。吾于千金傷寒諸方。亦云然。

辟溫第二

方三十六首
濕蠱病證一條

辟溫氣

歲旦屠蘇酒
辟疫氣令人不染溫病及傷寒。

大黃

十五枚

白朮

十八枚

桔梗

各五枚

蜀椒

五枚

桂心

十八枚

烏頭

六枚

菝葜

十二銖

一方有防風

一兩

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日日中懸沈井中令至泥正月朔日早平曉出藥置酒中煎數沸于東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還淳置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也

菝葜即金剛根。大明治時疫癰瘍肘後方治風毒脚弱

幹南按辟溫諸方總取推陳致新升清降濁破陰助陽之義首推屠蘇酒餘方雄黃硃砂珍珠金石異寶虎頭羚羊龍骨龜甲蝟皮鯀鯉甲雞頭鬼箭羽鬼臼通靈妙藥至如烏頭羊踯躅以毒制毒男兒屎假猪屎以穢逐穢同氣相求哀以其屬先誘之而後攻之辟除穢惡異氣不得不然亦小豆一味本經下水腫水腫不外濕熱排癰腫膿血。金匱治陰毒血熱獨得秘要平易神奇不可忽也

太一流金散

辟溫氣

雄黃

三兩半

雌黃

二兩半

磐石

一兩半

鬼箭羽

一兩半

羖羊角

二兩燒

右五味治下篩。三角絳袋盛一兩帶心前並掛門戶上。若逢大疫之年。以月
日青布裹一刀圭。中庭燒之。溫病人亦燒薰之。

殺鬼燒藥 辟溫氣

雄黃 丹砂

雌黃 各一斤

羚羊角 羚羊角亦得

蕪荑

虎骨 鬼臼

鬼箭羽

野丈人

頭翁

石長生

假猪屎

馬懸蹄

青羊脂

菖蒲

白术 各八斤

兩

蜜蠟 八斤

右十六味末之。以蜜蠟和為丸如彈許大。朝暮及夜中戶前微火燒之。石長生木生

經治大熱。辟鬼氣。
西醫謂即鳳尾草。

虎頭殺鬼丸 辟溫。

虎頭 五兩

朱砂

雄黃

雌黃 各一
半

鬼臼

皂莢

蕪荑 各一
兩

右七味末之。以蜜蠟和為丸如彈子大。絳袋盛繫臂。男左女右。及懸屋四角。
晦望夜半。中庭燒一丸。

辟溫殺鬼丸 熏百鬼惡氣

雄黃

雌黃 各二
兩

羖羊角

虎骨 各七
兩

龍骨

龜甲

鯀鯉甲

蝟皮

各三兩

鷄雞

各十五枚

空青

一兩

芎窮

真朱

各五兩

東門上雞頭

一枚

右十三味末之。拌蠟二十兩。併手丸如梧子。正旦門戶前燒一丸。帶一丸。男左女右。辟百惡。獨宿弔喪問病。各吞一丸。小豆大。天陰大霧日燒一丸于戶牖前佳。

雄黃丸

漢建寧二年太歲在酉。疫氣流行死者極衆。即有書生丁季迴從蜀

青城山來。東過南陽。從西市門入。見患疫癘者頗多。遂于囊中出藥人各患之一丸。靈藥霑脣疾無不瘥。市中疫鬼數百千餘見書生施藥悉皆驚怖而走。乃有鬼王見書生謂有道法。兼自施藥感眾鬼等奔走。若是。遂詣書生欲求受其道法。書生曰。吾無道法。乃囊中之藥呈于鬼王。鬼王覩藥驚惶叩頭乞命而走。此方藥帶之入山。能辟虎狼蟲蛇入水能除水怪蛟蜃。

雄黃

雌黃

曾青

鬼臼

真珠

丹砂

虎頭骨

桔梗

白术

女青

芎窮

白芷

鬼督郵

蕪荑

鬼箭羽

藜蘆

菖蒲

皂莢

各一兩

右十八味末之。蜜丸如彈子大。絹袋盛。男左女右帶之。卒中惡及時疫。吞如梧子一丸。燒一彈丸。戶內。

雄黃散
辟溫氣

雄黃
五兩

朱砂一作赤木

菖蒲

鬼臼各二兩

赤散
辟溫疫氣傷寒熱病。

藜蘆

躡躅花各一兩

附子

桂心

真朱各六銖

細辛

乾薑各八銖

牡丹皮

皂莢各一兩

真朱各六銖

右九味末之納真朱合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便以粟米大納著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方

正月旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之

又方
斷溫病令不相染著

汲水瓶縷長七寸盞著病人卧席下良

又方

以繩度所住戶中壁屈繩即斷之

又方
斷溫疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

丹砂

雄黄

各二兩

右五味末之以蜜和服如小豆一丸可與病人同牀傳衣

又方

白蜜和上色朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立。吞服三七

九如麻子大勿令齒近之並吞赤小豆七枚投

赤小豆

井泉中

亦七枚

終身勿忘

此法

又方

正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中。

又方

新布袋盛赤小豆納井中三日出舉家服二七枚

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方

新布袋盛大豆一升納井中一宿出服七枚

又方

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方

木豉等分酒漬服之妙

又方

神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大小並服不限多少

又方 治疫病

藥子二枚末服之

又方 治溫令不相染。

桃樹蠹屎末之水服方寸匕

柏枝散 天氣不和疾疫流行預備一物

取南向社中柏東南枝暴令乾擣末酒服方寸匕神良

又方

松葉末之酒服方寸匕日三服

辟溫毒

肝病溫毒方二首

方 治肝腑臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰強急縮目中生花

卷肝臟門。治腰背強急脚縮不伸。病。附中欲折目中生花。名青筋牽病。

第十方見

桂心

白术

芒消

大青

梔子

柴胡

五兩

石膏

生薑

各八兩

生地

六升

香豉

各一升

右十味㕮咀。以水九升煮取三升。分三服。

肝腑臟受邪。病溫毒變陰陽。先寒後熱。腰強急縮。目中生花。木鬱肝熱所致。桂心柴胡生薑散風寒。石膏大青。別錄治大熱時。梔子香豉解溫熱。芒消潤腸結。重用生地清血。白木燥土濕毒。從內發外。治即入陰出陽。而肝病陰陽溫毒頸背雙筋牽。先寒後熱。腰強急縮。目中生花以除。

方 治肝腑臟溫病陰陽毒。先寒後熱。頸筋牽掣。面目赤黃。身中直強。

方見肝臟門治

先寒後熱頸筋牽掣不得屈伸。身回側。眼赤黃。名青筋牽病。

玄參

一兩

細辛

二兩

梔子

黃芩

升麻

芒消

各三兩

石膏

三兩

車前草

暴癆切二升

竹葉

切五升

右九味㕮咀。以水一斗半煮竹葉車前取七升。去滓下諸藥煎至三升。下芒消。分三服。

肝腑臟受邪。病溫毒變陰陽。先寒後熱。頸筋牽掣。面目赤黃。身中直強。木鬱肝熱所致。去桂心柴胡生薑。易升麻升清陽。重用竹葉車前草合石膏梔子黃芩解溫熱。仍

用芒消潤腸結。生地易玄參。清血毒。毒從內發外治。即入陰出陽。而肝病陰陽溫毒先寒後熱。頸筋牽攣。面目赤黃。身中直強亦除。

幹南按。五臟溫毒皆用。芒消不用大黃。以非有形。毒熱法取鹹潤通血脉。瀉積結。開邪出路。而真臟不傷。

心病溫毒

方 治心腑臟溫病。陰陽毒戰。掉不定驚動。

大青

黃芩

梔子

知母

芒消

各三兩

麻黃

玄參

六兩

石膏

生葛根

各八兩

生地黃

切一升

右十味

㕮咀。以水九升。煮取三升。去滓。下芒消分三服。

心腑臟受邪。病溫毒變陰陽。戰掉不定。驚動火擾。心熱所致。麻黃散風寒。葛根石膏知母。大青梔子。黃芩。解溫熱。仍用芒消潤腸結。生地合玄參。清血毒。毒從內發外治。即入陰出陽。而心病陰陽溫毒。戰掉不定。驚動亦除。

脾病溫毒

方 治脾腑臟溫病。陰陽毒頭重。頸直。皮肉痺結。核隱起。

大青

羚羊角

升麻

射干

芒消

各三兩

梔子

四兩

寒水石

五兩

玄參

八兩

射干

芒消

各三兩