

邊月書屋藏本

傷寒傳變大畧

附疫病證治大略

傷寒傳安大略

白苔

傷寒傳變大畧

姑蘇

沈竹安著

外感風寒惡寒無汗頭痛舌苔白

當是薄白

脈浮弦者宜

解肌用羌防蘇豉荊蔥姜疎散之

柴葛亦可夏月加香薷

夏用

薄荷辛涼宣解

不惟夏月凡屬溫邪俱宜辛涼宣解如牛蒡連翹桑葉薄荷之類

夏用

白厚苔

舌苔白厚不渴頸項強惡風無汗可與桂枝湯加減

如胸痞便閉左脈浮緊右脈弦滑可與苓連瀉心

湯加枳朴

可與者尚有斟酌處與宜用不同然桂枝湯舌苔厚者忌用即苓連瀉心湯亦非白

苔所宜

汗後熱不解表熱傳裏舌尖紅苔淡黃宜與羚羊桑

丹翹心梔仁之屬得汗後視其斑疹有無如見白痞

從肺胃宣泄宜牛蒡薄荷翹心桔梗之類連翹心清

當用倘得紅疹宜羚羊丹皮牛蒡連翹用犀角地黃

湯古法雖如此然舌未乾黑如不大便胸痞拒按者

可與小陷胸湯小陷胸治按之痛拒按者即手不

便不利如車前木通赤苓如熱隨汗解而癰退大

便通而腑濁已盡苔既化而微渴不寐宜用鮮斛知

苔白滑
光淡紅

辺白中
黄根灰

辺黄中
白

母蜜炙桑葉丹皮元參翹心麥冬生穀芽等清泄養
陰以化之。

如苔白滑光淡紅者邪初入裏丹田有熱胸中有寒
乃少陽半表半裏之證宜用小柴胡湯梔子豉湯等
清宣以解之。

舌苔辺白心黄根灰色心胸熱悶煩躁欲嘔者宜涼
膈散清宣泄化之。

舌苔辺黄中白身熱頭痛脉浮弦者不拘日數此失

尖白根
黃

尖白根
黑

白胎中有
小黑點

白胎外
有微黃

表也。宜小柴胡湯。

舌苔尖白根黃。表未解也。先解表而後攻裏。解表宜

涼膈散。

已是表裡兼治

小便澀者。宜五苓散。

尖白二分根黑一分。必有身痛惡寒。如飲水不多者。

用五苓散。渴者。白虎湯。

白胎中有小黑點者。尚有表症。解表宜涼膈散。攻下

用調胃承氣湯。

白胎外有微黃者。必作泄。宜解毒湯。

即黃連解毒湯。黃連。梔子。柏。四味。

黑邊白心

左半白胎

右半白滑胎

淡黃苔

惡寒者宜五苓散

舌胎邊白心黑脉沉微者難治脉沉實者可下浮滑者可汗初病得此尤宜加謹速進調胃承氣湯

白胎左半有而右半無自汗者不可下宜白虎湯白而滑者臟結也難治

舌胎白滑右半有而左半無必有往來寒熱病在半表半裏宜小柴胡湯

舌苔淡黃身熱自利與黃芩湯表症未罷小柴胡合

老黃苔

黑
邊黃苔

天水散

即六散

治之

舌苔老黃如沉香色。脉沉。胸腹拒按者。宜小承氣湯。或調胃承氣湯。服藥後轉屎氣者。可與大承氣湯。不轉屎氣者。不可攻。如邪少虛多。可與炙甘草湯。

邊黃苔黑。汗痞不透。微喘嘔惡。脉數煩渴。宜白虎湯。如苔不化。邊轉絳色。尖生芒刺。津涸齒垢。鼻生烟煤。癰現紫色。神昏譫語者。此溫邪內陷。由氣入營。最怕生風。瘰癧。宜犀角地黃湯。加菖蒲鬱金。鮮斛銀花。

黃苔中
有黑點

黃苔中
有黑紋

露竹葉心等。先服牛黃清心丸。如不解。熱深厥深。邪入心包絡。脉數而促。神昏譫語。有內閉外脫之象。宜先服至寶丹。後用犀角石決明。辰砂拌茯神。麥冬。羚羊角。鉤藤。鉤連。翹心等。清熱養陰。平肝熄風。以治之。

黃苔中有黑點。亂生者。必發渴。譫語。脉實者。用大承氣湯下之。若脉濡而循衣摸床者。不治。若黃苔中有一路黑紋。至尖者。熱氣已深。十有九死。

紅舌內
有黑形

紅舌中
有黑點

淡紅舌中
有深紅點

勉用調胃承氣湯

舌色純紅。內有黑形如小舌者。邪熱結於裏也。君火熾盛。反見水化。宜涼膈散。或大柴胡湯。

紅舌中有小黑點者。是熱毒乘虛入胃。蓄熱則發癰

矣。宜元參升麻葛根湯。

即此三味

或化癰湯解之。

即白虎湯加人

參又名人參白虎湯

淡紅舌中有深紅星點者。

碎小者為點。圓大者為星。

少陰君火熱

盛。所不勝者。

腎水也。

假火勢以侮脾土。將欲發黃之候。

純紅舌乾
里多刺

純紅舌
有裂紋

純紅舌
有紅點

灰色上
有黑紋

宜茵陳五苓散治之。

即五苓散加茵陳

純紅舌上乾硬黑色多刺者熱毒熾甚堅結大腸金受火刑不能平木故也宜調胃承氣湯

純紅舌上有裂紋如人字者君火燔灼熱毒炎上故有裂紋宜涼膈散

純紅舌上有紅點如蟲蝕狀者熱毒熾甚火在上水在下不能相濟故也宜小承氣湯

灰色舌上有黑暈兩條此熱毒內乘腎與命門脉實

者宜急下二三次遲則不治脉浮者宜凉膈散或用

解毒湯

芩連梔
柏四味

疫病證治大畧
姑蘇怡然魯璜在田氏著

宜汗大畧

夫春夏間之溫熱病傳染而成疫癘者。治法雖與傷寒殊。而汗法亦不可少也。吳又可曰。有先表而後裏者。有先裏而後表者。有但表而不裏者。其義可概見矣。但傷寒發汗多用麻黃桂枝。疫病發汗則不然。其初起有頭痛身疼。發熱惡寒無汗。或有汗不徹。舌白口渴。脈數。此以表邪未過而裏蘊之邪不克外達也。

用葱豉香蘇柴葛等解肌。或普濟消毒飲。或荆防敗
毒散。依症加減。令其汗出。或發癰癰。如舌白膩厚。胸
痞嘔噦。呢音用達原飲。正氣散。香薷飲。枇杷葉散之屬。
以疎開之。如自利。脉促。表未解者。與葛根芩連湯。宣
化之。如兼少陽症。往來寒熱。脉弦口苦者。與小柴胡
湯。去參朮和緩之。病雖不能即退。俾邪有出路。不致
傳變。俟至一候。可與戰汗而解矣。如汗出輒復熱。而
脉躁疾。不為汗衰。狂言不能食。病名陰陽交。為不治。

出經

至於熱傷營氣者清之。腑實者下之。昏閉者開之。
津燥者潤之。臨症制宜。而汗法當先加意焉。若咽喉
乾燥者不可發汗。淋家不可發汗。瘡家雖身疼痛不
可發汗。衄家不可發汗。亡血家不可發汗。汗家不可
重發汗。咽中閉塞不可發汗。欬而失小便者不可發
汗。諸脉數動微弱者不可發汗。尺中遲者不可發汗。
此仲景之禁例也。

華松濤曰。仲聖所禁者。只是辛溫辛熱發汗。若辛

平辛涼宣解之劑亦有可用處不可不知

宜吐大畧

吐之一法。內經謂之上取。又曰高者因而越之。丹溪云。吐中有發散之義。故病自吐自嘔者。却是順症。無柰今人見驚而聞者駭。必欲醫者急止之。遂致反變逆症者多矣。若病不吐而醫使之吐。不免群相訝笑。而吐法之失。殆由是乎。故余不得不言矣。蓋邪在表者宜汗。在中下者宜下。若在胸腹及咽喉之間。或有

痰食停滯。非汗下所能治者。不行涌越。則邪結不散。
將若之乎。遂致輕者重。而重者死矣。吐法詎可忽哉。
仲景云。病如桂枝症。頭不痛。項不强。寸脉微浮。胸中
痞硬。氣上衝胸。不得息者。當吐之。宜瓜蒂散。又曰。病
人手足厥冷。脉乍緊。邪結胸中。心中滿而煩。不能食。
病在胸中。當須吐之。此吐法之製。亦不得已也。豈好
事哉。至於纏喉鎖喉諸症。皆風痰鬱火壅塞喉間。不
急吐之。則脹閉而立危矣。以杜牛膝打汁。頻々灌之。