

医药大学图书馆藏

帶下

帶下赤白皆濕熱脂腹痛甚濕熱結過帶脈出于大小腸之分淋瀝以下故曰帶下赤屬血白屬氣
頭昏目眩口苦舌乾咽嗑大便或閉或溲小便便澀致肝旺脾虧而生濕熱則流通古人有痛者濕
懶鬱甚則引腹引痛婦人服食燥熱性行乖戾以致肝旺脾虧而生濕熱則流通古人有痛者濕
暫以辛溫開導如大溫經湯大玄胡索散調之羌活九是也熱多瘦婦必潮煩乃陰虛多熱脈數外症潮煩
兼痛風者二陳湯加蒼柏兩生牛膝川芎桑葉頭痛鼻涕者蒼柏辛芳散兼入情者側柏樗皮丸白帶濕勝肥
黃痰作孽二陳湯加二朮升麻柴胡或蒼柏樗皮丸如結痰白帶淋漓不己者先以胃丹半飢半飽津
液下敷喉嚨積悶服參朮求芍葵丸如通相滑久加龍骨下焦產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升
虛如四物湯氣虛加參朮求芍葵丸如通相滑久加龍骨下焦產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升
帶臭腥陰中冷痛何曾畧經因水動氣滯下臨精氣聚滯于下焦凝積而成白濁如淋下流腥臭者黃芪
建中湯去桂加當歸水煎若練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大
烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有不正臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大
附常下腥臭多悲不樂附桂湯鹿角霜除冷者四物湯加桂
赤如紅津肺熱或白形如小鳥雞丸黃如關及腎經黑如湖一種白淫思慮切思無窮所願不得意淫于外
血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散
謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶遍服藥又有日夜流津如清水未用或如藕膠者謂之白崩與少
淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補鎮心丹因思傷脾胃者清女經水初下一時驚悸或浴以冷水或
金鎖止元丹降氣湯因勞傷腎氣心疏苓交者室女胎產法相同當風取涼故經水正而即患帶下宜戒壯
珠砂正元丹降氣湯因勞傷腎氣心疏苓交者室女胎產法相同當風取涼故經水正而即患帶下宜戒壯
邪乘虛入于胞絡宜暖宮丸加姜附吳萸或黃蘗建中湯去桂加當歸水煎吞若練丸虛風補衛調脾循故
凡前中帶下或用升提如升陽調經湯或用收澁如代龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司開附
而為榮血之主脾胃為血海水源之會得氣與胃氣俱虛則血液無所約制是以古方有用桂枝湯加附

癥瘕與男子積聚條參看

血而後成男子者由癰疽瘻石瘡陽暈食癰血癥食癍血癆種不一盡皆痞塊之異名耳○經云太陽

亦有熱燥腸
通成腸
况陽氣怒於大
蘊聚飲食濕熱
排鬱結成未可
專以寒利論也
此非之癰瘡皆
內發也

溫白丸
四物湯
血熱者
加桃仁
非汁甚
者加蜀
葵根入
玄明粉
下之或
桂枝桃
仁湯外
以非菜
搗餅熨
痛處或
痛甚

甘草散○食積二稜前保和丸紅母姜汁糊丸服○鬱氣白蘼散○蛇蘼散○大承氣湯○加薑當歸龍薈丸○

枯槁下血或積者白芥子丸
痰食成石丸
寒濕主來四肢不舉
中生瘡甚指小大便難
通或藥帶下小腹重

痛面色黃黑甚于子藏則絕產入于胞絡則經閉宜參荆芥散小溫經湯道遠散通經丸古斑玄丸

胡索散手托散失笑散單乾漆丸數症因疾氣瘡者與上諸方通用
瘰癧病治肝心小

時而痛名曰癰皆陰陽不和飲食停滯冷氣相搏而成亦得冷則發脹不食亦口憎食難化散

腸胃下血有通清氣散而濁氣結而為癥覃延日久不己愈肉乃生始如雞卵久如懷胎按之堅推之

也宜三陳湯加香附以開之或香粉丸石疔瘰癧經無路損瘀血結成久則堅硬如石塞于子門大如瘰癧胎月事不下乃先感寒氣而後血壅不流所致血瘕石瘕丸氣血瘕散氣瘕血瘕聖口石水瘕重者具雄

聚湯病瘕麝香丹古硝黃膏石瘕見睨丹主之或通經丸加紅花尤妙
 蟲者三虫聚而食血之象即癥瘕之甚者肚腹急硬如石腫滿如水乃瘕結胞門或產後為水與血搏

治通用四香散千金桃仁煎內消散蠲蒸煮肚法抱甕丸黃米丸單肢蠱脹者大腹皮飲救之詳男科附
張周氣皮血解省余壹者置且甫單單善治癰瘰者調具氣而破其血消其食而豁其痰良其大半而止

類訪彙研立革之陰厚石還宜和服胃不可猛攻峻施以傷元氣益扶脾正氣待其自化此開鬱正元之油名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻擊之藥病

重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前清熱與養血。婦人無病月事時下乃能受孕氣血充寔則可保十月分娩子母無虞若衝任不充偶

醫學入門 卷五 癥瘕胎前 三 上海校經山房石印

中国医药大学图书馆藏书

後受孕或孕後映其熱清則血動胎輕則胎動不安行所以養胎也三五七陽月必墮火能清物故也月分依

經善調變各經氣血多少虛實不調則胎不安一足厥陰二少陽三陽天胎前不宜熱火能清物故也月分依

精血乘中氣自旋轉其中自無虛成自結一竅空洞虛成與子黃中一穴相息而國不國然後陰陽大定

胞衣初薄厚如被米飲豆漿面數自結一皮中竅日生大兒之胎足少陽三陽天胎前不宜熱火能清物故也月分依

陰胎所主也此月經期無病之數食稍異平日陰地二生大兒之胎足少陽三陽天胎前不宜熱火能清物故也月分依

此胎所主也此月經期無病之數食稍異平日陰地二生大兒之胎足少陽三陽天胎前不宜熱火能清物故也月分依

止不動猶可孤疑也若吐逆三箇月間忽曰腹痛有不孕矣或當偏嗜三錢物乃膠甘草各一錢酸棗四錢

三焦訣雄三九先就分明日即其諸月體數百日可變或謂男女胎形乃影太極之象道成男白絨道成女手厥陰

所主胎最易動古求不覺或為丸順成手少陽如胎所主安多腰背痛不可忍或疑者用驗胎法以川芎為末一錢

受水精以成血脈如形像二錢胎順成手少陽如胎所主安多腰背痛不可忍或疑者用驗胎法以川芎為末一錢

附鳥藥大腹皮如形像二錢胎順成手少陽如胎所主安多腰背痛不可忍或疑者用驗胎法以川芎為末一錢

五箇月忽心腹疼痛者用二錢胎順成手少陽如胎所主安多腰背痛不可忍或疑者用驗胎法以川芎為末一錢

皆成足陽明脈所主五陰陽之氣筋骨不安者安胎已毛髮始生足太陰脈所主酒調服之立愈五脾六胃七肺金

能動左手亦大陰脈所主旋花散氣不八手陽明成竅穴其能動右手手陽明脈所主酒調服之立愈五脾六胃七肺金

安常處左手亦大陰脈所主旋花散氣不八手陽明成竅穴其能動右手手陽明脈所主酒調服之立愈五脾六胃七肺金

九箇月內不可多飲下胎痛行氣散九非八九腎十勝神氣完其能動右手手陽明脈所主酒調服之立愈五脾六胃七肺金

胎動心腹腰作疼甚則下血如經行或因七情氣不順或因外感風寒凝受胎不安或因驚恐或因憂鬱而受胎或因登風冷攻入陰戶以致胎動而母心腹作痛甚則腰痛下血當安胎而理自定皮胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛者紫蘇飲因外感發熱頭痛嘔逆胸膈脹滿者安胎飲加柴胡明砂仁香附熟者黃芩湯血虛參朮服者四物湯或平胃散胎前藥上者須辨寒熱虛實是疾者理中湯加芍藥當歸氣衰心腹脹痛者用香附枳殼等分為末空心白湯下有冷氣腹痛傷食如刀刺等分湯去半夏如山梔黃芩○心腹大痛氣欲絕者古方歸身如茯苓厚朴等分水煎單方用善九如人參吳茱萸枳殼甘草水煎服○心腹大痛氣欲絕者古方歸身如茯苓厚朴等分水煎單方用善

用單黃連或茵陳末因母病或壓墜有因母病或致胎動者但治母根各五錢水酒各半盞煎服下血產門痛者
 心蟹入各二分末空溫酒調服下之免害其分統又用紅酒麴五兩漬酒可保母用牛膝四分赤香桂
 隔宿勿食次早再服其子如糜令母肥盛無疾或麥芽神又用麴煎服尋常古考歸湯最妙○孕婦或從高墜
 調重物壓致動胎即安心胎痛甚所不治者功同杏仁或炒去血過未熟酒鹽湯艾湯皆可健脾胃養血總安寧
 通用古考求湯加阿膠風邪加生薑豆蔻寒地榆或乾生薑許熟艾湯歸湯艾湯皆可健脾胃養血總安寧
 過濕熱腹痛加白芍旋覆花虛夏薤歸此安胎益氣聖藥也白朮加香附便燥加黃連煩渴加麥門冬烏梅加慈
 葉素慣墮胎加杜仲旋覆花虛夏薤歸此安胎益氣聖藥也白朮加香附便燥加黃連煩渴加麥門冬烏梅加慈
 服常服安胎易產所生男女又無胎毒益壯脾運又卒有所下急濕則日服三五服緩則五日十日一
 今清熱以養血白朮健脾以燥濕安胎丸全屬雷歸哉加味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛
胎動不痛而血者為胎漏血多為熱少為虛連益母草或金匱當歸散如味養榮丸血後成
片者三補丸如香附白芍○血虛來少者苦膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸○氣虛者四君子湯
芥阿膠因勞役感寒以致氣虛下血或胎動者有肥胎補中湯或下血如月信以致胎動者四君子湯
妙乾姜各二錢
為未米飲調服
惟在房難救止
或胎動者有肥胎補中湯或下血如月信以致胎動者四君子湯
物湯加膠
偶然尿血莫糲糊
髮血自尿門下血胎漏自人門下血如月信以致胎動者四君子湯
久者用龍骨一錢蒲
黃五錢為末酒調服

惡心阻食名惡阻
或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡結于胃口故達食氣引動精氣
肥人痰
因怒者單黃連丸
或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡結于胃口故達食氣引動精氣

麥門冬厚朴竹茹丸
連日久水漿不入口吐清水者或因胎動別症兼
並加丁香香蘇開食氣多則少起者旋覆花散
或單白朮為丸或單砂仁為末米飲下甚者紅丸子極效

子煩燥悶乳心神火盛壯肺好生噴
五六月間居火大行俱能乘胎致煩躁胎動不安大抵相火感者
單如母為未蜜丸欠寬大每三九酒下六月間居火大行俱能乘胎致煩躁胎動不安大抵相火感者

煩燥不宜人
或有停痰積飲帶下胸膈之間亦減半煩燥胎動不安者亦效
煩燥不宜人
或有停痰積飲帶下胸膈之間亦減半煩燥胎動不安者亦效

子懸心腹脹滿痛胎氣湊心相火關
謂之子懸宜常飲有鬱心腹脹滿甚者加義求及丁香少許不食
者古苓朮湯倍
甚則悶絕欲傷人
而死緊脈飲連進救之誤藥子死不能動胎藥子死腹中則增寒手指

胎水遍身虛腫浮
妊孕經血閉以養胎胎中換水濕與血相搏濕氣流溢故令面目肢體遍身浮腫名曰
水血化為水所制宜五皮散倍加白朮求飲調服或單小梔丸
者防已散濕熱甚者單小梔丸倍加白朮求飲調服或單小梔丸

蓄水所致若不早治必無其子
手足散為度仍當煮鯉魚粥食之
子母難保宜經魚湯服至腫消水散為度仍當煮鯉魚粥食之

七八箇月以來兩脚浮腫頭面不腫乃胞漿水濕下流微腫者易產名曰鰾脚腫
甚者平胃散加木瓜
外感者橫散自脚面腫至膝腿悶妨食甚至足指間有黃水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫

者膏著湯手脚腫者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加高陸

妊孕中風名子癰只因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有時昏暈胎難安體虛受風而傷太陽之經絡

疾延壅或昏量不識人時醒時作謂之兒暈又曰子癰又曰母陳皮如茶甘反張或子癰命湯散中風者

痛身視體盡疼乍寒乍熱胎不安常若頭痛眩暈下寒時入酒調服白不省人事者單劑芥散

子淋溺遊膀胱熱草燈心胎食積熱胎熱以致小便閉澀又謂之子滿宜古芳歸湯加木通麥門冬人參

或腎氣丸其則大小便閉結四物湯加黃芩厚朴枳殼白朮赤茯苓等分大腹皮甘草等分

茯苓等分調服為轉胎閉痛難當轉胎者胎在轉胎下急痛小便不通身重腰膝痛者用冬白散

六君子湯去茯苓探吐以提之無孕者亦同水煎服胎前大遺尿赤白宜分別等分為末每三錢酒調服無

腎氣丸主之甚者冬葵子赤茯苓等分同水煎服胎前大遺尿赤白宜分別等分為末每三錢酒調服無

胎出者搗葱白于臍上灸之立效如欲服藥與胎前大同遺尿赤白宜分別等分為末每三錢酒調服無

亦有虛少許白者屬虛安胎飲或雞肝散

子瘡腹鳴自笑悲後即孕三五箇月以來忽失音不語者胞絡絕也胞繫于腎腎脈貫舌非藥可療分塊

嘔下者大麥甘草連煎服汁有自哭自笑者紅棗燒存性末飲調服發痘動胎命必絕胎前患症用峻藥

死詳諸症濕疫風熱虛去邪保胎真口訣阻孕婦脾子煩不運而生濕濕服發痘動胎命必絕胎前患症用峻藥

濕消痰順氣疎風補虛或兼雜症飲食禁忌亦須知雞內合糯米食令子生寸白虫食肉令子瘡瘡食肉令子

肝食令子多生食蠶肉令子項短縮頭暈目眩食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子瘡瘡食肉令子瘡瘡食肉

消胎氣食鹽馬肉過月難產豆醬生食菜芽子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子瘡瘡食肉令子瘡瘡食肉

子驚風而天食雀巢令子遲遲生食菜芽子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子瘡瘡食肉令子瘡瘡食肉

腦破不愈多睡胎食雀巢令子遲遲生食菜芽子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子瘡瘡食肉令子瘡瘡食肉

造化玄妙古法待胎成兩月之內以茶置案下盡是雄雞故胎教常令王公大人亦此意也更佩雄黃一

時遊胎殺雖不可泥無門戶床灶定不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

上海校經山房石印

卷五 臨產

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

產後

上海校經山房石印

科五積散痛甚加莪朮嘔吐砂仁瀉加姜附人參泄瀉不止臍腹痛者理中丸加肉豆蔻扶寒腹痛者理中丸加肉豆蔻

鳴子便清白不渴者四君子湯加砂仁瀉加姜附人參泄瀉不止臍腹痛者理中丸加肉豆蔻扶寒腹痛者理中丸加肉豆蔻

入胃脹滿者六君子湯加酒炒黃連及木通少許或益元散○扶濕身重腹脹者胃苓湯○嘔吐因飲血來者

三白湯加乾姜陳皮黃芪麥門冬甘草煎服○或加陳皮黃芪麥門冬甘草煎服○或加陳皮黃芪麥門冬甘草煎服○

中帶表無過慶湯後外感蘇軾太早或換衣襲風冷入于下部令人寒熱似瘧頭痛不歇血虛者古方歸

龍湯主之如體或發熱惡寒大見久而便閉柴胡湯合四君子湯或四物湯加黃芪各三分散切末以酒煮之

治法曾誤服熱藥過多熱症走動氣血不盡流于過身腰膝關節筋脈急引或手足拘攣遍身肢節疼痛者

寒身痛筋攣虛渴煩痛或散或餘血不盡流于過身腰膝關節筋脈急引或手足拘攣遍身肢節疼痛者

桃仁木香等分姜煎服○產後諸風痠痛無力者血風丸或煎服○煩渴氣虛者生脈散血虛者

花柳三錢甘草五分糯米半夏八分甘草五錢分用參麥冬二錢麥門冬一錢半熟地七錢

甚如白朮防風牡蠣麥門冬熟地茯苓甘草五錢分用參麥冬二錢麥門冬一錢半熟地七錢

當歸羊肉湯○發熱盜汗者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖煮米熟取青汁一盞入人參當歸各一

錢煎服○大便閉者古方歸湯加防風枳殼甘草煎服○小使不通腹脹滿者用鹽填臍中慈白一末切作

指厚散鹽上以艾性灸之熱氣入腹即通熱者不語敗血濕痰迷強不能言語者七珍散四味散○有臨

六散散加枳殼枳殼水通府子仁葵子水煎服○不語敗血濕痰迷強不能言語者七珍散四味散○有臨

產服湯藥過多胃濕使然者熟料五積散生白礬末一錢熱迷心○見鬼神非邪怪由血虛勞動肝心

敗血攻冲邪淫于胡言亂語非風寒非鬼祟者八物湯去芍藥加琥珀柏子仁遠志炒香散○如銀歸地黃黃連

○痰血迷心妄言妄見及心虛謔妄昏暈者八物湯去芍藥加琥珀柏子仁遠志炒香散○如銀歸地黃黃連

龍丹○產後血少怔忡睡臥不安又有惡露常淋淋或因脾損尤難住者產後五淋白茅湯不止四肢乏力沉

入于諸經不得還元故口鼻黑起乃變鼻衄發喘聲高難救護于產後氣喘由榮血暴竭氣無

因產後虛熱所致胃絕肺敗犀角地黃湯救之發喘聲高難救護于產後氣喘由榮血暴竭氣無

湯或加蘇木少許救之若水調服藥用奪命丹者用陰門腫突腸不收者用四季蓮入乳香末同煎

血竭沒藥等分煎之若水調服藥用奪命丹者用陰門腫突腸不收者用四季蓮入乳香末同煎

于陰戶兩旁良久即愈○因產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

貼頂少收即去革麻○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

湯洗子宮脂膜休羞○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

以肝癰所致有粘席不得上者乃脂膜無妨補中益氣湯去柴胡連進二帖即收○臨產驚動用力大

婦數貼子宮脂膜休羞○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

再用前法起兩日肉線盡入却再服失笑散古方用新姜如用綳袋與前度手微動之則痛若欲絕氣失

通氣血虛氣滯塞者戒鬱○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

是病生者湧泉散○無子食乳要消如用麥芽必氣兩食少者用鍾乳粉二錢漏蘆煎濃湯調理或用諸懸

則氣結而血亦結○愈怒過則氣逆而血亦逆者必氣兩食少者用鍾乳粉二錢漏蘆煎濃湯調理或用諸懸

仍詳具○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

乳常吸煙氣未甚縮再用一搗爛貼頂上血消而乳頭自復○產後失血過多陰門加防風升麻須用酒炒黃芪為連進二服外并藥酒

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

胎產

觀形

察兒氣色 肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無先分部位左頰青龍屬肝為應春青右頰白虎屬肺為應秋白
 天庭額高而離陽應夏色心火頭紅主三焦積熱印堂至山根紅者心火驚小兒便赤澀山根至鼻柱紅
 者心胃熱地閣額低而坎陰應冬色腎水吐逆紅者胃中氣病兩頰赤者肺熱鼻在面中應四季準頭脾
 大小便澀主渴蛔蟲咬心頭者唇冷反人中見肺熱面頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳脾熱赤食倉
 應唇際者皆虛○陳氏五藏驚悸冷熱詩曰肝驚起髮際肝積在食倉肝冷唇青白凡五岳赤者皆熱淡白
 印堂心積額角荒心冷太陽位心熱面頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳脾熱赤食倉
 髮際赤肺積髮際荒心冷太陽位心熱面頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳脾熱赤食倉
 氣見而熱痰壅盛印堂屬心紅色熱痰青色露而驚風怔悸如煤之黑為痛中惡逆傳似橘之黃倉傷大
 陰文武脾虛吐利亦有白乃疳勞氣不刺紫為熱熾者死青遮口角難醫狂黑掩太陽不治左太陽青驚
 臺皆青



鼻塞變蒸壯熱黑青乳積右太陽青驚重紅色風抽眼白黑者年壽亦光

見定危必死黑者內外有熱連文臺者熱極連武臺者漸生變症年壽亦光

肺部黃乃食積瀉利而帶陽須防欬嗽而拖藍可忌痰痛方殷面青而唇口撮驚風欲發面赤而目黑

火紅光焰外感風寒全黃氣浮浮中藏積滯乍黃乍白疳積連綿又赤又青風邪癰瘰氣之顛門成坑

驚熱夜啼紅腫驚風痰熱前顛虛軟血衰頭毛作穗髮黃焦枯者肝熱肝氣眼生眵淚脾冷涎流滯滯

如黃土則為不宜氣虛血弱後顛不堅父精不實面目虛浮足腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹痛而多啼

青為驚吐瀉方廣光滑吉而昏黯山神位青黑驚風惡候亦忌損腦手如數物兮肝風將發

面若塗硃兮心火似炙坐卧愛煖風寒之入伸縮就冷煩熱之攻肚大脚小脾欲困而成疳目眦口張勢

似危而必斃噫五體以頭為尊一面惟神可恃小兒諸病但見而眼無睛光黑睛暗昧者反或外若昏困而神

藏于內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或白者稟弱多病目症內未

之不同聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者神驚聲重者疾聲重者

者啼有乾濕之頭異直聲往來而無淚者難愈燥聲促聲不絕者感寒者病之初作必先呵欠

驚風面黃者脾虛多睡者內熱火之大發忽然驚叫者多口瘡宜即看之

珠手綺緡雖由外以識中勿刻丹而求劍聲啼遍體青筋俱不壽反腫腫骨若不成就能行能立反

深老性尊持方是人家長命子

察脉小兒初生至半歲看額脉週歲以上看虎口三部男子五

額脉三指熱感寒額前眉上髮際下以無名中指三部診寸口三部脉

者乳消難上熱下冷食中熱食指為上名指為下若夾驚名中指詳看便無名中指熱

上海校經山房石印

食指風氣命三關
此男左女右以左陽右陰故也然陰陽男女各有兩手亦當參照左腕之脈以辨其氣之清濁也

短小者肺熱風痰在喘又輕則無脉若直射三關青黑外症又重者死
五色惟紅黃安黑由其病極也

能如紅黃之色純黑者不治又白色主病黃者當驚或紅或青如三工至易變赤

色大一直小曲者是母傷食所致紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾風
紅疹是傷寒痘疹

泄瀉○錢氏歌○虛紅傷寒青端
白色痢黑時因中受黃即困脾
風之驚千○命關人驚多掌變
風之驚千○命關人驚多掌變

風元惡候紋黑如墨困重難治
懸針青黑關水氣閉症熱脾風不治餘做此圖魚求此樣刺者風

關虛勞艱困水腫肝癰驚風疳積腹脹痰積乙字二關驚風盡屬月內吐蟲肝病開大月秘閉

胃氣上逆
多吐疳積
總女環口
流珠點眼
熱三焦
黃利煩燥
啼哭長牙
寒瘧
疳積
疳國
反心
申荒忽
司夾驚
夾

濕為肝病。去蛇。昏。睡。濕。濕。口。舌。反。裏。升。風。寒。寒。急。四。肢。稍。冷。小。便。赤。色。口。及。心。不。快。閉。食。風。咽。

病傳經者不可回其有三關紋如流珠流米三五點相連或形于面或形于身危症尤甚
 口善於笑熱驚風當雙安丸
 口善於笑熱驚風當雙安丸

外匹斜左傷區斜左寒區區雙金三曲傷治破區脫齒女蟲牙虫打丁金丹丹氣氣所打口食三

一昔三關定直隸
 浮緩傷風洪緊傷寒人迎
 風盛數多難急促遂令沉痾
 細寔有

孩兒三歲至五歲一打三陽定其口氣注示醫或傷寒氣口醫盛傷食口主驚之症產驚乃不之

積水索口索弦是風聞元爰負口乳也難夏冬索弦平意大秘況而數者骨中寒弦長多是瞞于風

強監

不寐驚風四支掣口以火燒單細甘勞世蟲齒虛需有氣以黃兼驚神不脉孔多痢大便血

桑林亦畜詩多大屋其區無朝熟祇結為前大後小童脈憤前小後大必氣咽大不均四至洪來苦煩

蕭元細復中冬切切骨主露魚令所易弦長客忤分明說五至夜甚浮太晝六至夜細浮晝別純陽六至

虎平口五至虛四至病三至脫七至八至此是聖人傳妙訣脈過寸口入魚際主遺尿驚悸脈浮數身冷

吐吸脈浮大身溫順沉細身冷逆滑勞脈際數臟寔順沉細

服此至病除亦身壯