

第六冊

婦人門

小兒門

外科

足本大字
詳註

醫學入門

上海廣益書局
印行



精校
詳註
婦人門
醫學入門
卷六

經候

經病百端血滯枯。婦人血為主。天真氣降。壬癸水合。腎氣全盛。血脈流行。常以三。曰血未盡。或外被風寒。及太濕。冷。暑。熱。邪。氣。或。內。傷。生。冷。七。情。鬱。結。為。疾。為。癥。積。於。中。血。枯。良。方。云。經。止。後。用。力。太。過。入。房。太。甚。及。服。食。燥。熱。以。致。火。動。邪。氣。盛。而。津。血。衰。曰。中。變。為。水。腫。恚。怒。則。氣。驚。逆。則。血。氣。錯。亂。妄。行。逆。於。上。則。從。口。鼻。而。出。逆。於。身。則。水。血。相。搏。極。傷。肝。則。有。眩。暈。嘔。血。為。癥。瘕。血。出。瘡。瘍。等。病。加。之。經。血。滯。漏。於。其。間。遂。成。癥。穴。則。止。慾。淋。瀝。不。斷。濕。熱。相。搏。遂。為。崩。帶。血。結。於。內。變。為。癥。瘕。凡。此。變。症。百。出。不。過。血。滯。經。閉。宜。枯。而。已。但。血。滯。亦。有。虛。熱。血。枯。亦。有。虛。冷。故。重。則。經。閉。輕。則。血。枯。補。虛。破。血。枯。補。虛。不。通。以。滯。枯。分。言。輕。則。經。水。不。調。止。言。虛。與。熱。而。已。滯。宜。破。血。枯。補。虛。食。熱。毒。或。暴。怒。凝。瘀。積。疾。直。須。大。黃。乾。漆。之。類。或。兼。有。痰。火。濕。熱。尤。宜。清。之。涼。之。每。以。肉。桂。為。佐。者。熱。起。於。勞。役。憂。思。却。宜。溫。和。滋。補。或。兼。有。痰。火。濕。熱。尤。宜。清。之。涼。之。每。以。肉。桂。法。但。血。為。氣。配。則。血。行。也。但。不。可。純。服。峻。藥。則。升。氣。陰。道。至。於。耗。氣。益。血。之。說。雖。女。科。要。亂。則。調。氣。盛。於。血。者。方。可。單。香。附。丸。散。一。般。氣。散。則。升。氣。陰。道。至。於。耗。氣。益。血。之。說。雖。女。科。要。氣。耶。論。者。多。泥。叔。和。血。旺。氣。衰。不。知。叔。和。論。肝。肺。二。脉。則。宜。肝。旺。於。肺。其。實。氣。血。平。和。有。孕。故。經。曰。兩。臟。通。和。但。婦。人。不。知。叔。和。論。肝。肺。二。脉。則。宜。肝。旺。於。肺。其。實。氣。血。平。為。女。人。仙。藥。經。曰。兩。臟。通。和。但。婦。人。不。知。叔。和。論。肝。肺。二。脉。則。宜。肝。旺。於。肺。其。實。氣。血。平。實。正。氣。奪。則。虛。可。不。怡。諸。則。滯。因。外。感。傷。冷。鬱。小。溫。行。登。風。寒。入。內。以。致。凝。結。者。五。積。散。去。麻。黃。加。牡。丹。皮。紅。花。○。七。行。過。食。生。冷。或。外。被。冷。濕。以。致。瘀。血。凝。結。者。五。積。散。去。麻。黃。加。牡。丹。皮。紅。花。○。七。



或後至多或少或通月不至或一淋瀝不斷邪未疎時行時止淋瀝不斷中留帶血

月再至當歸散調經散丹參散一淋瀝不斷邪未疎時行時止淋瀝不斷中留帶血

外四錢乾漆三錢蜜丸服如腰膝腹痛者牛膝散或行或止心痛者桃仁散或用

水適來通斷往來寒熱者先服小柴胡湯四物湯加地黃後以四物湯心痛者桃仁散或用

者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地黃後以四物湯心痛者桃仁散或用

吞丸一固風熱色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊或快疾停水以混之也如煙水如屋

經水如豆汁或帶黃混濁模糊者濕痰也成塊作片色不變者氣滯也如煙水如屋

也漏色變紫黑者血熱也○大嗽紫者四物湯加芍藥附子連成塊者二陳湯加芍藥歸

香附淡白者古芎歸湯加芍藥附子連成塊者二陳湯加芍藥歸

湯加芩朮防風蒼朮如豆汁者四物湯加芍藥附子連成塊者二陳湯加芍藥歸

陳皮隨症選用○通用琥珀調外症潮熱內腹痛○潮熱者二陳湯加芍藥歸

經丸百子附歸丸一通用琥珀調外症潮熱內腹痛○潮熱者二陳湯加芍藥歸

潮汗則血愈消耗有咳喘則氣往上行瀉則精偏於後疼則積結於中是以必先去

病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤為婦女常病蓋血滯則骨蒸熱於外血枯

血滯積於中與日生新血相搏則疼痛為痛血枯不能滋養百滯入骨髓便為骨蒸

胞絡火盛或扶氣積寒冷外邪則為疼痛血枯不能滋養百滯入骨髓便為骨蒸

感為寔虛者大溫經湯熱者四物湯加黃連胡黃連○潮熱者二陳湯加芍藥歸

烏鷄經丸五心潮者一物湯加黃連胡黃連○潮熱者二陳湯加芍藥歸

遙散經前潮者一物湯加黃連胡黃連○潮熱者二陳湯加芍藥歸

痛滯經前虛後呼

斤蜜丸服一痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事後行腹痛者大玄胡索散或四物湯加芍藥歸

經候

廣益書局印行

中國醫藥大學圖書館藏

胡索吐丹皮甘草。經後痛者為血虛。八物湯。小烏雞丸。歷年血寒。積結胞門。嘔吐涎。黃九。滋陰百。水腫經前血腫後。經水不通。名曰水腫。更難治。但能調其經。則水自消。小調經散。紅花有。血風身痛痺皮膚。水不通。名曰水腫。更難治。但能調其經。則水自消。浮肌肉為之虛腫。紅花有。血風身痛痺皮膚。水不通。名曰水腫。更難治。但能調其經。則水自消。經閉脚腫者。桑皮散。血風身痛痺皮膚。水不通。名曰水腫。更難治。但能調其經。則水自消。身痛白芍。經先期者。蒼步丸。加蒼耳白芍。龜板金牛膝甘草水煎。頭眩者。上攻頭目。一切。搔痒者。四物湯。加荊芥。或古烏荊丸。肌肉頑麻者。烏頭丸。上攻頭目。一切。單蒼耳散。頭項痛者。榮明調經湯。肌肉頑麻者。烏頭丸。上攻頭目。一切。參荊芥散。素虛者。女金丹。史養胃通心真要法。經日二陽之病。發心脾。胃經。絡之海。與手太陽小腸手少陰心為表裡。主上為乳汁。下為月水。月水起於胞內。為經。絡。任氣結。則血瘀。時而下。愛思耗傷。心金失養。水絕火炎。血不歸肝。而出。納之用。已竭。再令子虛。脾亦不磨。而食少。食少則肺金失養。水絕火炎。血不歸肝。而出。納之用。已竭。再心為氣血之主。氣鬱結者。宜調心。斷者。只宜。平胃散。四君子湯。之類。補血養脾。胃而氣血自生。自道。乃室女扶陰抑寡居。女子十四。配可。見陰氣之難成也。或近二十。標本兼治。法之良者也。紅花當歸散。紫葳散。單大黃散。如適年酸煎炒熱。燥以致氣血上壅。不通者。紅花當歸散。紫葳散。單大黃散。如適年未嫁。或年未及。而思男。思傷心。血大。脾虧。肺燥。腎枯。而血閉。成勞者。十分難治。宜子。經絕不通者。瓦松丸。亦好。因怒逆者。四製香附丸。加黃荅。生地。因驚者。抱膽丸。赤心煩。或時自汗。肝脈弦張。當抑肝之陰氣。柴胡抑肝湯。抑陰地黃丸。望子。孫或感心大。無時不起。加之飲食厚味。遂成痰火。其症惡風。體倦。乍寒乍熱。面赤。如貧苦。淡食者。四製香附丸。主之。有每日上午神思昏憤。怕見明處。惡聞人語。至午後方可及。頭昏目痛。驚惕。稍涉勞動。與月經來時。其症尤劇。此不得遂志之故。

也宜清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神
子守舍或時獨笑或泣脉違伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜扶神羌活蔓荊
門冬石菖蒲黃芩甘草水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄血熱則流虛則溜凡非時血行淋瀝不止
應五虛多房勞挾火邪經行犯房及勞役過度傷氣血大溫經湯氣虛者四物湯加參

痛者伏龍肝散一切虛症內灸散虛大涼血地黃湯生地黃芩湯補陰丸久服
者當歸部骨丸熱則飲食不調節有因膏粱厚味以致脾濕下流於腎與相火合

血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單苓心丸四物塊離丸固經丸有因飲食失節火
乘脾胃下陷顏容似無病者外見脾困倦煩熱不卧等症經水不為四氣相搏則血

斷只宜舉養脾胃加以鎮墮心火之藥補或四氣苦相侵亦難停大風冷搏動血
陰瀉陽自止升陽調經湯升陽舉經湯或四氣苦相侵亦難停大風冷搏動血

者五積散去麻黃入醋煎服或不換金正氣散加川芎官桂或四物湯加荊芥○寒
冷所乘及年老崩者服龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服○暑月單

霜○濕者升陽除濕湯或為悲憂心痛切則心下崩數洩血也宜備金散四氣香附
宜西藥湯或橘歸丸○憂鬱因先富後貧先順後逆心不足火旺於血脈之酒中

調服○心痛甚名殺血心痛小產後血過多勢急須宜止且行崩日陰搏陽謂之

崩乃經血錯亂不循故道淖溢妄行遲止便有積瘀凝成塞白不止又惡昏暈必

服五靈脂散去故生新如更不止【烏紗帽散】十灰散養胃安心還舊血後血崩已

單五靈脂散【古黑神散】單夏枯草膏有火者【固經丸】虛者女金丹

【古黑神散】單夏枯草膏有火者【固經丸】虛者女金丹

【古黑神散】單夏枯草膏有火者【固經丸】虛者女金丹

【古黑神散】單夏枯草膏有火者【固經丸】虛者女金丹

物湯加炒乾薑調之氣弱加參芪有帶加香附扶火加芩連少許更服二宜丸
物湯以還舊血免致孤陽防其再發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者
膏滋陰寧神湯此疾有心血不足者有心火亢甚
者若不早治變為白濁白淫血枯發熱不可治矣

帶下

帶下赤白皆濕熱。臍腹甚痛濕熱結。

經曰小腹寬熱洩出白液究者濕熱。小腹痛自胞上而過帶脉出於大熱。便閉或下痛。

淋瀝以下故曰帶下。赤屬血白屬氣。其症頭痛目眩口苦舌乾咽嗌甚則肚腹閉或下痛。婦人服食燥熱性行赤白崩漏一氣旺脾而痛生濕熱則痛通古以幸溫開導丸下痛。

之續以淡劑滲之或行赤白崩漏一氣旺脾而痛生濕熱則痛通古以幸溫開導丸下痛。大溫經湯一補經固真熱多瘦婦必潮煩也。度人多熱脉數外症朝煩乃陰虛火。

湯二龜柏羌梔丸一補經固真熱多瘦婦必潮煩也。度人多熱脉數外症朝煩乃陰虛火。兩生地五兩酒十蓋煎至三蓋分三次服或白芷散單益母丸。白帶兼風。

者二陳湯加蒼柏南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者蒼柏辛芎散兼上情者側柏湯。皮濕勝肥黃痰作孽。肥人多濕身黃脾緩陰戶如水或痛白帶升陽燥濕湯四炒固。

丸濕勝肥黃痰作孽。肥人多濕身黃脾緩陰戶如水或痛白帶升陽燥濕湯四炒固。蒼栝樓皮丸如結痰白帶淋瀝不已者先以四物湯或單栝樓皮炒為末酒糊丸。

蒼栝樓皮丸如結痰白帶淋瀝不已者先以四物湯或單栝樓皮炒為末酒糊丸。血虛加四物湯氣虛加參求陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹。

血虛加四物湯氣虛加參求陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹。乾姜間有虛寒帶臭腥陰中冷痛何曾歇。虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或經後去血。

乾姜間有虛寒帶臭腥陰中冷痛何曾歇。虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或經後去血。下陷精氣累滯於下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂經固真。

下陷精氣累滯於下焦蘊積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂經固真。水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者寒加桂附。

水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者寒加桂附。湯一大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附。

湯一大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附。寒始因亡血復亡其陽七氣虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者外感。

寒始因亡血復亡其陽七氣虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者外感。四物湯加桂附常用酒者當歸丸小烏雞丸金斯丸琥珀調經丸外感。

風邪傳各經

風邪傳各經。津肺經白形如涕脾經黃如爛肝經青如泥色心經赤如紅。

積散
通用
〔單地榆散〕
〔去麻黃主〕

一種白淫思慮切

為思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發
為筋痿久為白淫謂白物淫如白精之狀如

歸脾湯
思過少
食所

致誠難治，療宜平補。

鎮心丹因思傷脾者【四七湯】下【白知母】或

水或當風取

陽經過水多止產而後亡血

下宜琥珀砂丸。孕婦帶下。全是濕熱。宜煬宮丸。加薑

上桂附
而加吳
冬當英
不歸或
土水黃
煎煎茂

補衛調脾

循故轍湯或用收斂如伏龍肝散白芷散然暫

虛則血液無所

燥水健脾胃者或用

理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用芍歸煎湯

癰疽
聚與
條男
卷子

看積

皆全而不足，及方全而能多。二教人受，聖下

瘰癧不瘰者大瘰

癰疽。其為痛。

所以異於男子者皆曰疾發及經水行時或

移熱於小腸。小腸有瘕。瘕。腸。胃。

移熱於大腸兩熱相

種不一盡皆痞塊之異名耳。經云大腸搏則血溢而為伏瘕。月事不和。以此推之。瘕

外貼三聖膏神

虛冷者【內灸散】
久不愈者

琥珀丸
猪肝丸
温白丸
辰砂一粒丹
熱者消塊丸
神聖代針散
連羅丸
癰

餅熨痛處或萬應
氣湯熱者大

承氣湯一

芍藥、姜、甘草、或單黃連丸、小調中湯、加貝母。

飲【潤下丸】或

二陳湯一加香附枳壳

元桔梗。痰食積者。『白芥丸』。『海石丸』。腹痛。

青交

月

廣益書局印行

經閉如懷胎。面黃寒熱夢無數。
月事不調。如懷胎之狀。邪氣甚盛。令人恍惚。夜多惡夢。
 廠廠不得冷。則發腹痛支滿。胸脇腰背相引。四肢疼痛。

夢寒熱往來四肢不舉陰中生瘡甚者小便淋瀝或兼帶下小腹腫痛面色黃黑入

子肺則經產入於胞絡則經閉宜【人參荊芥散】
【小溫經湯】
【逍遙散】
【通經散】

血瘀玄胡索散手拈散失笑散單乾漆丸數症因痰瘀氣積者與上諸方通用疔瘡癰疽

治頭相同
症者在腹內近臍左右各有一條筋脉急痛如臂如指如弦之狀名曰瘕
瘕者偏在臍左或右各有一條筋脉急痛如臂如指如弦之狀名曰瘕

博而咸亦復長不令下
【紅丸】
【猪肝丸】
【易上】

得冷則發。臍腹不食亦可懼。小烏鷄丸。葱白丸。腸覃可按血自通。客於大腸與

胃相搏日久不已，肺傳肉，乃生口瘡。口瘡治之，宜清氣散而濁氣結，而為

少氣病而血未病也宜一陳湯

石症塞胞經無路上衝乃胞中傷損瘀血結壅久

則堅硬如石，塞於子宮，大如懷胎。月事不下，乃先感寒氣而後血壅不流所致。血

血盛口大者，血重為難治。血者，三虫聚而食之，象即癥瘕之甚者，吐

妙氣壅血壅。女不水。壅脹。似瘰癧。腹急硬如石。腫滿如水。乃癰結胞門。或產後

為水與血搏通用四香散千金挑仁煎內消散蝦蟇煮肝法調氣破血漸消除虛者

胎前

【胎前】清熱與養血。

婦人無病。月事時下。乃能受孕。氣血充足。實則可保十月分娩。無虞。若衝任不充。偶無受孕。氣血不足。榮養其胎。宜預服。

珍湯補養氣血以防之免其墜或原有熱而後受孕或孕後挾熱及上情勞役動大輕則胎動不安重則遇三五七陽月必墜大能消物故也宜安胎丸常服以清其

大輕則胎動不安重則遇三、五、七陽月必墮火能消物故也宜安胎丸常服以清其

勝神氣完。

九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其身足少陰脉所主。十月受

「達生散」。

素太肥經無所專主者以君王之宮無為而已。此兩月素難產者。牛產須

三七月。

凡半產多在三五個月及七個月內。若前次三個月而墮。則下次必

過五月。

又服至六個月。胎藥數服。以氣血固。胎元之藥。以補其虛。損而墮。則下次

感併雜症。

肌體微傷。寒詳見三卷。尋常感風咳嗽。頭痛發熱。參蘇飲去柴胡。夏間有傷

苦腹滿痛。

大便清者。大正氣散。去牛夏。加吳黃阿膠。去硝黃。麻黃石羔。飲去柴胡。夏間有傷

吐膽下苦。

急者。香茹散。合古苓求湯。或十味香茹散。感暑眩冒。煩渴尿赤。驚悸。嘔

紫蘇飲。

內傷勞役。以後加砂仁厚朴蒼朮。內熱加黃芩。內傷七情。氣滯不行者。一

散房勞者。

八物湯。加山查麥芽黃連。為內傷風升麻。為酒腥。連理中。內傷治之。泄甚。加

明頭痛。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

感寒致胎。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

原謂風冷。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

服藥忌。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

久不愈者。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

傷冷瘧。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

不寧熱者。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

行屬陰。

白胎項強者。消風散。或四物湯。加熱酒。連理中。內傷治之。泄甚。加

上焦為三禁。不可絕汗。屬太陰。胎產之病。治厥陰。下則傷脾。利之

四物湯。為主。如傷寒。各經下利。減法。例。莫若外感。時氣。從四物湯。小

藥物。合理。中。古。求。傷。寒。最。妙。雜。病。四。物。湯。四。君。子。湯。二。陳。湯。加。減。胡。陰。症。四

藥。而。不。致。胎。動。者。乃。病。曰。婦。人。重。身。實。也。豈。有。可。視。為。常。法。且。陰。陽。調。和。家

有。病。亦。不。必。太。攻。也。經。曰。婦。人。重。身。實。也。豈。有。可。視。為。常。法。且。陰。陽。調。和。家

者不可妄服藥餌三五個月前一毫辛散滑利及難產斟酌用之八月間胎動心腹腰作疼甚

則下血如經行或因上情氣不順或因外感風寒凝

受胎不堅或因驚恐或因喜怒不樂

登廁風冷攻入陰戶以致胎動而母心腹作痛甚則腰腹痛下血當安胎而母者受胎不樂

飲加柴胡大腹皮氣血虛者理中湯加砂仁倍香附熱者黃芩湯胎動不安胎前

者須辨寒熱虛實寒者理中湯加砂仁倍香附熱者黃芩湯胎動不安胎前

胃散加蘇鹽煎湯各二宜心白湯氣虛痛者四香附子湯加黃芩湯胎動不安胎前

香附子湯加黃芩湯胎動不安胎前

豆蔻湯去地黃陳茯苓等分入煎服單方梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

四物湯去地黃陳茯苓等分入煎服單方梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

古芎歸湯加狀芩厚朴等分入煎服單方梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

為緊急酸痛者必飲酒者用鯉魚和梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

為緊急酸痛者必飲酒者用鯉魚和梗枳殼甘草水煎服等分空心腹物湯者或平

角五錢火煨肉一個研勻空心酒調服○素蘇飲加杜仲續斷因閉者用破故紙腰二錢

加砂仁秦艽酒再燉兩心酒調服○素蘇飲加杜仲續斷因閉者用破故紙腰二錢

野苧根金銀花根各五錢水酒各半杜仲研末酒調服○素蘇飲加杜仲續斷因閉者用破故紙腰二錢

下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服○素蘇飲加杜仲續斷因閉者用破故紙腰二錢

知母有宿疾而胎不旺者長白求丸如贏瘦多氣枯渴但有因母病而致胎動者

膝四分木香桂心蠅爪各二錢分末白求丸如贏瘦多氣枯渴但有因母病而致胎動者

五兩清酒十盞煎二沸去渣分末白求丸如贏瘦多氣枯渴但有因母病而致胎動者

或參芽神麵煎服尋常古芍歸五服最妙○宿孕再服或從早服之其子如康令母肥元無疾

腹其胎即下血者用砂仁畧炒勿焦為末○宿孕再服或從早服之其子如康令母肥元無疾

熱安寧通安胎家無所不治功同芩朮如熱去酒鹽湯或從早服之其子如康令母肥元無疾

總安寧通安胎家無所不治功同芩朮如熱去酒鹽湯或從早服之其子如康令母肥元無疾

榆腰痛加杜粉用古芩朮湯加阿膠風邪加白朮如熱去酒鹽湯或從早服之其子如康令母肥元無疾

夏越勞役加黃芪驚悸加黃連煩渴加白朮如熱去酒鹽湯或從早服之其子如康令母肥元無疾

精校醫學八月

卷六 胎前

廣益書局印行

墮胎加杜仲素血虛加芎歸此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服則五日十日一服常服安胎易產所生男女又無胎毒蓋妊婦脾土運化邊澤則生濕則生熱故用黃芩清熱以養血白朮健脾以燥濕安胎九金匱當歸散加味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛 心腹不痛而血者為胎漏血多為熱少為虛熱者下血必多內熱者下血必多內熱者下血必多

來連益母草或金匱當歸散加味養榮丸血黑成片者三補丸加香附白芍加白芍加白芍

因勞役感寒以致氣虛下血欲墮者芎歸補子湯或下血如月信惟有花柳難救

亡胎漏乾有肥或婦人月水當來者或房事不調服藥亦或無意而

偶然尿血莫糊糝物血有尿門下血髮天單苦費菜飲亦妙因暑者益元散加升

煎湯下稍虛者膠艾四物湯又者

惡心阻食名惡阻 氣引動或吐或時吐瀉水惡聞食臭由子宮經絡於胃口故逢食

官穢或過瘦人多熱肥人痰因二陳湯加竹茹生薑熱加芩連亦有無音并氣弱

則嘔者陰脉必弱頭痛全不入食者八物湯合二陳湯加枳梗氣弱者四君子湯加

陳皮麥門冬厚朴竹茹日久水藥不入口吐清水者二陳湯並加丁香惡聞食氣多臥少起

者或胎動別症兼胎飲兼癰病口中無味及會傷風冷者醒脾飲子兼傷食

花散或二陳湯加砂仁香附或單白朮為丸或

子煩 躁悶亂心神火盛尅肺好生嗔問相火用事或應天令五六月間君火大行俱能乘肺以致煩躁胎動不安大抵相火盛者單黃連丸心火盛者單黃連丸心火盛者單黃連丸

甚忌傷胎者單胎散或有停痰胸膈滯亦令煩躁不宜人之間亦令煩躁胎動不安

【子懸】心腹脹滿胎氣湊心相火關逆婦四五個月以來相火養胎以子懸為病

有鬱心腹脹滿甚者加我求及丁香少甚則悶絕欲傷人而死或極一時心懸

藥【子死】不能動此症兩月脈絕者有誤服動胎藥子死腹中則增寒

虛腫浮姓孕經血閉以養胎中挾水濕與血相搏濕氣流溢挾冷面目肢體遍身

常亦堪憂姓孕五六個月腹大異常高過心膈氣逆不安胎中蓄水所致若不早治

消水散為度仍常有脚腫或出水胞漿大感故下流姓婦七八個月以來兩脚浮

流微腫者易產名曰皺脚腫甚者平胃散加木瓜扶外感者蘇散如脚腰腫者

膝腿喘而妨食甚至足指間有黃水出者謂之子氣宜天仙藤散

腎著湯分手脚腫重者加商陸

【姓孕】中風名【子癇】只因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有時昏暈胎難安

而傷太陽之經絡後每遇風寒相搏發則口噤背強痰涎壅盛昏暈不識人時醒時

作謂之鬼暈又曰子癇又曰瘧甚則角弓反張小續命湯如重者羚羊角湯輕者

散如中風寒犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎不安常苦頭疼痛連臍下寒時時小便白

如當歸厚朴韭白姜煎入酒調服不省人事者單【荆芥散】

【子淋】溺澀膀胱熱。姓學飲食積熱。膀胱以致小便閉澀。又謂之子淋。宜古芳歸。

【五淋散】原因房勞內傷。胞門腫住。其則大小便閉結。赤茯苓等分。大腹黃。

甘草或半慈白煎服。或用冬物湯。加黃芩厚朴枳殼。米飲調服。轉脬溺痛閉難當。

不通身重惡寒。頭眩者。用冬物湯。赤茯苓等分。為末。米飲調服。轉脬溺痛閉難當。

轉脬者。脬係轉床。膝下急痛。其胎小便不通。多稟弱性急。厚味者。有之。轉脬溺痛閉難當。

展在一邊。脬係轉床。膝下急痛。其胎小便不通。多稟弱性急。厚味者。有之。轉脬溺痛閉難當。

虛探吐以提之。無他者。亦同。不可專用滑泄之藥。有素肥感忽瘦。兩尺脈絕者。去。

古苓求湯。合益元散。服之。赤茯苓等分。水煎。入髮灰少許。有熱者。去。

○產後有轉或將出者。搗葱白。於臍上灸之。立効。如欲服藥。與胎前大。遺尿赤。

白宜分別。姓乎遺尿。古方用白薇白芍等分。為末。三錢酒調服。胎前大。遺尿赤。

【子瘡】腹鳴自笑悲。姓孕三五個月以來。忽失音。不語者。胞絡絕也。胞繫於腎。

年空房下。鼠穴中土。為末。酒下。或乾嚙之。即止。○腹中兒啼者。黃連煎濃汁。呷之。或。

青黛亦可。○有臟燥悲傷。慘感。嘔下者。大麥甘草煎服。○有自哭自笑者。紅棗燒。

飲調服。**【發痘】**動胎命必絕。胎前患痘。必死。詳痘胎諸症。濕痰風熱虛去邪保胎真。

【口訣】孕婦脾土不運而生。濕氣也。轉脬虛也。清熱生風。如子腫濕也。惡阻疾也。子煩子。

【飲食】禁忌亦須知

無難肉。飽鯉米食。令子生寸白虫。食犬肉。令子。

鮮魚同雞食。令子寤。崔肉同魚。令子短縮。頭鴨子。食。令子生。白虫。食犬肉。令子。

指食水漿。令子墮。食崔肉。令子多淫。無胎。食。令子短縮。頭鴨子。食。令子生。白虫。食犬肉。令子。

而天食雀腦。令子患雀目。勿妄服湯藥。少步動。和血。脈勿過勞。力過傷。使腎氣不足。險。



必解顧腦破不合衣母太溫食母太飽若轉女求男皆古訣。生男生女陰陽造化玄
脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病或之蓋弓矢斧斤男子事也。勿令夫人知此意恐
內以斧置孕婦床席之下懸弓矢於壁蓋弓矢斧斤男子事也。勿令夫人知此意恐
信者令待鷄抱二卵之時以斧置巢下蓋花亦可三法皆驗用其一可也。又後
更佩雄黃胎殺雖不可泥然門戶床竈實不可輕易移動求嗣者尤宜慎
有月日時胎殺雖不可泥然門戶床竈實不可輕易移動求嗣者尤宜慎

臨產

臨產切不可慌忙

十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何候
性急者腹中切莫惶惶或作或止名弄霜漿水淋瀝來少名試水雖臍腹後之患中
并腰痛眼中如火切莫坐臥不安須臾待兒頭直順且正逼近日子已到腹痛陣
太早用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及臨產
不運動又食生冷硬物凝滯或接石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產
雜之人驚恐產婦恐則精怯精怯則上焦關閉則氣還下焦脹而不行或臨產
妙氣實者瘦胎散甘活血安胎未破漿血如腹痛漿水未破而止痛雖痛而不密宜安胎
散氣弱者達生散以固胎元切勿輕用峻藥徒傷水道反傷破漿已久猶難下破水
飲或達生散以固胎元切勿輕用峻藥徒傷水道反傷破漿已久猶難下破水
胎氣而產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過眠過飽耳破漿已久猶難下破水
血乾澀必用古黑神散每血虛者古黑神散每血虛者古黑神散每血虛者古黑神散
四君黑神散橫通鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布袱於蔥上輕服此藥後
外用蔥二斤搗爛鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布袱於蔥上輕服此藥後
滑利迅速要相當產則氣散血滯宜五苓散加葵子或三退六散一散冬月凍產則血
凝滯常令房中火煖宜催生五積散或六散一散冬月凍產則血
清油白蜜等分豬肝煮汁調服或六散一散冬月凍產則血
產難日久水乾又觸犯惡氣心煩躁悶者免腦丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢
辰砂五分為末雞子清調薑汁化開冷服○**橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘**
已上正產難之法以下橫逆側碍之法

精校醫書
卷六
臨產
廣益書局印行



兒先露手原因腹痛兒身未轉產母用力一過遂至橫來當令產母安然仰臥洗固
輕手徐徐推兒稍上漸漸以中指摩其肩推上又舉其耳而正之服芎歸黑神散固
血生血須待兒身正直且順臨門服阿膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後
方可用生血送下○逆者先露其足分毫不得驚恐服一匙直上令兒頭一過漸順下
安然仰臥久不生却徐推足入去推足令就一匙直上令兒頭一過漸順下
順若經久不洗母徐推足入去推足令就一匙直上令兒頭一過漸順下
服芎歸等藥直待兒身轉門路正當**坐產露臀高舉手**手巾一條先露其臀當以手攀之
然後用三退散調服方可用力送正當**坐產露臀高舉手**手巾一條先露其臀當以手攀之
服同血藥輕屈嘆面貼頂救**盤腸**小腸者小腸先出急用熱水浸軟布蓋住頭頂中
足長久兒輕屈嘆面貼頂救**盤腸**小腸者小腸先出急用熱水浸軟布蓋住頭頂中
調停久即拭去內兼服芎歸參芪大補之藥當收盡為度又以如聖膏貼住不敗者又
心腸上即拭去內兼服芎歸參芪大補之藥當收盡為度又以如聖膏貼住不敗者又
久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用磁石煎湯
蓋服之其**磚產兒肩臍帶絆**能生當令產母仰臥洗母輕推兒近上徐徐收手
以中指托起兒頭下其臍帶服固血當令產母仰臥洗母輕推兒近上徐徐收手
藥仍須候兒身正順方可用力送下**露額側來墜腿尻**側者因兒方轉身被產母
左腿忽偏墜臥即徐推兒近上當令產母仰臥洗母輕推兒近上徐徐收手
產母偏墜臥即徐推兒近上當令產母仰臥洗母輕推兒近上徐徐收手
骨偏墜臥即徐推兒近上當令產母仰臥洗母輕推兒近上徐徐收手
兒頭上而正之服催生藥後即令產母以綿衣溫令煖用多服芎歸黑神散令
用力送下此非洗母輕生藥後即令產母以綿衣溫令煖用多服芎歸黑神散令
而產有種一年至四年五年而產者盡皆皇用力太早之過或因子欲生時
兒枕先破服一血裏宜鹽豉一兩以青布包了燒存性入麝香一錢為末用子
紅酒調服一血裏宜鹽豉一兩以青布包了燒存性入麝香一錢為末用子
心皆能遂服以開產路○宜新汲水磨京墨服之墨水裏兒身出或芎歸益母草
子交骨不開難產者**龜壳散**或**古芎歸丸****胎兒母舌黑非常**食外症指甲青黑服石女
湯通用**無憂散**來麝散**兔腦丸****胎兒母舌黑非常**食外症指甲青黑服石女
加朴硝五錢調服昏沉脉微者養正丹濃煎乳香湯下一百二十九丸血乾或單鹿角
末葱鼓煎湯調服昏沉脉微者養正丹濃煎乳香湯下一百二十九丸血乾或單鹿角