

周氏醫學叢書



評點葉案存真類編卷下

古吳葉桂天士甫箸 皖南建德周學海濶之類評

元孫萬青輯錄

溫熱

冬溫春溫伏氣
新感挾虛挾飲

冬溫爲病。乃正氣不能藏。固熱氣自裏而發。齒板舌乾。脣燥。目微紅。面油亮。語言不爽。呼吸似喘。邪伏少陰。病發三焦。皆受仲景謂發熱而渴者爲溫病。明示後人。寒外鬱。則不渴。飲熱內發。斯必渴耳。治法清熱。存陰。勿令邪熱焚劫津液。致癰癧瘍厥神昏譖狂諸症。故仲景復申治療法云。一逆尙引日。再逆促命期。且忌汗忌下忌辛溫。九日不解。議清膈熱。

飛滑石 連翹 淡黃芩 鬱金汁 竹葉心

天花粉 橘紅 苦杏仁

朱先生勞倦嗔怒。是七情內傷。而溫邪感觸。氣從口鼻。直自膜原中道。蓋傷寒陽症。邪自太陽。次第傳及。至于春溫夏熱。則鼻受氣。肺受病。口入之氣。竟由腕中。所以原有手經見症。不比傷寒足六經之病也。其原不同治法亦異。仲景論溫邪不可發汗。汗則劫津傷陽。身必灼熱。一逆尙引日。再逆促命期。又云。鼻息鼾。語言難出。劇則驚癇瘛瘲。無非重劫津液所致。今病發熱。原不是太陽客邪見症。所投羌防辛溫表汗。此誤卽爲逆矣。上竅不納。下竅不便。亦屬常事。必以攻。

辭不見此。張皇失措。

下希圖泄熱。

時醫通弊亦或暫效。病家信之。遂致於死。

○攻下原可泄熱。必須邪熱入在腸

胃。堅實有形。不得但據下竅不便。便謂陽明已實。蓋氣結津傷。有如此者殊不知。強汗劫

津而傷陽。妄下劫液更亡陰。頃診脈兩手如搖而戰。

舌乾燥而無胎。前板齒乾。目欲瞑。口欲開。周身燈照

而淡晦。班紋隱隱約約。幾日來時有呃逆。傷寒絕穀

俗例可悵。作倅者其無後乎。氣而中空。肝陽衝突。上冒肆虐耳。爲今返正先與糜。

粥使胃中得濡。厥陽不致上冒而神昏之累可已。進

藥之理。甘溫可以生津除熱。卽斑疹亦不足慮。觀仲

景論中邪少虛多。陰液陽津並涸者復脉湯主之。謹

倣此義。

風寒久鬱化熱。皆爲癰疹。況本溫病誤用辛溫耗津。但生津開鬱。逐穢透表。邪得宣泄。疹

自退矣。斑疹不足慮。真卓識也。

炙甘草

人參

生地

白芍

阿膠

麥冬

方

宜加龍蠅。防逆意爲有瘧也。

邪氣甫及中焦。

五十七歲豐腴體質適值過勞陽氣受傷嘔吐食物無頭痛身熱已非外感風寒而間日煩躁渴飲脣焦舌黑是內伏熱氣由募原以流布三焦亦如瘧邪分爭營衛者然然有年積勞既久伏邪客病本輕脉小緩按之不爲鼓擊可爲徵驗且二便頗通略能納穀焉。未入下焦無裏證是陰未大陽邪有停滯積聚仲景於癰熱無寒之條不出藥方但曰以飲食消息後賢參聖意甘寒以養胃陰其熱自解要知表散之辛溫消滯之苦溫以及苦寒沈降多犯聖訓戒律矣。此卽溫瘧。

鮮生地

甜杏仁

麥冬

花粉

竹葉心

青蔗汁

連翹

據證是有瘀血凝痰停於胃中。方味少活血之品。恐未能效。可加桃仁。

茜草焦
杏青皮。

勞倦伏邪。初起卽用柴胡紫蘇。三陽混散。津液被劫。熱邪上結。胸中懊憹。神煩譫語。渴欲冷飲。診得脉無神。舌色白病在上焦。氣分。閱醫藥不分上下氣血。況冬溫氣泄。老人積勞。七日未見病退機關。此屬重症。豈可藐視輕談。

○瓜蔞皮

黑梔子

白杏仁

鬱金

香豉

枳殼汁

生津通表。疏泄胸中結氣。恐力小未能勝任。然方却甚靈巧。老人真氣虛。最怕中焦實結。攻補棘手。遂成不治。是以

病在上焦。方中已兼清中焦矣。

汪天植 脉數如浮重。按無力發熱。自利。神識煩倦。咳
嗆痰聲如嘶。渴喜熱飲。此非足三陽實熱之症。乃體
屬陰虛。冬月失藏。久伏寒邪。已經蘊遏化熱。春令陽
奉生者少陰津不足供陽氣之發泄也。
升伏邪隨氣發泄而病未及一旬。卽現虛靡不振之
象。因津液先暗耗於未病時也。今宗春溫下利治。

淡黃芩 杏仁 枳壳 白芍 鬱金汁 橘紅

積勞伏熱。值初冬溫暖。天地氣不收降。伏邪因之而發。
是爲冬溫實非暴感。表散無謂其痰喘氣促。左脇刺
痛。係身中。左升不已右降。失職。高年五液已衰。炎上
之威莫制。脉現左細右搏。尤屬陰氣先傷。煩勞兼以
嗔怒。亦主七情動陽。從來內傷兼症。不與外感同法。

苦辛劫燥胃津陰液日就枯槁故仲景凡於老人虛

體必以甘藥調之夫喘咳之來固是肺熱以診脈面

色論之爲下虛正氣不主攝納腎病何疑卽初起熱

利亦是陰不固擬用復脉湯此用復脉不及朱案貼切。

炙甘草 細生地 炒麥冬 生白芍 麻仁
蔗漿

溫邪兼勞倦從內傷治已獲小效獨左脇痛難轉側咳

嗽氣觸必加閃痛想因平素操持肝陽易熾營陰暗

耗非肝陽也乃肝陰鬱結也。陽熾者必頭顱眩暈腦

額空脹孔竅乾搶也。近日皆誤以肝陰爲肝陽桑菊芩膽日日澆灌愈澆愈鬱將真火悶熄而死。仍謾

肝陽莫制可慨也。凡飲食勞倦所傷中樞不運則清陽不升濁陰上逆東垣真識高千古內經以肝爲將軍之官謀慮出焉。

肺管更室矣

凡咳多是新感若清肺熱

之品

不

合

不

合

不

合

不

不

故身中左升之氣屬肝主之右降之氣屬肺主之。今面微赤而咳頻前此上焦畏熱煩燥其左升之令不已右降之氣失司已經洞悉經以左右爲陰陽之道路升降周行一日夜行五十度平旦交會於氣口既爲拂逆情志而裏氣鬱遏冷熱外加營衛因之窒阻此陰陽道路流行或遲或速無平日清明之氣是以發散消導清火利痰之品味於身中轉旋有若天地也再論平昔精力頗健今已大年下焦先虛夫下虛者上必實眩暈神昏自利可見矣以冬令藏聚返根之候見症若是爲忽然中厥亦屬常有此亦痰閉若氣離根非常有矣此投藥之難自宜瞻前顧後議用錢氏地黃湯意栽培三陰臟陰。

疎其三陽腑陽。俾臟主藏。府主通。佐以酸降理逆。穀味有加。再爲進商可也。

○熟地 白芍 山藥 澤瀉 丹皮 茯苓

牡蠣 阿膠

山塘 七十五

立冬未冷。溫熱之氣外入。引動宿飲。始而

狀如傷風。

是真新感。

稀痰數日。繼則痰濃咽乾。是少陰脉中乏

津上承。五液盡化痰涎。皆因下虛易受冷熱。是以飲

邪上泛。老年咳嗽。

有外邪不拘此例。

大要宜調脾腎。最忌發散泄肺理。

嗽暫用越婢法。

麻黃 石膏 甘草 芍藥 生薑 大棗

章 暴冷外加熱。氣內鬱。肺窒不降。脘悶如饑。水飲欲

嘔頭痛寒熱當治上焦

案語
簡切。

桔梗 象貝 橘紅 兜鈴 北沙參 杏仁

吳風溫上受飲邪。上泛臥枕則嗽甚。飲陰類也。先以輕揚肅上。再議理飲。

桔梗 兜鈴 米仁 茯苓 通草 象貝

急火煎服一次

又案 輕可去實。恰當上受風溫。但左脇引動而咳甚。經言左升太過右降不及。然非肝木之有餘。雨水春木萌動氣升上衝。皆血液之少。不主配偶之義。

甜杏仁 玉竹 甘草 桃仁 炒麻仁

冬溫咳嗽。忽值暴冷。外寒內熱。引動宿痰。伏飲。夜臥氣

沖欲坐。喉咽氣息有聲。宜緩護安居。從痰飲門越婢法。

○麻黃 甘草 石膏 生薑 大棗

外寒內熱治法

王廷佑 寒包鬱熱亦屬溫邪。

○桔梗 大力 連翹 蘇子 滑石 枳殼

赤芍 木通

溫邪有升無降。經腑氣機交逆。營衛失其常度。爲寒熱。

是。有△新△感△。

津液日耗。渴飲不饑。陽氣獨行。則頭痛面赤。是皆冬

春驟煖。天地失藏。人身應之。患此者最多。攷古人治

溫病。忌表散誤投。卽謂劫津逆傳。心包最怕神昏譫

語妄狂。治法以辛甘涼潤爲主。蓋傷寒入足經溫邪。

忌直用表散也。辛甘涼潤生津清熱。仍從汗解。

入手經也。上潤則肺降，不致贔鬱。胃熱下移，知饑渴解矣。

嫩竹葉 桑葉 杏仁 薡汁 麥冬 生甘草

石膏

水淨糖炒

陳

診脈左帶微數。右關微弦。胸脘痞悶。右眼角赤。皆

是肝木乘坤土。經旨有腎藏志。脾藏意。今夢寐驚惕。是見不藏之象。倘調養失宜。內有七情之擾。外有六

淫之侮。再經反覆。藥餌無過。樹根草皮焉能有濟。故

重言以申其說。

脉證皆痰氣固結之象。但燥痰是虛。燥滯結。宜生津以潤之。不宜辛熱淡

滲以燥之。

人參 半夏 枳實 茯苓 乾薑 小川連

第二案 六脉略和舌胎已退胸院稍寬渴飲至胃微覺呆滯大便乾燥勢見陰枯陽結通陽之中佐以潤燥亦屬至理至於調養靜攝工夫不必再贅。

柏子仁 蔴蓉 歸鬚 炒桃仁 塊荅 桂心

從容大礙通陽下四方不離此味只因腎燥便艱何不選用甘滑辛潤而必須鹹潤耶

第三案 立夏日診脉氣和病情減清晨微覺氣悶陽

氣尙未全振再論人身中陰陽二氣每相眷顧陽病

久必傷陰陰病久必傷陽故病久之體調養失慎必至反覆諄諄至囑進芩桂朮甘湯以宣上鬲之陽。

第四案 年過五旬腎氣本弱病纏日久脾土亦餒腎惡燥脾惡濕經旨昭昭若欲平穩宜乎分治爲妥是

將來調補丸藥章旨。今上鬲已寬，且進下焦調補爲法。

茺蔚 護身 杞子 茯苓 小茴 柏仁

天冬 巴戟

牛膝

茺蔚最傷心陽，最助脾溼，歷驗之矣。

第五案 痘減六七，惟納食不易，運化飲湯不易下趨。

口中味淡時或作酸，大便燥難，乃脾陽不振，腎陰未復，故潤劑之中佐以辛香，有合經旨，辛甘化風之意。

柏仁 小茴 芫荽 車前 茯苓 牛膝

歸身 桂心

第六案 脄神俱安，大便艱滯不爽，臍間隱隱作痛，高年腎陰暗虧，血液不能灌溉四旁，腸中枯燥，更衣頗

痰之飲之所之結之。

覺費力擬進通幽湯方法以潤之

臍間隱痛是痰癥所
是上前酸潤藥所

致方中宜加
桃仁山楂

歸鬚 紅花 郁李仁 柏仁 麻仁 生地

升麻

第七案 去酸潤反更衣矣其理顯然兩日連次更衣臍間疼痛已止胸鬲之間略覺不和則知病纏日久不獨血液受虧氣分亦爲之不振擬溫填藥餌佐以通陽庶幾中下兩顧

蓴蓉 塊苓 杞子 小茴 柏仁 牛膝

人參 巴戟

范升九 四肢作冷自利未已目黃稍退而神倦不語濕邪內伏足太陰之氣不運經言脾竅在舌邪滯竅

必少靈以致語言欲蹇法當分利佐辛香以默運坤
陽是太陰裏症治法是溼溫治法

生於术 草果仁 厚樸 木瓜 茯苓 澤瀉

第二案 身體稍稍轉動語蹇神呆猶氣機未爲靈轉
色脈非是有餘而濕爲陰邪不徒偏寒偏熱已也

生於术 石菖蒲汁 鬱金 茯苓 遠志

米仁

第三案 濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口起白瘡。

仍不渴飲開上鬱佐中運利腸間亦是宣通三焦也

生於术 寒水石 米仁 桔梗 廣皮 猪苓

澤瀉滲藥究宜少用。不渴飲者溼之結也，運中開上便可祛之。起白瘡者，熱之結也，滲利太過。