

玉機微義卷之二十一

消渴門

○諸經論消渴脉證所因

內經陰陽別論曰。二陽結謂之消脉。要精微論曰。瘵成爲消中。

按東垣曰。二陽者陽明也。手陽明大腸主津。病消則目黃口乾。是津不足也。足陽明胃主血。熱則消穀善飢。血中伏火。乃血不足也。結者津液不足。結而不潤。皆燥熱爲病也。此因數食甘美而多肥。故其氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭除陳氣也。不可服膏粱芳草石藥。其氣慄悍能助燥熱也。

逆調論曰。心移熱於肺。傳爲膈消也。

凡治消瘴。仆繫偏枯痿厥。氣滿發逆。肥貴人則膏粱之疾也。

岐伯曰。脉實病久可治。脉弦小病久不可治。後分爲三消。高消者。舌上赤裂大渴引飲。

脉經云。緊數相搏則爲消渴。○脉軟散者。當病消渴。○論消渴爲三焦受病。

病機云。消渴之疾。三焦受病也。上消者。肺也多飲水而少食。大便如常。小便清利。知其燥在上焦也。治宜流濕以潤其燥。消中者。胃也。渴而飲食多。小便赤黃。熱能消穀。知其熱在中焦也。宜下之。

消腎者初發而爲膏淋。謂淋下如膏油之狀。至病成。面色黧黑。形瘦而耳焦。小便濁而有脂液。治法宜養血以肅清。分其清濁而自愈也。

○論消中三證之異

陳無擇云。消渴屬心。故煩心致心火散漫。渴而引飲。諸脉軟散。皆氣實血虛也。消中屬脾。瘴熱減則爲消中。消中復有三。有因寒中陰勝陽鬱久。必爲熱中。經云脉洪大。陰不足陽有餘。則爲熱中。多食數溺爲消中。陰狂興盛。不交精泄。則爲強中。至病強中。不亦危矣。消腎屬腎。盛壯之時。不謹而縱慾房勞。年長腎衰。多服金石。真氣旣喪。口乾精溢。自洩不飲而利。經云

腎實則消。不渴而小便自利。名曰腎消。亦曰內消。

○論三消之疾。燥熱勝陰。

河間曰。三消之疾。本濕寒之陰氣極衰。燥熱之陽氣太甚。皆因乎飲食服餌失節。腸胃乾涸。而氣液不得宣平。或耗亂精神。過遺其度。或因大病陰氣損而血液衰虛。陽氣悍而燥熱熾甚。或因久嗜鹹物。恣食炙燂。飲食過度。亦有年少服金石丸散。積久實熱結於下焦。虛熱血氣不能制。濕熱燥甚於腎。故渴而引飲。若飲水多。而小便多者。名曰消渴。若飲食多而不甚渴。小便數而消瘦者。名曰消中。若渴而飲水不絕。腿消瘦而小便有脂液者。名曰腎消。此三消者。其燥熱

同也。夫經中有言心肺氣厥而渴者。有言肝痺而渴者。有言脾熱而渴者。有言腎熱而渴者。有言胃與大腸結熱而渴者。有言脾痺而渴者。有言小腸痺熱而渴者。有因病瘧而渴者。有因肥甘羨食而渴者。有因醉飽入房而渴者。有因遠行勞倦過大熱而渴者。有因傷害胃乾而渴者。有因病風而渴者。雖五臟之部分不同。而病之所遇各異。其爲燥熱亡液一也。

謹按先生三消之論。始言天地六氣五味以配養人身六位五臟。而究乎萬物之源。終引內經論渴諸證。以辨乎世方熱藥之誤。比物立象。反覆詳明。非深達陰陽造化之機者。孰能如是哉。夫治此疾。

者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不澁則病日已矣豈不以滋潤之劑養陰以制燥滋水而充液哉何故世論消渴者多不知其意謂曰下部腎水虛不能制其上焦心火使上實熱而多煩渴下虛冷而小便若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則自然渴止小便如常而病愈也吁若此未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則爲熱心火屬陽而本熱虛則爲寒

若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱矣。以彼之言但見消渴數溲妄言爲下部寒爾。豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也。且夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水。令腎水既不勝心火則上下俱熱奈何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不閤哉。彼不謂水氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多此又不知消渴小便多者蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外以養乎百體故腸胃之外燥熱太甚雖多飲

水入於腸胃之內。終不能浸潤於外。故渴不止而小使多。水液既不能滲泄浸潤於外。則陰燥竭而無以自養。故久而多變於聾盲瘡瘍痙痹之類。而危殆。其爲燥熱傷陰也明矣。

○論治消渴大法

東垣曰。膈消者以白虎加入參湯治之。中消者善食而瘦。自汗大便硬小便數。叔和云。口乾飲水多食饑虛痺成消中者。調胃承氣三黃丸治之。下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏。叔和云。焦煩水易虧。此腎消也。六味地黃丸治之。總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不治之證。

察古老人分而治之。能食而渴者。白虎加人參湯。不能食而渴者。錢氏方白朮散。倍加葛根治之。上中既平。不復傳下消矣。前人用藥。厥有旨哉。或曰。未傳瘡疽者何也。此火邪勝也。其瘡痛甚而不潰。或赤水者是也。經云。有形而不痛。陽之類也。急攻其陽。無攻其陰。治在下焦。元氣得强者生。失强者死。未傳中滿者何也。以寒治熱。雖方士不能廢其繩墨。而更其道也。然臟腑有遠近。心肺位近。宜制小其服。腎肝位遠。宜制大其服。皆適其至所爲故。如過與不及。皆誅罰無過之地也。如高消中。消制之太急速。過病所久而成中滿之病。正謂上熱未除。中寒復生者也。非藥之罪。

失其緩急之制也。處方之治宜加意焉。

按已上所論三消傳變可謂發病機之旨。比與陳氏三因論消中復有三證。皆病傳所異。大抵未傳發瘡疽者為傳外。發脹滿強中為傳內。亢極之甚也。但三因所出治強中一方。然未見其肯綮。今姑存之以備其旨。且傳脹滿皆不治之證。況強中乎。

消渴治法

○治熱之劑

局方清心蓮子飲

調胃承氣湯治消中熱在胃而能飲食。小便赤黃。並方

三因真珠丸治心虛煩悶積熱煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母一兩一分

黃連

苦參

玄參

鉄粉

牡蠣

各一兩

硃砂

二兩

麥門冬

去心

天花粉

各半兩

金箔

銀箔

各二百片

右爲末煉蜜入生瓜蘖汁少許丸如梧桐子大用金銀箔爲衣每二三十丸先用瓜蘖根汁下一服

次用麥門冬熟水下病退日二服

按此心胃經藥也已上三方有輕重之殊宜選使

治燥之劑

東垣當歸潤燥湯治消渴舌上白乾燥唇乾口乾眼

澁黑處見浮雲。大便閉澁。乾燥結硬。喜溫飲陰頭短縮。

升麻一錢半

柴胡七分

甘草六分半
一半生

細辛一分

黃栢

知母

石膏

桃仁

麻仁

防風

荊芥穗

當歸身各一錢

杏仁六箇

紅花少許

生地黃三分

小椒三箇

右咬咀作一服水煎

清涼飲子。治消中能食而瘦。口乾舌乾。自汗大便結

燥。小便頻數。

羌活

柴胡

炙甘草

知母酒製

黃芪

黃芩酒製各一錢

生甘草

漢防已

生地黄酒製

防風各五分

當歸身六分

紅花計少

桃仁五箇

杏仁十箇

升麻四分

石膏

黃柏

草龍膽製各一錢半

右咬咀作一服水煎入酒些少。此方減黃芪黃芩

防風草龍膽加麻黃根三分黃連八分地黃飲子

按已上脾心肝腎藥也

○清氣之劑

局方人參白虎湯。治高消上焦燥渴不欲多食。方見熱門

東垣蘭香飲子。治渴飲水極甚。善食而瘦。自汗大便

結燥小便頻數

石膏

二錢

知母

酒製一錢半

生甘草

防風

各一錢

炙甘草

人參

蘭香葉

白豆蔻仁

連翹

桔梗

升麻

各五分

半夏

二分

右爲細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄片于日中晒半乾碎如粉每服二錢食後淡生姜湯下按已上二方主上中二消之劑肺胃經藥也

○滋陰之劑

丹溪補陰丸

方見補虛門

局方加減八味丸治腎虛消渴引飲

金匱腎氣丸減附子加五味子

右服如本方法。要略治男子消渴小便反多仍用

本方

簡易地黃飲子。治消渴咽乾面赤煩燥

人參

生地黃

熟地黃

黃芪

天門冬

去心炒

麥門冬

去心

澤瀉

石斛

枇杷葉

去毛炒

枳殼

炒

甘草

炒各等分

右咬咀每三錢水煎服

按此心腎脾肺藥也。已上三方主下消之劑

硃砂黃連丸。治心虛蘊熱。或因飲酒過多發為消渴

硃砂

一兩

宜連

三兩

生地黃

二兩

右為末煉蜜丸如梧子大。每四五十九。澄心棗湯

送下

按此心脾藥也。上消之劑。

○清氣滋陰之劑

局方黃芪六一湯。治男女諸虛不足。胸中煩悸。時常消渴。或先渴而後發瘡。或病諸瘡而後渴者。並宜服。

黃芪

六錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

按此肺腎脾三焦命門之劑也

東垣生津甘露飲子。治高消大渴。飲水無度。舌上赤澁。上下齒皆麻。舌根強硬。腫痛。食不下。腹時脹痛。

渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噦善怒健忘臂腰背寒兩九冷甚

石膏

一錢二分

人參

炙甘草

各二錢

黃柏

酒拌炒

杏仁

各一錢半

生甘草

山梔子

革澄茄

各一錢

白葵

半錢

白豆蔻

白芷

連翹

姜黃

各一錢

麥門冬

蘭香葉

當歸身

各半錢

桔梗

三錢

升麻

知母

酒製各二錢

黃連

木香

柴胡

各三分

藿香

二錢

全蝎

二箇

右為細末湯浸蒸餅和勻攤薄晒乾杵細食後每