

新刊西學集成

醫學集成卷之九

後學 義烏 傅滋 續註

○怔忡八十八

脉法

寸動而弱動為驚弱為悸跌陽脉微而浮上為

胃氣虛微則不能食如恐怖之脉憂迫所作也寸口
緊跌陽浮滑氣盛是以悸

丹溪云屬血虛有痰有慮便動屬虛特作時止者痰因

火動瘦人是血少肥人多是痰尋常者亦是痰時覺

心跳者是血少

戴氏怔忡者心中不安易上然如人將捕是也又云怔者心動不定驚貌

仲憂也東垣謂心神煩亂怔忡元火炎上心中氣亂而熱有似懊惱之狀皆諸上血中伏火然上然不安

百用雜術法以鎮陰火之浮行以
養上焦之元氣也治以安神丸

大法四物湯安神丸之類痰用痰藥

勞役大虛心跳

朱砂

白芍藥

歸身

側柏葉各三升

川芎

甘草

陳皮

各一

炒連

半

為末猪心血丸

一人形質俱實因大怒患心不自安如人將捕之夜
卧亦不安耳後火光炎上食雖進而不知味口乾而
不欲飲以人參白朮歸身為君炒陳皮為佐炒柏玄
參煎服半月而安

一人虛損心中如常有官事不了之狀以四君了加

參朮黃芪茯苓多服愈

附

治一人病怔忡善忘口澹舌燥多汗四肢更軟發

熱小便白而渴褻鑒以內傷不足欲延并附等藥未
決請視脉虛大而數曰是由思慮過度厥陽之火為
患耳夫君火以名相火以位相火代君火行事者也
相火一擾能為百病况厥陽乎百病之起皆自心生
故憂愁思慮則傷心其入平生志大心高所謀不遂
鬱遏積久致內傷也然抱薪救火望安寧能以補中
益氣湯朱砂安神丸空心進坎離丸月餘而安

一人胸膈脹痛心怔忡嘔逆煩悶不食情思惘惘上

暫安日曉七六脉皆結澁不調甚怪徐而察之因其
機深憂思太過加之脾胃內傷積為痰涎鬱於上膈
然也經云思則氣結又云陰氣者靜則神藏躁則消
亡飲食自倍腸胃乃傷此之謂也以祛順丸服之即
安

一人因事恐怖心常惕上如畏人捕之狀脉豁然虛
大而浮休熱多汗曰凡病得之從高墜下驚仆擊搏
留滯惡血皆從中風論終歸厥陰此海藏之說也蓋
厥陰多血其化風木故也有形當從血論無形當從
風論今疾是走無形也從風家治之薰化痰散結佐

以鐵粉朱砂丸愈

驚悸

丹溪云因血虛

肝主血無血
衰則木虛

易驚心神忤亂氣與痰結

遂使驚悸血虛者朱砂安神丸氣痰相結者溫膽湯

在心膽經有痰迷心竅用治痰藥

夫心為一身之主
神明系焉其所恃

以養者惟血而已血虛則神無所養而不能自守故
驚悸生焉驚者恐怖之意悸者心驚然而動也或曰
悸有三驚悸忡悸痰涎閉於中腕亦悸其症短氣而
自汗四肢浮重飲食無味心虛煩悶坐卧不安是也
若心虛而痰滯之則耳聞大言目擊異物遇險危
獨事喪志心為之忤使人有惕上之狀是則為驚心
虛而水停之則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火
惡之心不自安使人有恍惚之狀是則為悸驚者宜
以豁痰定驚之藥悸者與之逐水消
飲之劑使氣血充足而神自寧矣

或曰忪悸因失志氣鬱涎潮聚在心脾經宜定志丸失志者為事不隨意久思所致少陰心忪乃邪熱入于腎水乘心惟腎欺心七惧水也治在於木以茯苓湯導溫四逆散調之枳實芍藥甘草芫胡是也與驚惧不同宜審之

附方

雜著治勞心思慮損傷精神驚悸煩熱方見煩熱

朱砂安神丸

治因血虛

黃連

炒一

朱砂

飛一

生地

酒洗

歸身

酒洗

炙甘草

各五分

湯浸鈺餅丸如

黍米大每服二十九津下

一本無地黃川歸用生甘草

或論心虛驚悸恍惚用扶神者當用人參遠志石菖蒲

麥門冬為末甘草膏丸以牛黃朱砂為衣治之

溫膽湯

治心膽怯易驚

二陳去茯苓加竹茹枳實姜水煎服

養心湯

治心虛血少驚悸不寧

黃芪

白茯苓 茯神

半夏

川歸

川芎

各半

遠志

辣桂

栢子仁

酸棗仁

炒

五味

人參

二分

甘草

四分

右每服三錢姜棗煎

服行水怔忡加楨榔茯苓

寧志丸

治心虛血虛多驚若有痰者吐之

白茯苓

茯神

人參

栢子仁

琥珀

川歸

酸棗仁

溫酒浸半日去虎骨炒

遠志肉

各半

乳香

石菖蒲

朱砂

二

煉蜜九桐子大棗湯

下三十丸

朱雀丸

治怔忡

白茯苓

二

沉香

半

丹

蜜丸小豆

大參湯下三十丸

加味四七湯

治心氣鬱滯豁痰散驚

石菖蒲

十一

半夏

一兩

白茯苓

厚朴

各半

茯神

紫蘇

各一兩

遠志

炙甘草

各半

兩

每服四錢姜水

煎服

八物定志丸

平補心氣安神鎮驚除膈熱痰實

遠志

石菖蒲

麥門冬

茯神

白茯苓

各二

白朮

半兩

人參

半兩

牛黃

二錢

蜜丸桐子大朱砂為衣湯下二十丸

○不寐八十九

不寐有二

有病後虛弱者有年高血氣者有痰在膽

經神不歸舍者

雖經云老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道澁故不寐也

少壯血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故

不寤也

虛者六君子湯加酸棗仁黃芪

痰者溫膽湯加南星酸棗仁煎下青靈丹

傷寒不寐者當求之本門

因驚而致亦用溫膽湯加減用金銀煎竹茹或道痰湯加菖蒲九妙隨病處方可也

驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆是膽涎沃心以致心氣不足若用涼劑太過則心火愈微痰涎愈盛而病益深宜理痰氣

滄州翁治一人不睡上則心悸神憊上如處孤壘而四面受敵兵狀達旦日駭上無所視瞋上無所聞雖堅卧密室終未嘗交也諸醫罔効予視之左關之陽浮

而虛察其色少陽之支外溢於目皆曰此乃膽虛而
風諸公獨治其心而不祛其膽之風遂以烏梅湯泡
膽丸日再服數服病如脫

○健忘九十

丹溪云精神短少者多亦有痰者或曰健忘者皆由憂思過度損其心胞其

致神昏不清遇事多忘而致此疾非生成愚頑者也又云思慮脾亦令人轉弱遺忘宜歸脾湯調養理心脾寧神定志其症自愈也

附方

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

甘草

炙二

白朮

茯苓

黃芪

圓眼肉

酸棗仁 各一市

人參

木香 各半 每服四錢

安東茶煎服

定生丸

治心氣不足恍惚多忘

遠志 二兩

人參

菖蒲 各一

白茯苓 三兩

蜜丸如梧桐子大朱砂為衣末飲下二十九

砂為衣末飲下二十九

二丹丸

治健忘

方見中風門但此多

人參定志丸

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

酸棗仁

遠志

人參

黃芪 各半

桔梗

丹砂

官桂 各半

天門冬

白茯苓

菖蒲 各半

右為末蜜丸如梧豆大每服二十九至三十九丸用朱

飲下

○消渴九十

脉法

心脉滑為渴

滑者陽氣勝

心脉微小為消癯濡散者氣實

血虛洪大者陽餘陰虧寸浮而遲

遲為虛氣弱

跌

陽浮數

浮則為氣數為消

消癯脉實大病久可治小堅急病

久不可治脉數大沉小者可治實堅大者細浮短者

皆難治

丹溪云東垣有法

效採東垣論分註於下

上消者肺也多飲水而飲食大小便如常

東垣云高消者古上

五裂大渴引飲逆論云心後熱於肺傳為喘消者是也
以白虎加人參湯主之或曰上焦渴是心火刑
東肺金所致宜降火清金以蘭香葉白葵花白
五苓平證加升麻黃柏引清氣升而渴自止矣

中消者胃也多飲食而小便赤黃東垣曰中消者善食而瘦自汗大便

硬小便數取和所謂口干飲水多食肌重瘕成消中
是也以調脾承氣湯三黃丸治之或曰中焦渴飲食

入胃傳送太急不生津液已則肌食胃中有熱宜用黃芩石膏治之

下消者腎也小便濁淋如膏之狀東垣曰下焦者頤

小便如膏焦頤水易虧也此為腎消宜六味黃丸
總錄所謂末傳能食者必發瘕疽皆腎不能食者必

傳中滿鼓脹皆為不治之證掌占分而治之能食而
渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍

加干葛治之上中既平不復傳下矣

因膏梁甘肥 變則陽盛矣陽脉大盛則陰氣不得營

也津液不足結而不潤皆燥熱為病經曰二陽結謂

之消東陽云二陽若陽明也手足陽明胃主血熱則

前受善血中伏火而並蓋心火甚於上為膈膜雖有三者之分因於火二也

之消病則舌赤裂大渴引飲論之消病漸食身瘦自汗大便
常消火甚於中為腸胃之消病漸食身瘦自汗大便

煩渴小便頻數如膏油之狀焦煩水易虧是也大抵

三消之疾不濕寒之陰氣所兼
因於飲食腸胃失節而氣滯不
宣平或

耗精神過違其病或因大寒出師上界無時而
熱醬甚因久食醢物寒食炙博過度或服金石丸散

積久實熱結於下焦虛熱血氣不飽而渴者有脾
腎而致又有心肺氣厥而渴者有肝痺而渴者有脾

食而渴者有胃熱而渴者有胃乾而渴者有病

風而遇各異其為燂熱亡液則一也

或曰末傳瘡疽者何也東垣曰此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢其繩墨而更之然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其所至為故如過與不及皆誅伐無過之地也如高消中消制之太急速過病所及成中滿之病正謂上消未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之製也處方之際宜加意焉

治法