

濟陰至寶丹

此丹未出瀾之女已出之婦俱宜服

配法用益母草

紫花者妙忌用鐵器

一不用老酒拌透一不用江汁拌透一不用薑

便拌透一不用米醋拌透俱蒸一炷香時晒干

末再將後三味共合一處為末煉蜜為丸每丸

重二錢白當歸

赤芍藥

廣木香

五小

一治婦女經期或先或後先期用白芍藥芍藥湯不後期用

赤芍藥湯不小腹疼用炮姜

二治赤白帶下赤用白芍藥生地湯不白用茯苓白朮湯不

三治台前白濁膨悶惡心嘔吐不思飲食生薑陳皮湯不

四治胎前腰腹疼痛胎動不安下血不止酒服臨產

時用酒服一九能安魂定魄血氣調和諸病不生

五治難產或橫生不順或胎傷或死連日不能分娩用

產便服一九立刻即產或產後覓枕作痛酒

六治產後胞衣不下用童便湯下

七治死胎不能生產腰腮疼痛死在須臾者炒鹽湯下

八治產後中風牙關緊閉半身不隨失音不語左

癱右瘓手足抽縮角弓反張不省人事用薄荷湯下

九治產後四肢及面目浮腫木魚湯下

十治產後四肢及面目發黃者用茵陳湯下

十一治產後傷寒頭疼惡寒熱無汗葱湯下

十二治產後血迷血暈不省人事荊芥穗湯下

十三治產後氣短不思飲食用棗湯下

十四治產後痙咳嗽惡心嘔吐酸水四肢無力自汗盜

汗棗湯下

十五治產後血風身熱手足頑麻百節疼痛五心煩熱

口渴喉乾童便湯下

十六治產後驚悸如見鬼神狂言妄語或心虛胆怯

行動害怕用酒加硃砂調服

十七治產後增寒作熱身出冷汗用童便湯下



十八治產後惡血不下脤脹腸疼痛童便下

十九治產後鼻衄或藕湯下

廿治產後去血過多已成崩漏頭眩眼黑当归湯下

廿一治產後大便不通用芝蔴湯下小便不通車前子湯下

赤痢紅花湯下白痢老米湯下



真 際

鬱金 五兩

雄黃 五兩

乳香 五兩

沒藥 五兩

木魚 五兩

陳皮 五兩

牙皂 五兩

巴豆 五兩

共為細末用陳醋調和為丸

如累

豆大珠砂為衣

磁研守時用

心疼姜湯送下

傷力肚疼姜湯下

急心疼百靈芝湯下

紅痢甘草湯下

重心疼檳榔湯下

白痢生姜湯下

血山崩槐花湯下

積聚苦酒送下

經脈不調紅黃湯下

吐瀉干姜送下

嘴眼歪斜當歸湯下

大便閉皂角湯下



鳳 鳳 鳳

中暑凉水送下

嘔吐乳魚湯下

產後不調紅芍湯下

瘋狗咬防風湯下

咽喉疼雄黃湯下

干血勞症黑豆煎水紅芍湯下

腰疼管仲湯下

傷酒白砂糖送下

小兒驚風薄荷湯下

宿食米湯下

小兒風喉硃砂湯下

肚疼艾醋湯下

遍體腫疼麻黃湯下

諸瘡傷寒麻黃湯下

頭疼薄荷茶送下

三十種風防風湯下

此藥急孕婦不可服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

重刊普濟應驗良方

瘟疫時症方卷一

瘟疫之症多發於春分之後夏至之前
疫如有鬼癘之氣又曰癘疫以衆人所患相同
曰天行時疫其症與傷寒相似傳經表裏亦無不
同惟時令已暖毒氣鬱蒸與傷寒_症異發散亦
用辛平導劑又有四時瘟疫治法大略相同茲擇簡
便數方為醫藥不便之處而設

四時瘟疫皆治方 黃砂糖一杯生姜自然汁一杯用白
滾湯一大杯調勻乘熱急服被庶發汗即愈



又方

白粳米并連鬚葱頭根煮成稠粥加醋一小碗再煮

一二滾各食一碗熱服取自愈已出汗者不用

又方

松毛切碎搗每用二升酒冲服日參服極安極效

瘟疫外治方凡聞病人汗氣入鼻透腦即散布經絡初

覺頭痛即用芥菜子研末溫水稠調填肚臍中隔布

一二層上以壺盛熱湯熨之至汗出而愈

又外治方並治大頭瘟

蒼朮 良姜 枯凡 各等分為末

每用一升以葱白一大箇搗勻塗手心男左女右將手掩

肚臍手須窩起勿使着臍又以一手兜住前陰女子

亦如之煎絲荳湯壹碗飲之點線象半炷久可得

汗如無汗再飲絲荳湯催之汗出即愈又刺少商

即愈

治見中風
治見喉蛾

辟瘟丹

蒼朮

末紅棗

和九彈子大時燒之能令疫不染

預避瘟疫方

五更時投黑豆一大握於井中勿使人見凡飲

水家俱無傳染若食河水之處各家於每日清晨

投黑荳一撮於水缸中全家無恙○又貫仲一白丸一塊放

水缸中亦效○又方向東桃枝煎湯日浴二次自然不染

入病家不染方

魚油調雄黃蒼朮末塗鼻既出用帛條

到鼻孔取嚏噴再飲雄黃酒一杯決無傳染

大頭蝦蟇瘟

頭腮俱腫

靛花

三分福建者考佳

鴨蛋清一燒酒一杯調服神效



除瘟救苦丹

專治一切瘟疫時症並傷寒感冒無

論已傳經未傳經大人一九小兒半丸京水調服

即愈重者連進二服服藥後未汗切忌食熱湯

物汗後不忘此丹寒並用却極神效百試百驗有力

者宜脩合以濟人 麻黃 乾姜 明天麻 松蘿茶

絲荳粉各二 生甘草 明亮硃砂 明雄黃各八 生大黃二

共為細末蜜丸彈子大又寸金丹亦能治疫藥店有現

成脩合者○又治瘟疫傷寒時氣方麥冬二 烏梅肉三

芫荽根卅 燈心卅 竹葉卅 紅棗三枚 水煎熱服

瘟疫經驗方 見續信驗方

不

藿香^二 紫蘇^一 白芷^一 蒼朮^一 厚朴^一 樨榔^一 陳皮^一

半夏^一 姜製^一 赤苓^二 桔梗^一 烏梅^四 引加姜三片

水煎溫服遇一切時氣瘟疫病初起照方服一二劑

針刺兩胳膊彎兩腿彎見血即愈忌涼水小米

日如藥不即吐用醋半碗燒炭灰一塊投醋中以熟

氣薰鼻孔三四次即不吐矣如病勢急迫不急煎藥

用食鹽三錢炒黑陰陽水沖服如值瘟疫盛行

時將分兩加重為丸更可應急濟人○其用炒鹽

沖服之方取其得吐即愈

救瘟散 皂角 白桂 蟾酥 硼砂 千重馬 以上五味 麝香 十分

共研細末覺有特症即臍少許得嚏即愈男左女右

清瘟解毒丸 治天行時疫感受風熱大頭瘟等症 元氣

二板藍根 二馬勃 二生芎子 二連翹 二姜蠶 二天花粉

黃芩 一紫胡 一薄荷 五甘草 共研細末蜜丸重三

白滾水送下每服二丸亦可減輕分兩作湯劑此方

去花粉 荆芥 芥連 一兩各清瘟丸

治大頭瘟驗方 貫仲 三小葛根 二小甘草 小半姜蠶 一

里豆十粒水煎服三方一見續信驗方

保安延壽方 專治四時瘟疫傳染時氣

金良花 三 生甘草 二 黑料 三 五 黃土 五 如山上無 虎石處取之 水煎



服日服三劑如未病者每早服一劑即免傳染此方
出於道藏又名乾一老人湯藥味平疫效如神
神惟孕婦忌服 又云居家永遠戒食牛

犬二面四時不染瘟疫之症斯言信然

千金保命飲 治一切暴症頭暈頭疼心腹疼痛心內

恍惚中涼受暑瘧疾等症 用普洱茶二雄

黃一半一當歸五肉桂一白芷一乳香一血竭一冰片

三台射一蟾酥二共為細末燒酒為丸如高米粒大

每服一丸壓舌下熱津立效孕婦忌

藿香正氣丸 藿香葉 苦桔梗 白茯苓 半夏麴



蘇葉 陳皮 各二 白朮 土炒 白芷 厚朴 各另去皮姜汁炒

砂仁 甘草 各二 大腹皮 一 細末蜜丸每丸三錢每服

二九俱開水化服

金衣至寶丸 白茯苓 十五 藿香葉 十 蘇葉 八 甘草 七

香薷 五 木瓜 三 公丁香 五 檀香 五 共為細末蜜

丸金箔為衣每丸三錢每服一二九黃酒溫水送下此

藥開胸利氣除濕化疫散寒清熱扶正抑邪真有

神功無病者夏月日服一九亦免諸症

治天行熱疫方 苦參 一 醋煎去渣服之得吐即愈 方見活人術初編

避時氣方 蒼朮 黃芩 茵陳 荆芥 藿香 各三 大棗 十 共為末焚之聞之



傷寒症候不一兼有傳變惟良醫診脈隨症用藥幾奏

效非單方可治也今惟傳一外治安效之法凡醫者

不便之處特此救急頗有奇效

外治熨法 治傷寒胸膈不實作痛一切寒結熱結

結疫結痞結水結毒症並申氣虛弱不堪攻擊內

消者須以此法熨之則滯行邪散其效如神

葱白頭一大生老姜兩大生蘿蔔四兩如無時三味共搗爛炒熱

用布作兩包輪換久久卷熨心胸脇下痛處無不

豁然自開汗出而愈如數次炒乾則烹之宜酒且

不宜太熱恐炮烙难受也若大便結兼熨脘腹



傷寒傳變症候繁多祇自霜降後春分前寒邪所感者為

正傷寒春夏別感者謂之四時傷寒而兼雜症惟

得病之初宜先審辨則調理不差夫傷寒症候大

類傷暑但傷寒惡寒而身寒傷暑惡熱而身熱脉

緊惡寒謂之傷寒脉緩惡風謂之傷風脉壯熱謂之

熱病脉虛身熱謂之傷暑傷暑脉浮大而散或絃索

而遲蓋熱傷氣散而脉虛也外症見頭疼身熱煩

渴口乾面垢自汗倦怠少氣或背寒惡寒甚則迷悶

不省手足搐搦或嘔瀉腹痛下血發黃出斑等行路艱

之為中熱靜室得之為傷暑又胸膈脹滿頭痛發熱

時有止歇者勞役食積也惟頭痛惡寒發熱身足痠
痛晝夜不歇傷寒也依此看過果係傷寒若無良醫
幸莫用藥蓋此症死於病者少而死於醫者多惟宜寧
室
食避風勿食粥飯米粒謹靜自守只以姜汁熱酒或
姜茶等類與飲待七日傳遍經絡雖不服藥亦自然
全愈古云傷不藥得中醫正此謂也至於過經傳隔
經傳兩感傳之症病本至危尤非良醫不治若用藥一
誤是速之死耳可不慎歟

又方

治傷寒犯內傷食積蓄血小腹硬脹不能言語神
思欲脫兩目直視手足強仆症候危篤難以下藥