



增輯傷寒類方目錄

卷二

梔子湯類五

方七

承氣湯類六

方十二



梔子豉湯歌

山梔香豉治何爲。煩惱難眠胸室宜。十四枚梔四合豉。先梔後豉法煎奇。按此湯舊本有得吐止後服等字。故相傳爲涌吐之方。高明如柯韻伯亦因其說。唯張隱菴張令韶極辨其謬。曰瓜蒂散二條。本經必曰吐之。梔子湯六節。並不言一吐字。且吐下後虛煩。豈有復吐之理乎。此因瓜蒂散內用香豉二合而誤傳之也。愚每用此方。服之不吐者多。亦或有時而吐。要之吐與不吐。皆藥力勝病之效也。其不吐者。所過者

梔子湯類五

梔子豉湯

梔子

十四枚

香豉

四合

右二味以水四升

先煮梔子得二升半。內豉煮取升半。去

滓。分爲二服。溫進一服。得吐止後服。

此劑

分兩最小。凡治

上焦之藥皆然。

化。卽雨露之用也。一服卽吐者。戰則必勝。卽雷霆之用也。方非吐劑而病間有因吐而愈者。所以爲方之神妙。梔子色赤。象心。味苦。屬火。性寒。導火熱之下行。豆形。象腎。色黑。入腎。製造爲豉。輕浮。引水液之上升。陰陽和水火濟而煩熱懊懣結痛等證俱解矣。原本列於太陽。主解煩。非吐劑。而有時亦能涌吐也。韻伯移入陽明。只知爲吐劑。泄陽明之煩熱。卽此爲仁者見仁。知者見知也。梔子氣味苦寒無毒。主治五內邪氣。胃中熱氣。面赤酒皰。鼓鼻白癩。赤癩。瘡瘍。

發汗吐下後。

諸法俱用。未必皆誤。而正氣已傷矣。

虛煩不

得眠。

虛爲正氣虛。煩爲邪氣擾。發汗吐下。實邪雖去。而其餘邪。因正氣不

充。留於上焦。故陽氣

擾動而不得眠也。

若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。

反覆顛倒。身不

得甯也。心中懊

懣。心不得安也。梔子豉湯吐之。

此非汗下之所

能除者。吐之而痰涎結氣。無不出矣。

按汗吐下之後。而邪未盡。則不在經而

在肺胃之間。爲有形之物。故必吐而出之。反覆顛倒。心中懊憹。摩寫病狀。何等詳切。凡醫者之於病人。必事事體貼。如若身受之。而後用藥無誤。

發汗若下之。而煩熱胸中窒者。

煩熱且窒較前

虛煩等象爲稍實。

梔子豉湯主之。

傷寒五六日。大下之後。

誤治。

身熱不去。心

中結痛者。未欲解也。

外內之邪俱未解。結痛更甚於窒矣。

梔子豉湯主之。按胸中窒結痛。何以不

用小陷胸。蓋小陷胸症。

乃心下痛。胸中在心之上。故不得用陷

胸。何以不用瀉心。諸法蓋瀉心症乃心

下痞。痞爲無形。痛爲有象。故不得用瀉

心。古人治病。非但內外不失釐毫。卽上

下亦不踰

分寸也。

陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。胸滿而喘。

發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。

以上皆陽明本

症。非因誤治而得者。若發汗則躁。心憤憤反讖語。

汗多。

陽虛。若加燒鍼。必怵惕煩躁不得眠。

以火逼汗亡。

陽驚狂之意。若下之。則胃中空虛。客氣

動。膈心中懊憹。

以前因用三法。未必合度。故病不解。各有現症。

如舌上胎者。

此句乃要訣。舌上有白胎。則胸中有物。而可用吐法。

否則邪尚未結。

梔子豉湯主之。

恐無物可吐也。

陽明病下之。其外有熱。表邪未盡。手足溫。不

結胸。無實邪。心中懊憹。飢不能食。痰涎停結。

頭汗出。陽邪在上。梔子豉湯主之。

下利後更煩。按之心下濡者。濡者溼滯之象。非窒

非痛也。爲虛煩也。宜梔子豉湯。

梔子甘草豉湯 二

# 梔子生薑豉湯歌

梔豉原方效可誇。氣羸二兩炙。甘加若加五兩生。姜入專取生。姜治嘔家。按梔豉解見上。汗吐下後中氣虛。不能交通上下。故加甘草以補中。嘔者汗吐下後胃陽已傷。中氣不和而止。

梔子湯原方。加甘草二兩炙。右三味以

水四升。先煮梔子甘草。取二升半。內豉

煮取升半。分三服。溫進一服。得吐便止。

## 梔子生薑豉湯三

梔子湯原方。加生薑五兩。先煮梔子生

姜。餘俱如前法。得吐止後服。

逆故加生姜煖胃解穢而止逆也。

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服

之。此服梔子湯之戒。按梔子清越上焦之火。與腸胃亦無大害。微溏者即

不可服。未知何義。想因大腸之

氣滑脫者。肺氣不宜更洩也。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。甘草能補中氣。

若嘔者。梔子生姜豉湯主之。此二條言凡遇當用

梔子湯之病。見此二症。則加此二味也。按無物爲嘔。有物爲吐。欲止其嘔。反

梔子乾姜湯歌

十四山梔二兩薑以丸誤  
下救偏方微煩身熱君須  
記辛苦相需盡所長張令  
韶曰梔子導陽熱以下行  
乾姜溫中土以上達上下  
交而煩熱止矣

梔子乾姜湯

四

令其吐吐之而嘔反  
止眞匪夷所思也

梔子

十四枚

乾姜

二兩

右二味以水三升

半煮取一升半去滓分二服溫進一服

得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之

下未必誤以丸藥大下則誤矣

此兩解心腹之妙劑也。  
 不同。梔子治煩。枳朴洩滿。  
 於胃與反覆顛倒之虛煩。  
 難起。起臥不安。是心移熱。  
 伯曰。心煩則難臥。腹滿則。  
 滿止煩泄滿效。兼該柯韻。  
 梔亦妙哉。下後心煩還腹。  
 朴須四兩。枳四枚。十四山。  
 梔子厚朴枳實湯歌。

身熱不去。

外有微邪。

微煩。

下後而煩。即虛煩也。

此湯主

之。

下後故用乾姜。

梔子厚朴枳實湯

五

梔子

十四枚

厚朴

四兩

枳實

四枚水浸

煮

服法同前。

傷寒下後心煩。

即微煩。

腹滿臥起不安者。



煩而加之腹滿。則臥起俱不甯矣。厚朴枳實以治腹滿也。梔子厚朴

### 湯主之。

### 梔子檳皮湯

六

梔子

十五枚

甘草

一兩

黃檳

二兩

右三味

裏鬱業經向外驅。身黃發熱。四言規。草須一兩二黃。藥十五枚。梔子不去皮。黃蘗氣味苦寒無毒。主治五藏腸胃中結熱黃疸。腸痔止洩痢。女子漏下赤白陰傷蝕瘡。

以水四升。煮取升半。去滓。分溫再服。

傷寒身黃發熱者。梔子檳皮湯主之。

草 本



榮皮散藏府

結熱黃疸

# 枳實梔子豉湯歌

一升香豉枳三枚。十四山  
梔復病該漿水法煎微取  
汗食停還藉大黃開張隱  
菴曰大病瘥後則陰陽水  
火始相交會勞其形體則  
氣血內虛其病復作其證  
不一故不著其病形只以  
此方統治之方中梔子清  
上焦之煩熱香豉啓下焦  
之水津枳實炙香宣中焦  
之土氣三焦和而津液生  
津液生而氣血復矣若有

## 枳實梔子豉湯

七

枳實

三枚

梔子

十四枚

豉

一升

右三味以

清漿水七升空煮

又一煮法漿水即淘  
米之泔水久貯味酸

爲佳。取四升內枳實梔子煮取二升下豉

更煮五六沸去渣分溫再服覆令微似

宿食則三焦未和。加大黃以行之。令燥屎行而三焦氣血自相和合矣。今之醫輩。凡遇此證。無不以補中益氣湯誤之也。

汗。此不取吐而取汗。

大病差後勞復者。

勞復乃病後之餘症。不在吐法。故取微汗。

枳實梔子湯主之。

勞復因病後氣虛邪氣又結於上焦。其症

不一。故不著其病形。惟散其上焦之邪足矣。後人以峻補之劑治勞復。則病變百出。若有宿食者。加大黃如博棋子大。

五六枚。

此指勞復之有宿食者。治食復之法。亦在其中矣。可吐篇云

宿食在上脘。當吐之。○按梔子湯加減  
七方。既不注定何經。亦不專治何誤。總  
由汗吐下之後。正氣已虛。尚有痰涎滯  
氣凝結上焦。非汗下之所能除。經云。  
在上者因而越之。則不動經氣而正不  
重傷。此爲最便。乃不易之法也。古方梔  
子皆生用。故入口卽吐。後人作湯以梔  
子炒黑。不復作吐。全失用梔子之意。然  
服之於虛煩症。亦有驗。想其清肺除煩  
之性。故在也。終當從古法生用爲妙。

# 大承氣湯歌

大黃四兩朴半觔。枳五硝三急下云。朴枳先熬黃後入。去渣硝入火微熏。按承氣湯有起死回生之功。唯善讀仲景書者方知其妙。俗醫以滋潤之脂麻油當歸火麻仁郁李仁肉苁蓉代之。徒下其糞而不能蕩滌其邪。則正氣不復。不能太瀉其火。則真陰不復。往往死於糞出之後。於是咸相戒曰。潤腸之品且能殺人。而大承氣湯更無論矣。甚矣哉。大承氣湯之功用。盡為那庸耳俗目所掩也。

## 承氣湯類六

### 大承氣湯

大黃

四兩

厚朴

半斤炙

枳實

五枚

芒硝

三合。右四味以水一斗先煮厚朴枳實取

五升去滓內大黃煮取二升去滓內硝

更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿