

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹腹肢先後內外參內服外貼兼
砭血紅輕紫重黑難痊

註

小兒赤遊丹之證皆由胎毒所致欲發之時

先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大
其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者



御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣目錄

嬰兒部

赤遊丹毒

胎瘤

紅絲瘤

胎癰瘡

痘癰

葡萄疫



北京中医药大学图书馆版权所有

胎驚丹毒

滯熱丹毒

嬰兒瘡瘍

垂癰

胎風

臍瘡

臍突

陰腫

脫肛



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

肛門作癢

遺毒

痘裏夾癭

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日人神所在不宜鍼灸歌

十二時人神歌



十二支日人神所在歌

十干日不宜用鍼犯之病多反覆

九宮尻神圖

九宮尻神歌

升打靈藥固罐法

升打靈藥封罐口法

煉金頂砒法

製寒食麴法



北京中医药大学图书馆版权所有

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹腹肢先後內外參內服外貼兼
砭血紅輕紫重黑難痊

註

小兒赤遊丹之證皆由胎毒所致欲發之時

先身熱啼叫驚搐不寧次生紅暈由小漸大
其色如丹遊走無定起於背腹流散四肢者



順起於四肢流入胸腹者逆或初生之後外用熱水洗浴兼以火烘衣物觸動內毒遂成此證治之者先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次宜牛羊肉片徧貼紅暈處微乾再易俟肉片不乾換如意金黃散用藍靛清汁調敷內初服大連翹飲次服消毒犀角飲大便秘結加生大黃三五分若煩躁唇焦面赤者宜服五福化毒丹若失治毒氣入裏腹脹堅硬聲音雌啞吮乳不下熱者宜服



紫雪散下之一二日間身輕腹軟熱退身涼

硬處肉活乳哺如常者生反此者不治

大連翹飲

連翹

去心

當歸

赤芍

防風

木通

滑石

水飛

牛蒡子

炒研

蟬蛻

去足翅

瞿麥

石膏

煨

荊芥

甘草

生



柴胡

黃芩

梔子

生研

車前子

各五分

水二鍾燈心二十根煎八分子與乳母同

方歌
大連翹飲赤遊丹歸芍防通滑勞蟬瞿麥石

膏荊芥草柴芩梔子共車前

消毒犀角飲

犀角

鎊

防風

各一錢

甘草

生五分

黃連

生三分

水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之



方歌
消毒犀角飲黃連防風甘草共和煎赤遊丹

毒啼驚搐氣粗身熱服之安

五福化毒丹

黑參

赤茯苓

桔梗

各二兩

牙消

青黛

黃連

龍膽草

各一兩

甘草

生五錢

人參

硃砂

各三錢

冰片

五分



共研細末煉蜜為丸如芡實大金鉞為衣每

服一九薄荷燈心煎湯化服

方歌五福化毒清熱速瘡瘤丹毒服即除參苓

草消冰黛黃連膽草黑參硃

如意金黃散見腫瘍門

紫雪散見舌部重舌



胎瘤

嬰兒初產患胎瘤胎熱瘀血是根由色紫漸大
透刺放出膿汁自可瘳

註此證由胎前孕母積熱以致胞熱更兼血瘀

滯結而成多生頭上及胸乳間初如李核漸
大如僂色紫微硬漫腫不甚疼痛嬰兒初生
卽有者候過滿月熟透方可鍼之放出赤豆
汁或膿水汁其腫卽消初服五福化毒丹兼
貼黃連膏潰貼生肌玉紅膏生肌斂口若滿



月後生者必待膿鼓熟透鍼之若瘤皮含血

絲者詳註於紅絲瘤

五福化青丹

見赤遊丹毒

黃連膏

見鼻部鼻瘡

生肌玉紅膏

見潰瘍門



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

紅絲瘤

嬰兒初生紅絲瘤皮含血絲先天由精中紅絲
伏火相傳患此終難瘳

計此證一名胎瘤發無定處由小漸大嬰兒落
草或一二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲
亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天
腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此
疾終變火證潰處亦難收斂



漢書卷之六

晉書卷之六

宋書卷之六

齊書卷之六

梁書卷之六

陳書卷之六

魏書卷之六

隋書卷之六



北京中醫藥大學圖書館版權所有

胎癩瘡

癩瘡始發頭眉間胎中血熱受風纏乾癢白屑
淫水熱極紅暈類火丹

註

此證生嬰兒頭頂或生眉端又名奶癩癢起

白屑形如癬疥由胎中血熱落草受風纏綿

此係乾癩有誤用燙洗皮膚起粟搔癢無度

黃水浸淫延及遍身卽成濕癩俱服消風導

赤湯乾者抹潤肌膏濕者用嫩黃蘗頭末與

滑石等分撒之膿痂過厚再以潤肌膏潤之



又有熱極皮膚火熱紅暈成片遊走狀如火
丹治法不宜收斂只宜外發宜服五福化
丹亦以潤肌膏抹之癢甚者俱用烏雲膏
之乳母俱忌河海魚腥鷄鶩辛辣動風發物
緩緩自效

消風導赤湯

生地

赤茯苓

各一錢

牛蒡

炒研

白鮮皮

金銀花

南薄荷葉