

傷寒論三註卷之十

臟結結胸痞篇

問曰。病有結胸。有臟結。其狀如

答曰。按之痛。寸脈浮。

關脈沉。名曰結胸也。何謂臟結。答曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈浮。關脈小。細沉緊。名曰臟結。舌上白胎滑者難治。

方註時時下利者。陰邪結于陰臟。以寒甚。故脈小細與緊。蓋結胸以陽邪結于陽。藏結以陰邪結于陰也。喻註寸浮關沉俱無異。乃臟結之關脈。更加小細緊。

者以關居上下二焦之界。外邪由此下結。積氣由此上干。實往來之要衝。所以病在下而脉反困于中也。臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上滑胎者。不可攻也。

上條以結胸辨明藏結。此則專明藏結也。其人本有寒分。復受寒邪。凝于陰位。不似陽邪之有表證。并不似陽邪之有半表半裡証。其邪內結。或生陰躁。而其人反靜。更不似臟厥之身大寒。但顯胎滑陽氣不布之狀。設復以苦寒之

其虛

乎。雖不言治法。而溫中之

病。脇下素有痞。連在臍傍。痛引

入陰筋者。此名臍

結死。

病人素有痞氣。連在臍傍。此脾氣大虛。而肝氣自旺。總爲腎家真陽大衰。致胸中之氣。不布肝木之榮。失養三陰部分。上下皆虛矣。況復寒邪內乘。有不痛引少腹。宗筋拘急。將所結之邪。無由得散。雖欲求其生。何可得乎。

已上臍結證三條

結胸篇

病發於陽而反下之。熱入。因作結胸。病發于陰而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。

周註結胸與痞。其發陽發陰。未有能知之者。蓋發于陰者。洵是陰證。但是陽經傳入之邪也。陽經傳入。原爲熱證。但循次入太陰者。已止手足溫矣。至于少厥二經。未有不熱。深于內者。以去熱入二字而成千載之疑也。且熱症傳三陰者。惟太陰無下例。若少陰則有大承氣法。厥

在經有

三陰受病已入于府者爲

則爲

悞下與三陽在經無異故曰

結于陽位則結在

胸陰邪結于陰位則在心下

偏旁也然轉至陰經

悞下何以止成痞耶緣陰經熱已在裡故所結止在

陰位不若陽邪勢甚所結必在陽位也曰太早專承

陽病來痞病未嘗非早但較陽病爲稍遲則爲痞亦

稍輕矣蓋早而不太意在言外如此看去便夜光雪

竇妙裡眼前但恨讀是書者旣不能悟復不能疑又

何惟焉

太陽病。脉浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因硬。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。

方註太陽之脉本浮動數。一傳也。太陽本自汗而
言微盜汗。本惡寒而言反惡寒。稽久而然也。醫反
下之。至邪熱入膈。膈氣亂。

真炁

與食氣皆因下而致虧損

氣以

邪本風故曰陽氣以裡虛也

陷入故曰內陷陽

性上浮故結于胸以胸有凶而勢大也故曰大陷

胸湯芒硝之鹹。與其堅硬也。甘遂之甘。達之飲所也。

然不有勇敢之才。定亂之武。不能成二物之功用。故

以大黃之將軍爲建。此太平之主將。若不結胸至末。

言變之亦有輕者。蓋謂邪之內陷。或不結于胸。則無

有定聚。但頭汗出者。頭乃諸陽之本。陽健其用。故汗

出也。餘處無汗者。陰脉上不過頸。陽不下通。陰不任

事。故汗不出也。小便不利者。陽不下通。陰不任事。化
不行。而濕停也。濕停。必反滲土而入胃。胃土本濕。得
滲則盛。鬱而蒸熱。所以黃發于身也。發黃而不言其
治者。以有其條也。學者當從其類而求之矣。

大陷胸湯

大黃六兩 去皮芒硝升一甘遂兩一水六升。先煮大黃取二升。

去渣。入芒硝。煮一二沸。內芒硝。服得快利。止後服。

下早熱入。陽邪結于高位。因下。實以去熱開結也。

佐以芒硝。亦謂寒能勝熱。可能利。

水道使內陷之邪二陰俱去。

傷寒六七日。結胸熱實。脉沉緊。

痛中之石硬者大

陷胸湯主之。

沉爲裡。緊爲實。結胸。故心下痛。熱實。故石硬也。

此段明指傷寒結胸。則知病發于陰者。非分指寒邪

矣。熱實二字。形容結胸之情。甚悉。故卽言脉沉緊。以

應之。前藏結比論一條。言寸脉浮。關脉沉。見誤下則

中焦受傷。關脉獨沉。其寸口之風寒猶在也。此條誤

下而脉沉。雖不言寸口。而傷寒之緊猶在也。况因熱

實于裡。心痛石硬。不可于脉。沉知正虛。于脉緊知邪盛哉。

傷寒十餘日。熱結在裡。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此爲水結在胸脇也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。

方註以不實硬。故曰水結。以熱結不高。故曰在裡。上以往來寒熱。故用大柴胡。以水結無大熱。故用大陷胸湯。皆下法也。

太陽病。重發汗而復下之。不

少而湯。

日晡所小有潮熱從心上至

近者

大陷胸湯主之

喻註不大便燥渴日晡潮熱

腹硬滿證與陽明頗

同但小有潮熱則不似陽明大熱從心上至少腹手

不可近則陽明又不似此大痛因是辨其爲太陽結

胸兼陽明內實也緣誤汗復誤下重傷津液不大便

而躁渴潮熱雖太陽陽明亦屬下證但太陽痰飲內

結必用陷胸湯由胸脇以及腸胃蕩滌始無餘若但

下腸胃結熱反遺胸上痰飲則非治矣其析義之精

爲何如哉。篇中云從心上至少腹。故知爲太陽結胸。而非陽明內實也。苟非心上。則與大承氣無疑矣。結胸者。項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸。

此以結胸之劇者。言變制以出其治。夫邪結于胸。俯則礙而不利。勢必常昂。有反張之疑似。如柔痙狀也。蓋病已至劇。辨之不可不明。治之不可不審。頸項仍是太陽部位也。結胸至于不可治。如痙而陽邪又迫處于心胸。受傷實甚。于是以葶甘遂以滌飲。更用杏仁。苦寒蕩熱。加葶歷。可謂

周矣。乃聖人復變湯爲丸。

幾邪。

去而無餘耳。

大陷胸丸

大黃

芒硝

杏仁

去皮尖
各半兩

葶歷

半升

右四味搗篩二

味。內杏硝合研和丸一枚。別搗甘遂末一錢。白蜜二

合。水二升。煮一升。服之一宿。乃下。不下更服。取下爲

効。禁如藥法。

結胸證。其脉浮大者。不可下。下之則死。

方註陽邪內陷。法固當下。下必待實浮爲在表。大則

爲虛。浮虛相搏。則表猶未盡入。而裡未全實。下則尚
虛之裡氣必脫。未盡之表邪皆陷也。此示人憑脉不
憑證之要旨。戒人勿孟浪之意。

結胸證具。煩躁者亦死。

悉具。其候皆見。煩躁。津液竭也。津液竭者。不可下。下
證具矣。不下。不可下之。不可不死。而何。

小結胸病。正在心下。按之則痛。浮滑者。小陷胸湯主
之。

正在心下。言不似大結胸。

之則痛。

言比不按亦痛則較輕也

按于緊

此結胸之所以有大小之分

連主寒以泄熱也

半夏辛溫以散結也括蕢實

潤苦而益苦則致

熱于易泄潤以濟辛則散結于無難開也

小陷胸湯

黃連

一兩半 洗

括蕢實

一枚

水六升先煮括蕢取三

升去渣內諸藥煮取二升去渣分溫三服

寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

結胸本以悞下而成曰寒實者知其人胃氣素虛寒

痰膠塞。則在外之邪。雖入。亦不能爲熱證矣。小陷胸。爲滌飲之藥。然黃連之寒。不宜。故轉而爲白散耳。

白散方

桔梗

三分

貝母

三分

巴豆

一分

去皮炒黑。研如泥。

二味爲末。內巴豆

更杵。白飲和服。強人一錢。羸者減之。病在膈上必吐。

在膈下必利。不利進熱粥。一盃。利過不止。進冷粥一

杯。身熱皮粟不解。欲引水。者。若以水澀之。洗之。

益令熱。被劫不得出。當汗而。則煩。假令汗出已。

腹中痛。與芍藥如上法。

寒飲內聚。又被水寒。兩寒相

月飲開

膈。巴豆佐之。散寒逐水。使邪

結胃吐利之間有

全功也。已上結胸證十條

痞篇

傷寒汗出。解之後。胃中不和。心下痞硬。乾噫食臭。脇下
有水氣。腹中雷鳴。下利者。生薑瀉心湯主之。

方註病人初差。脾胃尚弱。雖未必過飽。猶之過飽而
然也。雷鳴。脾陰胃陽陰陽不和。薄動之聲也。水穀不
分清。所以雜逆而走注也。然則泄心者。健脾而脾輪