

心于不断革命，因为它的利益就在于使社会生产不断发展，就在于使社会生活不断更新。

正是无产阶级这种阶级地位，决定了它永远朝气蓬勃、一往无前；决定了马克思主义永远把最大的注意力倾注于新生事物。右倾机会主义分子对于总路线、大跃进和人民公社的恶毒攻击，完全是反映了濒于灭亡的资产阶级对新兴的社会主义的伟大成就的恐惧和仇恨。

当然，社会上的新旧斗争并不完全和阶级斗争联在一起。有些事情，由于人们认识上的差异，也会表现为新旧斗争。这种新旧斗争，即使到了共产主义社会，也不会消失。新旧斗争永远存在，是一个普遍规律。

反对新生事物的人，有一种理由：新生事物“有缺点”。

怎么会没有缺点呢？新生事物既然是新的，它在发展中就没有现成的规矩可循，所以常常不可避免地要走些弯路，甚至还要受些挫折。但是，这又算得了什么呢？最重要的问题是：它是新生的事物，它代表着未来；虽然有些缺点、走些弯路，它终于会战胜旧事物而取得统治地位。不管有多少缺点，它总比趋向死亡的旧事物要高明万倍。列宁说：“在这个千百万普通工人和农民改造他们整个生活的真心实意的工作中所犯的每一个错误，都抵得上剥削者少数的一千个、一百万个‘没有错误的’成就，在欺哄劳动者方面得到的成就。”①

人民群众是历史的主人，他们创造着物

质财富和精神财富，他们创造着新事物，他们的行动构成一系列的历史事件，他们举行着伟大的革命运动。群众运动扫除陈规陋习，使新生的幼芽峥嵘茁长。这样一块块枯拉朽、除旧布新的战斗，怎能没有缺点？身穿长袍站在堤上观潮的先生们，埋怨被溅湿了他的衣裳，觉得浪头太“粗暴”了。但是，这又何损于群众运动的伟大，又何损于新生事物的光辉？谁要是以为新生事物没有缺点，或者“应当”没有缺点，谁要是要求新生事物一出现便立刻十分完备，那就如毛泽东同志说过的，他不过是一个空想，或者是一个观潮派算账派，或者简直是右倾机会主义分子，因为现实生活不可能这样。硬是要求“没有缺点”的新生事物，那就只能是根绝新生事物。

右倾机会主义者反对大跃进和人民公社，其实并不是因为大跃进和人民公社有缺点。历来旧势力反对新生事物，都是借口新生事物中有这样那样的缺点。列宁一针见血地指出：“讥笑新的幼芽，抱着轻浮的怀疑态度等等——这一切实际是资产阶级反对无产阶级斗争手是保护资本主义而反对社会主义。”②

共产党人对新生事物的成长，充满着坚定的信心，同时在自己的工作中，又总是热情地关怀和培植新生事物，为新生事物

① 列宁：“给美国工人的信”。“列宁全集”第28卷，人民出版社1956年版，第54页。

② 列宁：“伟大的创举”。“列宁全集”第29卷，人民出版社1956年版，第387页。

以蟾身刺

孔貼於患

口連貼三

日內服干

金托裏散

三日後接

服犀黃丸

可救十中

三四潰後

不痛而癢

極者無一

毫挽回大

忌開刀開

則翻花最

香附錢炒

一六尿血盪眼神主

花實瘰癧效立秋後

乾漆

黃芩

十三四歲木下

栽木醋炒

地加香附黃連玄

日

小茴

酒炒黃煎

青皮去穰

砂仁

肉桂

甘草各五分

右剉作一劑才煎心熱服遍身痛加羌活

○一論室女十七八歲氣脈不通或百日或半年顏色青黃飲食少進寒熱往

來四肢困倦頭疼目眩肚痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹此乃脾胃受傷血氣

俱弱候食生冷急宜和氣血扶脾胃先以逍遙散次服加味八物湯後服調

逍遙散

當歸酒洗

白芍酒炒

柴胡一錢

黃芩一錢

川芎七分

甘草四分

熟地黃七分

半夏姜炒

人參五分

麥門冬去心

五分

右剉散生薑三片水煎熱服後服八物湯十劑又可服調經丸數服○若少

睡加酸棗仁炒以斂心血

加味八物湯

香附

當歸

白芍酒炒

川芎

人參

熟地黃

小茴香炒

黃芩

柴胡

白茯苓去皮

甘草○腹痛加玄胡索枳殼

乾漆○嘔吐惡心加良薑砂仁○手足麻痺惡寒加肉桂○咳嗽加杏仁

去白木

去去心

夕禾... 言世... 仁...

慘萬無一 五味子欵冬花

活男文皆 右劉水煎服

有此證○ 調經丸 香附醋浸晒乾三兩 當歸酒洗 白朮去苦一兩半如腹痛以蒼朮代之 枳殼麩炒

乳癰治 赤芍 陳艾醋炒 陳皮 小荷酒炒 川芎 厚朴姜汁炒

法○ 砂仁 熟地黃酒蒸一兩 玄胡 三稜醋浸炒 青皮去穢一兩二錢 莪朮

婦人被見 白芷 粉草各一兩 牛膝去芦酒洗

鼻風吹入 右為細末醋打米糊為丸如梧子大每服百丸空心米湯送下

乳孔以致 ○一論婦人二十歲後遇經脉動來沿身疼痛手足痺麻寒熱頭痛目眩可服

閉結名曰 加減五積散 厚朴去皮姜炒 蒼朮米泔浸 川芎 白茯苓去皮 當歸酒洗 白芷

如乳內生 半夏姜炒 白芍酒炒 獨活 羌活 牛膝去芦 桔梗 甘草三

一塊紅腫 枳殼麩炒 麻黃去根 陳皮各等分

作痛者大 右劉散薑葱煎熱服○咳加五味杏仁○瀉去枳殼加肉寇

而言癰小 ○一論婦人二十三歲經水不調或赤白帶下或如梅汁淋淋或成片有阻

而言癰以 二三月者此乃氣血虛弱漸生潮熱咳嗽飲食少進四肢倦惰日入

紫河車草

蒸即成勞瘵急當調治可服前加味八物湯四劑方可服大溫經湯訖漆○

浙莖各三

大溫經湯

香附

八分

當歸

酒洗

白芍

酒洗

七分

熟地黃

鹿茸

酥炙各

人參

錢為末黃

白茯苓

皮砂仁

四分

吳茱萸

炒

玄胡索

川芎

白朮

各五

甘草

各三

肉桂

三分

饴拌陳酒

小茴

酒炒

陳皮

五分

黃芪

密炒

沉香

二分

阿膠

炒

甘草

各三

肉桂

服醉蓋取

右判一劑生薑三片水煎空心熱服如汗不止加酸棗仁

炒

黃芪

密炙

咳嗽

汗或用炒

加杏仁五味半夏桔梗各五分潮熱加柴胡黃芩

白芷乳香

○一論婦人二十四五歲所服藥餌加味四物六君湯

沒藥各製

加味四物六君湯

厚朴

姜汁

當歸

酒洗

香附

各五

枳實

麩炒

白茯苓

去皮

淨折頁歸

川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白朮

去芦各

砂仁

身等分為

紅花

各三

黃連

三分

前胡

三分

陳皮

四分

甘草

二分

生薑

姜汁炒

未每服五

右劉散生薑三片水煎空心熱服

錢酒送專

○一論婦人二十五六歲直海虛冷經水不調或時小腹疼痛或下白帶如魚

治乳癰乳

腦髓或似米泔不分信期每日淋瀝不止面色痿黃四肢無力頭暈眼花目

癰一服全

眩宜服四物補經湯兼服烏雞丸調理

消如潰以四物補經湯

香附

當歸

白芍

酒炒各六分

熟地黃

川芎

各五分

醒消丸酒

白茯苓

去皮

黃芩

蜜炒

白朮

去苳

黃芩

酒炒各六分

玄胡索

陳皮

各四分

送一服以

小茴

酒洗

砂仁

人參

阿膠

炒各三分

沉香

另研三分

吳茱萸

三分

止其痛外

右劉生薑三片水煎空心熱服

貼洞天膏

烏雞丸

海金沙

鹽水浸焙

側柏葉

乾各四兩

香附

炒三兩

厚朴

姜炒三兩

當歸

酒洗三兩

自瘡如患

白朮

去苳

川芎

各二兩

白芍

酒炒二兩

熟地

二兩

羌活

一兩

防風

各一兩

色白者應

人參

兩

砂仁

各一兩

粉草

三錢

以流注法

右劉用白毛烏肉膳雞一隻不問三五年者俱好殺淨去腸屎毛將藥一半

治儻爛潰

人雞肚中放銅鍋內好酒五壺水二瓶文武火煮至乾取雞去骨取肉切細同

不堪者以

藥晒乾為末用粳米粉酒水煮糊為丸如梧桐子大每服百丸空下酒亦可

洞天救苦

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不時淋瀝或成片或下黑水面色青

丹按法與

黃虛暈眼花四肢困倦宜服此四五劑後服前大溫經湯十餘帖

服七日後

止經湯

當歸

酒洗一分

白朮

去苳八分

白芍

酒

川芎

熟地黃

香附

各七分

甘草炒

接以大棗

阿膠

炒

黃芩

炒

蒲黃

炒

側柏葉

砂仁

各七分

甘草

炒

香附

丸日服收

功○

右判生薑煎空心熱服○咳加味子杏仁去皮○肚痛加枳殼玄胡索乾漆○

乳懸治

○一論婦人經水來多不止用蘄艾一兩好生酒炒三次碗蓋淬入水煎滾去渣溫服立止

法○

○一論婦人三十一二歲年年生育敗血過多以致經水不均不時腹中疼痛

此怪證也

結塊飲食少進困倦目眩潮熱往來五心煩燥此血虛胃熱宜兼服紅花當歸散

世間亦偶

紅花當歸散 當歸酒洗 川芎 赤芍藥 熟地黃 黃芩 香附各六分

有之蓋產

玄胡索 五分 枳殼 五分 厚朴姜汁炒 小茴香酒炒 柴胡 紅花三分 陳皮

後兩乳伸

三稜醋煨名 莪朮醋煨 牛膝去芦 甘草二分

長形細如

右判生薑水煎空心熱服

雞腸垂過

○一論婦人三十四五歲因經水來時當風坐臥失於迴避腠理空虛外邪乘

小腹痛難

入遍身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰盛宜服五積交加散三四劑又服

刻忍急用

八物湯十餘劑

芎藭當歸

五積交加散 只可服一二劑勿多服

各一斤內

羌活錢一 當歸酒洗 川芎 獨活 白芷 半夏煨 麻黃 桔梗 白茯苓

五積交加散 只可服一二劑勿多服

取各四兩

厚朴姜炒 蒼朮米泔浸 防風去芦 枳殼炒 陳皮 柴胡各八分 桂皮四分 甘草三分

切片水煎

右劉薑葱煎熱服再服去柴胡加烏藥礬蠶各一錢酒煎熱服

時服以所

○一論婦人三十六七歲經行太過血氣虛耗胃氣不足故經水妄來可進八

餘斤半切

珍湯同烏雞丸治之

大塊產婦

八珍湯 當歸酒洗 白朮去芦各一錢 白茯苓去皮 熟地黃 人參 川芎各八分

面前放一

甘草三分 白芍酒炒八分 加香附八分 右劉生薑水煎熱服

棹下放火

○一論婦人三十八九歲經水不可腹中有塊疼頭暈眼花不思飲食乃血斷

鑪將芎歸

早餘血未盡不時攻痛成疾宜莪朮散遂去餘血

入鑪漫燒

莪朮散 香附三兩 當歸酒洗 莪朮醋煨 玄胡索 赤芍藥 枳殼麩炒

令婦伏於

青皮去苦 熟地黃 黃芩各一兩 三稜醋煨 小茴香炒 砂仁各八錢 乾膝炒盡烟

棹上口鼻

白朮一兩 紅花各五錢 川芎八錢 甘草一錢

及乳吸烟

右為細末每服二錢空心好米酒調下

如藥盡未

○一治婦人腹中常常作痛上下不定經年積血也

痊再如前

青皮 陳皮 三稜 莪朮 香附 烏藥 乾薑

法煎服熏 右各等分醋者焙乾為末空心陳皮湯調下

吸便可縮 ○一論婦人四十二三歲經水斷絕五十一二復來或淋瀝或成片條漏下不

上儻不能 止宜服和經湯兼四物補經湯烏雞丸相間服之可好和經湯若三帖即去

復舊取蔗 氣藥乃香附陳皮小茴是也

麻子一粒 和經湯 白芍酒炒一分 當歸酒洗 熟地黃 白茯苓 黃芩 香附

冷水磨塗 白朮去苦 川芎 酸棗仁炒 蒲黃炒 阿膠麩炒各八分 白芷一錢 陳皮

頭頂見縮 小茴酒炒各七分 甘草

復舊即時 右剉每服一兩薑棗煎熱服四物補經湯烏雞丸方俱見前

洗去乃瘡 ○一凡婦人經水不調或前或後或多或少時常頭暈眼黑耳鳴赤白帶下腰

瘡後儻日 腹疼痛五心煩熱四肢沉困胸膈痞悶不思飲食肌膚減削一切百病皆治宜此

後再產必 調經滋補丸 香附米酒醋童便鹽湯各浸一兩各炒乾共四兩 懷生地黃酒浸砂鍋蒸黑二兩 當歸酒洗二兩

復發不救 川芎 白芍酒炒各一兩 白朮去苦炒一兩 白茯苓去皮 陳皮一兩 懷山藥一兩

故膏藥不 牡丹皮一兩 小茴鹽酒炒一兩 玄胡索一兩 阿膠蛤粉炒一兩 山茱萸酒蒸去核一兩

可以蔗麻 右為細末酒醋打麵糊為丸如梧子大每服百丸空心米湯送下

煎入儻貼 ○一論婦人五十歲以外經水猶不斷顛顛倒倒不進而來當預防恐成敗血

孕婦下身 症也此丸甚妙

瘡癩即小 十金丹 當歸頭 二兩 懷山藥 三兩 白朮 三兩 人參 二兩 黃芩 二兩 綿地榆 二兩

產產後尚 不覺膏故 再貼致命 可見蕪麻 巴豆之害 如此 ○ 下部治 法 ○ 橫痃治 法 ○

黃柏 酒炒黑各二兩 鹿角霜 三兩 白茯苓 去心皮 一兩 懷生地黃 酒浸烘 乾四兩

右共為細末用艾葉三兩水二筋煎至一筋去渣入浮小麥粉六兩攪勻煮

熟糊和藥為丸每日空心服一百五十九丸扁柏葉煎湯送下

○一治婦人因怒吐痰胸膈作痛服四物二陳芩連枳殼之類不應更加祛風

之劑牛身不遂筋漸攣搐四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠子以為

鬱怒傷脾肝氣血腹損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味丸謂治喜其謹

疾年餘悉愈形體康健

○一治婦人晡熱肢體瘦倦飲食少無味月經不行或鼻衄或血崩久矣或用順

氣清熱等劑不應更如寒熱且時欲作嘔此乃鬱怒虧損脾胃虛火錯經妄

行而然耳以補中益氣湯兼進六味丸 ○一治婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗

橫痃生於

小腹兩旁

大腿界中

形如腰子

皮色不異

硬如結核

按之微痛

者是也日

取皂角刺

六錢為末

布袋同糯

米二合煮

粥時飲三

四日全消

或以子龍

日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣以補中益氣湯加扶神遠志麥門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉

逍遙散

方見後

補中益氣湯

方見內傷

六味丸

方見補益

十全大補湯

方見補益

斷產方總論

婦人欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有生產艱難或一育不已

或不正之屬為尼為娼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方

頗眾且多有用水銀蜜虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異

○婦人斷產驗方

故蠶紙方圓一只燒為末酒調服終身不復懷孕也驗具于後

○一千金斷產方

油煎水銀一日方息空心服如棗大一圓永斷不損人

○一斷子法

用白麵麩一升無灰酒打作糊煮至二升半絹袋濾去渣分作三服經月

經來日晚吃一服五更吃一服天明吃一服經事即行終身無子

經閉

丸每服三分淡薑湯日送三次

全瘡乃止大忌開刀開則刀口無膿惟出

白膩漿三百日內而死自潰者亦然

小腸疽治法

患在小腹

脉女人尺脉常勝而右手脉大皆其常也若腎脉微瀼或浮或滑而斷絕不勻或肝脉沉而急皆經閉不調之候也

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治

宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因七情傷心心氣停結故血閉而

不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○一治婦女經閉不論虛實寒熱新久即服此方有殊効

清熱通經湯 當歸酒洗一錢 川芎八分 白芍酒炒一錢 生地黃半錢 大黃七分 厚朴姜炒八分

枳殼一錢 枳實一錢 蘇木一錢 黃芩一錢 紅花五分 烏梅一個 官桂四分

桃仁去皮尖十個 右剉生薑三片水煎空心温服不數劑而奏効

○一論婦女經水不通腹中積塊癥瘕攻注刺痛宜服

歸木破癥湯 歸尾酒洗 赤芍 白芍 青皮各一錢 三稜醋炒一錢 莪朮醋炒一錢

香附醋炒一錢 烏藥七分 官桂 蘇木 紅花各五分

之內按之

如掌堅硬 ○一論婦女經閉一二年不通臍左下一塊如碗口大間或吐血或便血發熱

而熱微痛 咳嗽吐痰盜汗等症宜

小便頻數 養血調經丸 當歸酒洗二兩 川芎一兩 熟地黃四兩 山茱萸酒炒去核二兩 生地黃酒洗二兩

汗出怯寒 懷山藥二兩 益母草二兩 白芍酒炒二兩 牡丹皮一兩 白茯苓去皮一兩 梔子仁炒一兩

腹色如故 香附米醋炒二兩 澤瀉半兩 陳皮一兩

或現微腫 右為末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心淡薑湯送下

脈緊實有 一論婦人血痕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

力者是也 當歸八分 桂心六分 玄胡索炒四分 白芍酒炒六分 血竭六分 蒲黃炒六分

以犀黃丸 右為末每服二錢空心酒調下

瘡之○ 消積通經丸 香附米醋炒十兩 艾葉醋炒二兩 當歸酒洗二兩 川芎一兩 赤芍一兩

懸難治 生地黃二兩 桃仁去皮一兩 紅花酒洗一兩 三稜醋炒一兩 莪米酒炒一兩 乾漆炒一兩

法○ 右為細末醋糊為丸如梧子大每服八十九丸臨臥淡醋湯送下

患生肛門 ○一治婦女月經不通鼻衄出血不止 侍郎張玉陽傳

前陰莖後

兩相交界

之處初起

細粒漸如

蓮子數日

如桃李樣

俗呼偷糞

老鼠潰經

走洩即成

漏生管漏

久成怯如

怯證人患

此乃催命

鬼也諸漏

當歸一錢半

川芎一錢

白芍一錢半

生地黃一錢半

知母一錢

黃柏一錢

茅根一分

紅花一錢

牡丹皮一錢

桃仁去皮尖錢

側柏葉二錢

大黃用紅花蘇木茜根煎酒

右判一劑水煎空心服

三錢

一治室女經水不行

翰林張明字傳

當歸

川芎

赤芍

生地黃

荆芥穗

枳殼麩炒各

馬鞭草錢

牡丹皮

川牛膝

生蒲黃各五分

桂心二分

烏梅二分

右判一劑水煎服日二劑○過期不行加澤蘭葉

○一治室女經閉咳嗽發熱屬虛弱者宜

養血通經湯

牡丹皮

當歸各一錢五分

白芍

生地黃

陳皮

白朮去

香附各一錢

川芎八分

柴胡

黃芩各七分

甘草四分

右判一劑水煎空心温服

通經調氣湯

治症同前

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

生地黃

香附童便炒

牡丹皮童便炒

柴胡六分

黃柏酒炒

知母童便炒

牛膝酒洗

桃仁去皮尖

紅花二味量加

黃柏童便炒

知母童便炒

宜醫獨此 右剉十劑水煎空心一服食遠一服

不可治治 ○一治婦人經閉不通不論新久下取良方

則漏管愈下取通經丸 乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆去殼 血竭 葱白各五分 斑猫五

大致成海 右為末共搗為丸綿裹三層繫於筒口上將線繫住送入陰戶內三四寸許

底漏不救 俟一炷香經水即下

在於未成 ○一治婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行此乃悲則

膿時用生 ○傷肺以補中益氣湯加桔梗貝母兼進六味丸

甘草熟軍 ○一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰

各三錢酒 面青脉瀋寒熱往來肝經脉病也此鬱怒傷脾之症非胎也不信仍用治胎

煎空心服 散不應余用加味歸脾逍遙之藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速効別服通

一劑即愈 經丸藥一服下血昏慣自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮姜二劑

如成膿以 漸愈又用十全大補湯五十劑而安

醒消丸瘻 ○一婦人久患瘡形體怯弱內熱晡熱自汗盜汗飲食少思月事不行或用通經

之儻患色 丸虛症悉具此因虛而致瘡因瘡以閉經也用補中益氣湯及六瘻味地黃丸愈經行

小字 言上 言下 言左 言右 言前 言後 言內 言外 言上 言下 言左 言右 言前 言後 言內 言外

白者小金

丹瘡之○

子癰治

法○

如腎子作

癰而不升

上者外現

紅色子癰

也遲則成

功潰爛致

命其未成

膿時用杓

楠全筒川

棟秦芥陳

○一婦人性沉多慮月經不行胸滿食少或作服或吞酸予以為中氣虛寒用

補中益氣加砂仁香附煨姜二劑而胸膈和飲食進更加六君加芎歸貝母

桔梗生薑大棗數劑脾胃健經自調矣

○一婦人素有胃火或用清胃散而安後因勞役燥渴內熱肌肉消瘦月經不

行此胃火消燥陰血用逍遙散加牡丹皮炒梔子以清胃熱用八珍湯加茯

苓遠志以養脾血而經自行矣

補中益氣湯方見內傷 六味丸方見補益 十全大補湯方見補益 逍遙散方見

婦人虛勞 歸脾湯方見婦人虛勞 六君子湯 八珍湯俱見補益

崩漏

脉婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生○又曰脉小虛滑者生

大緊實數者死○又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海

皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下

皮赤芍甘
草防風澤

蔞等分錢

半一服即

瘡○

囊脫治

法○

腎囊生毒

爛破腎子

落出外用

紫蘇湯日

洗取紫蘇

葉梗為末

日敷用青

為月水婦人經脈調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非

時而下淋瀝而不斷謂之漏下也致五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟

皆虛損者則其色隨血下診其脈寸口弦而大弦則為藏大則為芤藏則為

寒芤則為虛虛寒相搏其脈為牢婦人即半產而漏下又云尺脈急而弦大

風邪入少陰之經女子漏血下赤又漏下赤白不止脈小虛滑者生脈大緊

實數者死也又漏血下赤白日久血數斗脈急疾者死遲者生也又云尺寸

脈虛者漏血漏血脈浮不可治也若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少

氣臍腹冷極則汗出如雨尺脈微小由衝任虛衰為風冷客乘胸中氣不能

固可灸關元百壯在臍下當中三寸

○一論女人漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因飲食不節

勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜臥困倦乏力氣短氣

急脾主滋榮周身者也脾用虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為

血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

升陽除濕湯

當歸酒洗五錢

黃芪半錢

蒼朮米泔浸二錢半

升麻一錢

藁本一錢

荷葉包裹

內服煎劑

黃連五分

歸尾連翹

黃芩各一

錢五分甘

草木通各

一錢○

痔漏治

法○

痔漏即腸

痔凡人九

竅中有小

肉突起即

羌活五分

防風一錢

獨活五分

蔓荊子七分

甘草一錢

柴胡半錢

右剉作一劑水煎空心溫服少時以早飯壓之可一服而愈又灸足太陰脾

經血海穴二七壯○此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下

以收其血之暴崩也住後必須服黃芩人參當歸炙甘草之類數服以補之

○一治婦人崩漏多因氣所使而下者

黃芪

蜜炒五分

人參五分

白朮

去苦一錢

當歸身

酒洗一錢

川芎五分

熟地黃

錢一分

香附

炒黑一錢

蒲黃

炒五分

地榆五分

升麻三分

右剉一劑水煎空心服

○一治婦人經水過多不止者

樗根皮

七錢

白芍

炒一兩

黃芩

炙一兩

龜板

炙一兩

石為末酒糊為丸如梧子大每服五十九空心溫酒白湯任下

○一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者

當歸

酒洗二錢

川芎

七分

人參

一錢

黃芪

鹽水炒一錢

白芍

酒炒八分

艾葉

醋炒一錢

真阿膠

炒成珠一錢

蒲黃

畧炒一錢

黃連

酒炒錢半

黃芩

酒炒一錢

荆芥

一錢

黃芪

鹽水炒一錢