

醫
問
壘
元
戎



南京中医药大学图书馆版权所有

醫壘元戎

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下渴劇皆中病即止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯 若陽已虛尺中弱濇者發不可下之

宜小柴胡湯 若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯 若少陰病

脈細沉數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯 若少陽病不可發汗宜小柴胡湯 若

咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已上六證並宜小柴胡湯 若不

利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類 若四逆厥及虛家皆不可吐厥者宜當歸

四逆湯 虛宜附子湯 有熱人宜黃耆人參建中湯 若少陰膈上寒乾嘔不可吐

宜小半夏加橘皮湯溫中丸 若咽中有動氣不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯

若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯 虛者宜附子湯

有熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻其實必噦宜小柴胡湯 若脈浮而緊法當身

疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴胡湯 若脈濡

而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此

不可汗宜小柴胡湯 若濡而弱不可發汗宜小柴胡湯 若浮而大浮為氣實大而

血虛小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯



若反更實。津液四射。榮竭血盡。乾煩而不得眠。此不可下。宜與小柴胡湯。若脈浮大。應發汗。宜柴胡桂枝湯。若脈浮而緊者。不可下。而反下之。為大逆。宜桂枝麻黃各半湯。若脈數不可下。宜柴胡桂枝湯。若下之。必煩利不止。宜葛根黃芩黃連湯。若脈濡弱。浮數不可下。宜小柴胡湯。若濡弱微瀼。微則陽氣不足。中風汗出而反躁煩。瀼則無血。厥而且寒。不可下。宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯。若結胸脈浮大。不可下。下之即死。宜小陷胸湯。若陽病多者。熱下之。則硬。宜小柴胡湯。若太陽發汗不微。轉屬陽明。微汗出不惡寒。若太陽證不罷。不可下。下之。為逆。宜桂枝麻黃湯。若太陽病有外證未解。不可下。下之。為逆。宜桂枝麻黃湯。若病發於陽。而反下之。熱入因結。結胸病發於陰。而反下之。因作痞。結胸則有陷胸湯。凡三。痞則有瀉心湯。五。若太陽與陽明合病。喘而胸滿。不可下。宜麻黃杏子甘草石膏湯。若太陽與少陽合病。心下硬。頸項強而眩者。不可下。宜小柴胡湯。若病欲吐者。不可下。宜小半夏加橘皮湯。太陰腹痛。吐食自利。腹痛。下之。必胸下結硬。厥陰病。喝氣正衝心。心中熱。飢不欲食。食則吐。就下之。則利不止。若少陰病。飲食入口即吐。心中溫溫欲吐。腹痛能吐。始得交手足。寒脈弦遲者。此胸中寒實。不可下也。宜溫中湯。生薑汁半夏湯。若無陽陰。强大便硬者。下之。必清穀腹滿。宜用蜜煎導法。若傷寒五六日。不結胸。腹濡。脈虛。復厥者。不可下。此亡血也。宜當歸四逆湯。下之。則死。宜四逆加人參湯。若藏結無陽證。

不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用小柴胡湯若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜小柴胡湯 若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若色黃者小便不利也宜五苓散 若陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯 半夏瀉心湯 攻之利不止者死宜四逆湯 不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胸痞氣及下利洞泄脇熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初不犯也

太陽證

桂枝二十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯丸仲景活人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所無者并諸方對證加減今載於後

金匱黃耆建中湯

治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生薑

切各二兩

芍藥

六兩

炙甘草

二兩

膠飴

一升

大棗

十二個

右七味

㕮咀

以水七升

先煮六

味

取三升

去滓內膠飴令消溫服一升日三若嘔者加桂薑 若腹滿者去棗加茯苓

四兩 若肺虛損不足痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼界子心腹疔痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志半兩 若或吐或瀉狀如霍

亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加附子七錢半 若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許 若男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋膜脹 下虛滿胸中煩悸面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復加黃耆一兩半 若婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疝痛呼吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人精壯

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥逆小腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗出陰

縮或腹中寒痛不堪勞苦唇舌乾精自出或手足作寒作熱而煩苦酸痛不能當立

此補中益氣

桂心 三錢

芍藥

黃耆 各三錢

甘草 炙

當歸

人參 各一錢

生

薑 半兩

附子 五分

半夏 二錢

棗 二枚

右咬咀水五盞煮至三盞去渣分三服

易簡杏子湯

治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參 半夏

茯苓

細辛 減半

甘草 炙

官桂 減半

乾薑 減半

芍藥

五味


子 右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煮五六分去滓服 若

感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用鶯粟殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之

每服加烏梅一枚煮服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此若久年咳嗽氣虛喘急去杏

仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯



大補十全散

參耆朮茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用 生薑棗水煎 婦人虛弱用 名義號

十全 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨痛

急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘咳中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 芍藥 甘草 黃耆 當歸 川芍 人參 白朮 茯苓 熟地黃等

右為粗末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘

草小建中湯也黃耆與此三物即黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川

芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如

豈汁或下瘀血日夜無度 人參 茯苓 川芍 官桂 當歸 芍藥 白朮 等各

分 右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力

減之 若加熟地黃黃耆甘草等分足為十味名十補湯 若虛勞嗽加五味子 若

有痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子 若寒甚加乾薑

皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡二兩服之 若氣短加

人參 若小便不利加茯苓 若脈弦澀加川芍 若惡寒加官桂 若脈澀加當歸

若腹痛加白芍藥 若胃熱濕盛加白朮 若血瘀色紫者陳血也加熟地黃 若

血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮 若脈洪

實痛甚者加酒浸大黃 潔古云防風為上使黃連為中使地榆為下使

千里漿一名水葫蘆 木瓜 紫蘇葉 官桂 各半 烏梅肉 赤茯苓 各

細末煉蜜為丸如彈子大噙化一丸嚥津

又方 百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 甘草 麥門冬 右各等分為細末煉

蜜丸噙化

荔枝湯 烏梅肉 甘草 各三 百藥煎 一兩 白芷 半兩 白檀 三錢 右為細末

湯點

蜜酒 好蜜 二斤 水一碗 細麴 一斤 好乾酵 三兩 右先熬蜜水去花沫令絕

冷下麴酵每日三攪三日熟

陽明證 葛根湯三方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦在

易老門冬飲子 治老弱虛人大喝 人參 枸杞 白茯苓 甘草 各二錢 五味子

麥門冬 去心各半兩 右為粗末生薑水煎

麥門冬飲 治勞復欲死人氣欲絕者用之有效 麥門冬 一兩 甘草 二兩 粳米 半

右門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半入藥五錢匕棗二枚 去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓大溫服不能服者綿滴口中 後人治小兒

不能灌注者宜用此綿滴法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人陽氣欲絕者故不用石膏若加人參大妙

海藏五飲湯 一留飲心下二滯飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五

飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾 旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓

厚朴 半夏 澤瀉 猪苓 前胡 桂心 芍藥 甘草 右等分剉每兩分四

服水二盞生薑十斤同煎至七分取清溫飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加

葛根花縮砂仁

海藏已寒丸此丸不僭上陽生於下 治陰證服四逆輩胸中發燥而渴者或數日大便

秘小便澀赤服此丸上不躁大小便自利 肉桂 茯苓 良薑 烏頭此各錢

附子此 乾薑此 芍藥 茴香炒各兩 右等分為細末糊為丸桐子大溫酒下空

腹食前五七十九丸八九十九丸亦得酒醋為糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸牀閉目不省擲

手揚視搖動不寧錯語失神脈弦浮而虛內燥熱之極也氣粗鼻乾而不潤上下通燥

此為難治宜生地黃黃連湯主之 川芎 生地黃 當歸各七錢 赤芍藥 梔子

黃連 黃芩各三錢 防風三兩 右為粗末每服三錢水二盞煎至七分取清飲無

時徐徐與之 若脈實者加大黃下之 大承氣湯氣藥也自外而至內者用之 生

地黃黃連湯。血藥也。自內而之外者。用之氣血合病。循衣撮空證同。自氣而之血。血而復之氣。大承氣湯下之。自血而之氣。氣而復之血。地黃黃連湯主之也。二者俱不大便

增損理中丸 王朝奉云大小陷胸湯丸不愈者宜與之 人參 白朮 枳實 芍藥

礪各二兩 甘草炒三兩 乾薑各一兩半 枳實地二十個 黃芩去枯一兩 右為細末。煉蜜為丸。

如彈子大。湯蓋煎服。不歇復與之。不過五六。胸中豁然矣。用藥神速。未嘗見也。渴者

加栝蒌根。汗者加牡蠣。

少陽證大小柴胡湯加減在前附子柴胡五方在後保命集內

易簡參蘇飲 治感冒發熱頭痛。與痰飲凝積發而為熱。並宜服之。若感冒發熱。亦如服

養胃湯法。連進數服。微汗即愈。大治中脘痞悶。嘔逆惡心。開胃進食。小兒室女尤宜服

之 前胡 人參 紫蘇 乾薑 半夏 茯苓加三 枳壳 陳皮 甘草 桔

梗 木香各半兩 右咬咀。每服四錢。水一盞半。生薑七片。棗一枚。煎至六分。去滓。不以

時候。素有痰飲者。俟退熱。以二陳湯或六君子湯間服。若男子婦人虛勞發熱。或吐衄

下血過多。致虛熱者。用此藥三兩。加四物湯二兩。合和。名茯苓補心湯。

活人治婦人傷寒妊娠藥例 若發熱惡寒者。不離桂枝芍藥。若往來寒熱者。不離

柴胡前胡。若大渴者。不離知母石膏五味子麥門冬。若大便秘者。不離桂附白朮

乾薑。若大便秘結者。不離大黃黃芩。若經水適來適去。斷者。不離小柴胡。若安



胎者不離人參附膠白朮黃芩。若發汗者不離葱豉生薑麻黃旋覆。若頭痛者不離石膏前胡梔子。若傷暑頭痛者不離柴胡石膏甘草。若滿悶者不離枳實陳皮。

若膈氣不安者不離黃芩麥門冬人參。若癰發黑者不離黃芩梔子升麻。

萬病紫苑丸。療臍腹久患痞癖如碗大。及諸黃病每地氣起時。上氣衝心。連臍絞痛。一

切蟲咬。十種水病。十種蠱病。反胃吐食。嘔逆惡心。飲食不消。天行時病。婦人多年月露

不通。或腹如懷孕多血。天陰即發。又治十二種風頑痺。不知年歲晝夜不安。夢與鬼交。

頭白多屑。或哭或笑如鬼魅所着。腹中生瘡腹痛。服之皆效。紫苑上去苗吳茱萸

湯洗十次焙乾 菖蒲 柴胡去鬚 厚朴薑製 桔梗去蘆 茯苓去皮 皂莢去皮 桂枝 乾薑炮 黃連去鬚 蜀椒去目及閉日 巴豆去皮膜 人參去蘆各 川

烏去皮臍 加羌活 獨活 防風各半 右為細末。八巴豆勻煉蜜丸如桐子大。每

服三丸。漸加至五七丸。生薑湯送下。食後臨暮。初有孕者不宜服。具引於後。痔漏腸

風酒下。赤白痢訶子湯下。膿血痢米飲湯下。墮傷血悶四肢不收。酒下。蛔虫

咬心。檳榔湯下。氣噎憂噎荷葉湯下。打撲傷損酒下。中毒。蒂灰甘草湯下。一

切風。升麻湯下。寸白蟲。檳榔湯下。霍亂。乾薑湯下。欬嗽。杏仁湯下。腰腎痛。豈

淋湯下。陰毒傷寒。溫酒下。吐逆。生薑湯下。食飲氣塊。麩湯下。時氣。井花水下。

脾風。陳皮湯下。頭痛。水下。心痛。溫酒下。大小便不通。燈草湯下。因物所傷。

以本物湯下 吐水梨湯下 氣病乾薑湯下 小兒天風吊搐防風湯下防己亦可

小兒疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白湯下 月信不通煎紅花酒下 婦人腰痛

川芎湯下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒下 產暈痛溫酒下 血氣

痛當歸酒下 產後心腹脹滿荳淋湯下 難產益志湯下 產後血痢當歸湯下

赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下 室女血氣不通酒下 子死萊子湯

下 又治小兒驚癇大人癲狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫中

吟等疾

太陰證 陷胸三方瀉心五方在後保命集內

理中湯加減例 若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯 若霍亂吐瀉

者加橘紅青橘各一兩名治中湯 若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出

令透即進此藥 若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑十片同煎 若

泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯 若塘泄不已者於補中湯內加附子一兩不

喜飲水穀不化者再加縮砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於

本方中去白朮加熟附名四順湯 若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及

諸吐利後胸痞欲絕心高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加桔萸根一兩 若霍亂後轉筋者理中湯內加火燉

石膏一兩 若臍上築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮恐作奔豚故

加官桂 若悸多者加茯苓一兩 若渴欲飲水者添加朮半兩 若苦寒者添加乾

薑半兩 若腹滿者去白朮加附子一兩 若飲酒過多及啖炙博熱食發為鼻衄加

川芎一兩 若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方 若中附

子毒者亦用本方或只用甘草乾薑等分煎服仍以烏荳煎湯解之

平胃散加減例 若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加霍香半夏 若加乾

薑為厚朴湯 若溫疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加蓮鬚葱白五寸豈豉三十粒煎三

二服微汗出愈 若五勞七傷脚手心熱煩燥不安百節酸疼加柴胡 若痰嗽癰疾

加薑製半夏 若本藏氣痛加茴香 若火氣衝滿加桑白皮 若婦人赤白帶下加

黃耆 若酒傷加丁香 若飲冷傷食加高良薑 若滑脫泄瀉加肉荳蔻 若風痰

四肢沉困加荊芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛壅拘急加地骨皮 若腿膝濕

痺加兔絲子 若白痢加吳茱萸 若赤痢加黃連 若頭風加藁本 若轉筋霍亂

加楠木皮 若七邪六極耳鳴夢洩盜汗四肢沉重腿膝酸痠婦人宮藏久冷月脈不

調者加肉桂 若胃寒嘔吐多加生薑 一法加茯苓丁香各三兩共成六味 若氣

不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生薑煎服 若與五苓散相半為對金飲

子 若與六一散相合為黃白散 若與錢氏異功散相合為調胃散 若欲進食加

神麴麥芽吳茱萸川椒乾薑桂為吳茱萸湯 若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐利
若加霍香半夏為不換金正氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣痛者加苦
棟茴香

少陰證 真武四逆等湯在活人黃附方七道在保命集內

八物定志丸補益心神安定魂魄治痰去胸中邪熱理肺腎 人參一兩 菖蒲一兩

志去心 茯神去心 茯苓去皮各一兩 硃砂錢一 白朮 麥門冬去心各一兩 牛黃細研一錢另

右為細末煉蜜丸桐子大米飲湯下三十丸無時 若髓竭不足加生地黃當歸 若

肺氣不足加天門冬麥門冬五味子 若心氣不足加上黨參茯苓菖蒲 若腎氣不

足加白朮白芍藥益志 若肝氣不足加天麻川芎 若腎氣不足加熟地黃遠志牡

丹皮 若膽氣不足加細辛酸棗仁地榆 若神昏不足加硃砂預知子茯神

仲景八味丸 熟地黃補腎水真血 肉桂補腎水真火 牡丹皮補神志不足 附

子能行諸經而不止兼益火 白茯苓能伐腎邪濕滯 澤瀉去胞中留垢及遺溺

山茱萸治精滑不禁 乾山藥能治毛中燥酸澀 右八味皆君主之藥 若不依易

老加減服之終不得效若加五味子為腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰翳

壯水之主以制陽光錢氏地黃丸減桂附

潔古老人天麻丸 治證見活法機要 天麻六兩酒浸三日 除風痺 牛膝六兩酒浸三日

培乾 强筋 玄參六兩 樞機管領 草薢六兩另 壯骨 杜仲七兩劉 使筋骨相着 當

歸十兩 和養血 羌活十五兩或 去骨節間風 生地黄斤一 益真血 附子一兩 行諸經

不止 獨活五兩 去腎間風邪 右為細末 煉蜜為丸如桐子大每服五七十九病大至

百丸空心食前溫酒白湯下服藥忌壅塞宜於通利故服半月稍覺壅塞微以七宣丸

輕疎之使藥再為用也

大效牡丹皮散 治血藏虛風及頭目不利不思飲食手起煩熱肢節拘急疼痛胸膈不

利大腸不調陰陽相干心驚忪悸或時旋運 牡丹皮 川芎 枳殼一兩 陳

皮炙 玄胡 甘草 羌活 半夏湯洗 三棱炮 乾薑炮 肉桂各半 木香 訶

子肉 白朮炒各三分 芍藥錢三 當歸半兩 右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸

食前溫服益血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮熱證至

妙

海藏大五補丸同三才丸例 天門冬 麥門冬 菖蒲 茯神 人參 益智 枸

杞 地骨皮 遠志 熟地黄 右為末 煉蜜為丸如桐子大空心酒下三十丸本方

數服以七宣丸泄之

清心丸治熱 黃柏二兩 天門冬一兩 黃連半兩 龍腦錢一 麥門冬去心 右為細

末煉蜜丸桐子大每服十丸臨卧門冬酒下薄荷湯亦得

火府丹丙丁俱瀉。

黃芩 黃連 一

生地黃 二

木通 三

右為細末煉蜜丸桐子

大每服二三十丸臨卧溫水下。

海藏調胃白朮澤瀉散。

治痰病化為水氣傳變水鼓不能食。

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔

右為末一法加白朮本藥各半治腹臍上腫

如神

若心下痞者加枳實

若下盛者加牽牛

厥陰證

當歸四逆并加吳茱萸等湯見陰証畧例

四物湯益榮衛滋氣血。月水不調臍腹痛等症並見局方。

熟地黃

補血如臍下痛非此不能除

通於腎經

川芎

治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

和血

刺如刀刺乃通腎經之藥也

右為粗末水煎加減于後

婦人骨蒸 若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠一片又加葱白黃耆 若

血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾。

若婦人嘗服春倍川芎 脈弦頭痛 夏倍芍

藥 脈洪飧泄 秋倍地黃 脈沉瀉血虛 冬倍當歸 脈沉寒而不食 若春則防

風四物加防風倍川芎 若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥 若秋則門冬四物加天

門冬倍地黃 若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸 若血虛而腹痛微汗而惡風四物

湯加耆桂謂之腹痛六合 若風眩暈加秦艽羌活謂之風六合 若氣虛弱起則無

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合 若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之

熱六合。若虛寒脈微自汗。氣難布息。清便自調。加乾薑附子。謂之寒六合。若中濕

身沉重無力。身微涼汗。加白朮茯苓。謂之濕六合。若產後虛勞日久。而脈浮疾。宜

柴胡四物湯。川芎 熟地黄 當歸 芍藥各一兩半 加柴胡錢八 人參 黃芩 甘草

半夏錢各三 水煎服。若婦人筋骨枝節痛。及頭痛脈弦。增寒如瘧。宜治風六合。四

物湯兩四 防風 羌活各一兩 若血氣上衝心腹。肋下悶滿。宜治氣六合。四物湯兩四 香

朮 檳榔各一兩 若臍下虛冷腹痛。及腰脊間悶痛。宜玄胡六合。小腹痛者同 四物湯兩四 玄

胡 苦練各一兩 若氣充經脈。故月事頻併。臍下多痛。宜芍藥六合。四物湯兩四 芍

藥兩一 若經事欲行。臍腹絞痛。臨經痛者。血澀也。宜八物湯。四物湯兩四 玄胡 苦練

焦兩一 檳榔木香各一兩 若經水過多。別無餘證。宜黃芩六合。四物湯兩四 黃芩 白朮

各一 若經水澀少。宜四物內加葵花煎。又加紅花 若虛勞氣弱。欬嗽喘滿。宜厚朴

六合。四物湯兩四 厚朴薑製一兩 枳實欸炒一兩 若經水暴下。加黃芩一兩 若腹痛者。加黃連

如夏月不去黃芩。若經水如黑豆汁者。加黃芩黃連各一兩。若經水少而色和者。

四物湯加熟地黄當歸各一兩。若經水適來適斷。或有往來寒熱者。先服小柴胡湯。

以去其寒熱。後以四物湯和之。若婦人血積者。四物湯內加 廣茂 京三稜 桂

枝 乾漆各一兩 若婦人傷寒汗下後。飲食減少。血虛者。宜 八物湯。四物湯兩四 黃

耆 甘草 茯苓 白朮各一兩 若妊娠傷寒。中風表虛自汗。頭痛項強。身熱惡寒。脈

浮而弱。太陽經病。宜表虛六合湯。四物湯兩桂枝地骨皮各七錢若妊娠傷寒頭

痛身熱無汗。脈浮緊。太陽經病。宜表實六合湯。四物湯兩麻黃細辛各半兩若妊

娠傷寒中風溼之氣。肢節煩疼。脈浮而熱。頭痛。宜風溼六合湯。太陽標病也。四物湯

兩四防風兩蒼朮製各七錢若妊娠傷寒下後。過經不愈。溫毒發斑如錦紋。宜升麻六合湯。

四物湯兩升麻連翹各七錢若妊娠傷寒。胸脇滿痛。而脈弦。少陽也。宜柴胡六合湯。

四物湯兩柴胡黃芩各七錢若妊娠傷寒。大便秘。小便赤。氣滿而脈沉數。陽明太

陽本病也。急下之。宜大黃六合湯。四物湯兩大黃兩桃仁十個去皮若妊娠傷

寒汗下後。欬嗽不止者。宜人參六合湯。四物湯兩人參五味子各五錢若婦人妊

娠傷寒汗下後。虛痞脹滿者。陽明本虛也。宜厚朴六合湯。四物湯兩厚朴枳實炒

兩各半若妊娠傷寒汗下後。不得眠者。宜梔子六合湯。四物湯兩梔子黃芩各半兩

若妊娠傷寒。身熱大渴。蒸蒸而煩。脈長而大者。宜石膏六合湯。四物湯兩石膏知

母各半兩若妊娠傷寒。小便不利。太陽本病。宜茯苓六合湯。四物湯兩茯苓澤瀉

兩各半若妊娠傷寒。太陽本病。小便赤如血狀者。宜琥珀六合湯。四物湯兩琥珀

茯苓各半兩若妊娠傷寒。汗下後。血漏不止。胎氣損者。宜膠艾六合湯。四物湯兩阿

膠艾各半兩一方加乾薑甘草黃耆若各半兩若妊娠傷寒。四肢拘急。身涼微汗。腹中痛。脈沉而

遲。少陰病也。宜附子六合湯。四物湯兩附子炮去肉桂各半兩若赤白帶下。宜香桂